

**MEMÒRIA ORNITOLÒGICA DE L'ANY 2002**

Recull de dades i textos a càrrec  
d'Humbert Salvadó, Cisco Guasch i Xavier Bayer.



sumari

- Sortides realitzades durant l'any
- Nivell de les aigües a l'embassament
- Meteorologia
- Acció de l'home sobre el medi
- El projecte Ardea 2000
- Seguiment de les migracions d'aus rapinyaires i celebració del dia internacional de les aus
- El cens d'ocells hivernants
- El programa SOCC
- Els ocells del Parc al 2002
- Annexes
  - Annex 1 - Taula comprimida amb les observacions del 2002
  - Annex 2 - Taula amb els totals, percentatges, ... de les observacions del 2002
  - Annex 3 - Migració postnupcial de rapinyaires
  - Annex 4 - Observacions d'altres vertebrats
  - Annex 5 - Fitxes d'anàlisi d'egagròpiles
  - Annex 6 - La participació al SOCC (còpies fitxes SOCC i planell transecte)
  - Annex 7 - Mortalitat d'aus i altres animals a la carretera
  - Annex 8 - Recull de premsa del 2002
  - Annex 9 - Dades meteorològiques del 2002

\* Sortides realitzades durant l'any

Per tal de realitzar el seguiment ornitològic que d'uns anys ençà s'està duent a terme al Parc del Foix, al llarg de l'any 2002 s'ha fet un total de 99 sortides a aquest espai.

Les visites al Parc del Foix, per mesos i trimestres han quedat repartides de la següent manera:

|          |             |                |             |
|----------|-------------|----------------|-------------|
| gener    | 4 sortides  | 1er. trimestre | 14 sortides |
| febrer   | 5 sortides  |                |             |
| març     | 5 sortides  |                |             |
| abril    | 6 sortides  | 2on. trimestre | 19 sortides |
| maig     | 6 sortides  |                |             |
| juny     | 7 sortides  |                |             |
| juliol   | 5 sortides  | 3er. trimestre | 36 sortides |
| agost    | 11 sortides |                |             |
| setembre | 20 sortides |                |             |
| octubre  | 16 sortides | 4rt. trimestre | 30 sortides |
| novembre | 7 sortides  |                |             |
| desembre | 7 sortides  |                |             |

S'ha intentat de mantenir una mínima periodicitat de 4 visites mensuals. Tal i com es pot veure al setembre i octubre és quan es fa un major nombre de visites, això és degut a què en aquests mesos hi ha el pas migratori postnupcial, que sobretot a les muntanyes del Preparc és força espectacular. A la primavera també es realitzen bastantes visites atès que es produeix per una banda el pas prenupcial i per l'altra s'entra en el període reproductor.

El total d'hores que s'han dedicat a la recollida de dades en les sortides de camp és el següent:

|               |               |                |               |              |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 1er trimestre | 2on trimestre | 3er trimestre  | 4rt trimestre | TOTAL        |
| 47 h. 15 min. | 64 h. 25 min. | 103 h. 45 min. | 75 h. 20 min. | 290 h. 45 h. |

En general s'intenta diversificar els dies de visita i també els horaris, ja que així es poden contrastar millor les dades obtingudes. Els dies feiners els entorns del Parc gaudeixen d'una major tranquil.litat, en canvi els dies festius hi ha una notable presència de gent. Per aquesta raó es produeixen més alteracions a la calma que hi hauria d'haver als espais protegits. Ambtot, s'intenta d'anar-hi tant en feiners com en festius. Tot i que són molt millors els dies feiners, en els festius si s'hi va a primera hora encara hi ha tranquil.litat.

|           | 1er trimestre | 2on trimestre | 3er trimestre | 4rt trimestre | TOTAL   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| dilluns   | 2             | 0             | 5             | 2             | 9 dies  |
| dimarts   | 0             | 4             | 5             | 1             | 10 dies |
| dimecres  | 6             | 1             | 9             | 1             | 17 dies |
| dijous    | 2             | 2             | 4             | 5             | 13 dies |
| divendres | 0             | 6             | 5             | 8             | 19 dies |
| dissabte  | 1             | 2             | 4             | 7             | 14 dies |
| diumenge  | 3             | 4             | 4             | 6             | 17 dies |

Prioritàriament les visites es fan al matí, que és quan els ocells mostren major activitat. Al migdia solen restar més quietes i canten menys. A la tarda també s'hi acudeix força ja que és el moment que moltes espècies es desplacen cap als punts on s'ajiquen.

En alguns casos la sortida s'ha perllongat tot el matí i fins el migdia. En d'altres ocasions que s'hi ha anat de tarda s'ha esperat a què es fes fosc per tal de detectar la presència d'aus nocturnes

|        | 1er trimestre | 2on trimestre | 3er trimestre | 4rt trimestre | TOTAL   |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| matí   | 6             | 13            | 23            | 13            | 55 dies |
| migdia | 0             | 0             | 2             | 2             | 4 dies  |
| tarda  | 8             | 6             | 11            | 15            | 40 dies |

En la majoria d'ocasions s'ha anat a l'embassament i els seus entorns, sobretot la part de la cua, que és on hi ha una major diversitat d'ambients naturals i on les aus troben millors llocs per refugiar-se. Les muntanyes del preparc també han estat força seguides, en especial durant els passos migratoris. En alguna jornada s'ha fet una sortida mixta, és a dir que s'ha anat a l'embassament i a alguna muntanya del preparc.

|               | 1er trimestre | 2on trimestre | 3er trimestre | 4rt trimestre | TOTAL   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| pantà         | 12            | 13            | 10            | 12            | 47 dies |
| preparc       | 1             | 3             | 22            | 15            | 41 dies |
| pantà/preparc | 1             | 3             | 4             | 3             | 11 dies |

En concret les sortides s'han fet als següents llocs (hi ha dies que es fan dues sortides diferents, una al matí i una altra a la tarda, per exemple):

--primer trimestre--

3-1-2002 zones de la cua i centre de l'embassament, riu Foix i fondo de l'Alzina  
13-1-2002 zones de la cua, centre i presa de l'embassament  
23-1-2002 zones de la cua de l'embassament, riu Foix i Torrelletes  
27-1-2002 zones de la cua de l'embassament  
6-2-2002 mas Pigot, Bellestar i fondo de la Sanabra  
11-2-2002 zones de la cua de l'embassament i riu Foix  
20-2-2002 zones de la cua, centre i presa de l'embassament  
24-2-2002 zones de la cua i centre de l'embassament i fondo del Perot  
28-2-2002 zones de la cua, centre i presa, cal Balaguer i fondo del cau del Toixó  
6-3-2002 zones de la cua i centre de l'embassament, riu Foix i la Timba

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 13-3-2002 | zones de la cua, centre i presa de l'embassament |
| 16-3-2002 | zones de la cua i centre de l'embassament        |
| 20-3-2002 | zones de la cua, centre i presa de l'embassament |
| 25-3-2002 | zones de la cua de l'embassament i cal Semison   |

--segon trimestre--

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 2-4-2002  | zones de la cua de l'embassament                                       |
| 7-4-2002  | zones de la cua de l'embassament, riu Foix i Clariana                  |
| 9-4-2002  | zones de la cua i centre de l'embassament i riu Foix                   |
| 19-4-2002 | zones de la cua, centre, presa de l'embassament i riu Foix             |
| 19-4-2002 | fondo del Llampeig i Casa Alta                                         |
| 26-4-2002 | zones de la cua i centre de l'embassament i cal Semison                |
| 5-5-2002  | zones de la cua de l'embassament i Casa Alta                           |
| 12-5-2002 | riu Foix i fondo de l'Alzina                                           |
| 18-5-2002 | zones de la cua de l'embassament, cal Balaguer i fondo del Llampeig    |
| 23-5-2002 | zones de la cua de l'embassament, cal Semison i fondo de l'Alzina      |
| 28-5-2002 | riu Foix, casa Riera i convent de Sant Domingo de Penyafort            |
| 30-5-2002 | zones de la cua i centre de l'embassament                              |
| 7-6-2002  | zones de la cua de l'embassament, font d'Horta i cal Bladet            |
| 7-6-2002  | zones de la cua de l'embassament, riu Foix i fondo de l'Alzina         |
| 8-6-2002  | zones de la cua de l'embassament                                       |
| 16-6-2002 | Torrelletes, la Pòpia i roques Boveres                                 |
| 18-6-2002 | zones de la cua, centre i presa de l'embassament i fondo de mas Carlús |
| 26-6-2002 | zones de la cua, centre i presa de l'embassament                       |
| 28-6-2002 | fondo de l'Alzina                                                      |

--tercer trimestre--

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 5-7-2002  | Sant Domingo de Penyafort, font de st. Llorenç i maset del Rossell |
| 8-7-2002  | zones de la cua de l'embassament i fondo de l'Alzina               |
| 16-7-2002 | zones de la cua de l'embassament i riu Foix                        |
| 27-7-2002 | zones de la cua de l'embassament, Lurdes i fondo de l'Alzina       |
| 30-7-2002 | zones de la cua de l'embassament, font d'Horta i cal Semison       |
| 2-8-2002  | zones de la cua de l'embassament i fondo de l'Alzina               |
| 4-8-2002  | zones de la cua i centre de l'embassament i masia de la Creu       |
| 7-8-2002  | zones de la cua de l'embassament                                   |
| 7-8-2002  | roques Boveres                                                     |
| 15-8-2002 | zones de la cua de l'embassament, fondo de mas Carlús i riu Foix   |
| 20-8-2002 | zones de la cua de l'embassament                                   |
| 22-8-2002 | puig de l'Àliga i turó de les Tres Partions                        |
| 26-8-2002 | puig de l'Àliga                                                    |
| 28-8-2002 | zones de la cua de l'embassament i riu Foix                        |
| 28-8-2002 | turó de les Tres Partions                                          |
| 30-8-2002 | puig de l'Àliga                                                    |
| 3-9-2002  | turó de les Tres Partions                                          |
| 5-9-2002  | puig de l'Àliga                                                    |
| 6-9-2002  | zones de la cua i centre de l'embassament                          |
| 8-9-2002  | puig de l'Àliga                                                    |
| 9-9-2002  | turó de les Tres Partions                                          |
| 11-9-2002 | turó de les Tres Partions                                          |
| 11-9-2002 | turó de les Tres Partions                                          |
| 14-9-2002 | puig de l'Àliga                                                    |
| 17-9-2002 | zones de la cua de l'embassament i les Tortes                      |
| 18-9-2002 | puig de l'Àliga i turó de les Tres Partions                        |
| 21-9-2002 | puig de l'Àliga i turó de les Tres Partions                        |
| 22-9-2002 | puig de l'Àliga                                                    |
| 22-9-2002 | les Tortes                                                         |
| 23-9-2002 | turó de les Tres Partions                                          |
| 23-9-2002 | zones de la cua, centre i presa de l'embassament                   |

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 25-9-2002 | muntanya de cal Bladet                                        |
| 25-9-2002 | puig de l'Àliga                                               |
| 26-9-2002 | turó de les Tres Partions                                     |
| 27-9-2002 | zones de la cua, centre i presa de l'embassament i les Tortes |
| 28-9-2002 | turó de les Tres Partions                                     |

--quart trimestre--

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1-10-2002  | turó de les Tres Partions                                 |
| 3-10-2002  | zones de la cua de l'embassament i les Tortes             |
| 3-10-2002  | turó de les Tres Partions                                 |
| 5-10-2002  | turó de les Tres Partions                                 |
| 6-10-2002  | puig de l'Àliga                                           |
| 7-10-2002  | turó de les Tres Partions                                 |
| 12-10-2002 | les Tortes                                                |
| 13-10-2002 | turó de les Tres Partions                                 |
| 14-10-2002 | puig de l'Àliga i turó de les Tres Partions               |
| 18-10-2002 | zones de la cua de l'embassament                          |
| 18-10-2002 | fondo del Llampeig                                        |
| 19-10-2002 | les Tortes                                                |
| 20-10-2002 | puig de l'Àliga i turó de les Tres Partions               |
| 25-10-2002 | zones de la cua de l'embassament i riu Foix               |
| 25-10-2002 | puig de l'Àliga i turó de les Tres Partions               |
| 27-10-2002 | turó de les Tres Partions                                 |
| 3-11-2002  | zones de la presa de l'embassament                        |
| 7-11-2002  | zones de la cua i centre de l'embassament                 |
| 15-11-2002 | convent de Sant Domingo de Penyafort i Bellestar          |
| 16-11-2002 | zones de la cua, centre i presa de l'embassament i Lurdes |
| 23-11-2002 | zones de la cua de l'embassament                          |
| 29-11-2002 | fondo de l'Alzina                                         |
| 30-11-2002 | zones de la cua de l'embassament                          |
| 6-12-2002  | zones de la cua i centre de l'embassament, cal Semison    |
| 12-12-2002 | zones de la cua i centre de l'embassament i Clariana      |
| 13-12-2002 | convent de Sant Domingo de Penyafort                      |
| 15-12-2002 | zones de la cua de l'embassament, riu Foix i Torrelletes  |
| 21-12-2002 | zones de la cua de l'embassament i riu Foix               |
| 25-12-2002 | zones de la cua de l'embassament, riu Foix i la Timba     |
| 26-12-2002 | zones de la cua de l'embassament i fondo de mas Carlús    |

A tall d'anècdota o curiositat hem de fer constar que aquest any en les sortides primaverals que hem fet per alguns fondos de les muntanyes del preparc ens hem trobat amb moltes paparres. En concret a la sortida del 16-6-2002 va ser una cosa fora de la normalitat; ens vam haver de treure alguns centenars d'aquests animalons que s'arrapaven a la nostra roba. Al fer deu o quinze passes ja en tenies 10 o 15 enfilant-se pantalons amunt.

#### \* Nivell de les aigües a l'embassament

El 2002 ha estat un any en què el nivell de les aigües de l'embassament s'ha mantingut força alt. Tan sols durant algunes setmanes dels mesos de juliol i agost hi ha hagut una baixada un xic acusada i s'ha arribat a les cotes més baixes de l'any. En concret es va arribar a baixar fins aproximadament els 130 centímetres. Res a veure amb els dos anys anteriors. Els litres d'aigua caiguts en les precipitacions del 2002 al Parc del Foix i als entorns, han estat superiors als dels darrers anys. Aquest ha estat el principal factor que ha permès de mantenir un alt nivell de l'embassament.

Cal destacar que al llarg de l'any han caigut pluges torrencials, i hi ha hagut riuades en diverses ocasions. En aquestes riuades hi sol haver una aportació de sediments, de matèria vegetal (troncs, canyes, etc) i de deixalles força notable. Durant un cert temps la capa superficial de l'aigua, a certes parts del pantà, queda bruta per aquests materials. Passades unes setmanes van a parar al fons, i la superfície de l'aigua torna a quedar més neta.

Per altra banda cal estar alerta quan plou força i baixa rierada, sembla ser que hi podria haver alguns abocaments il·legals. Tot aprofitant el descontrol que ocasionen les rierades alguna fàbrica sembla que aboca residus al riu Foix, a més les depuradores no deuen donar a l'abast i l'aigua no es depura suficientment.

Enguany (a partir de la tardor) a causa de les riuades s'ha malmès una mica el canyissar que hi ha a la cua de l'embassament, pensem que durant la propera primavera es recuperarà de forma natural.

El predomini d'un nivell alt al llarg de l'any, ha afavorit a la major part d'aus aquàtiques, especialment a les que nidifiquen al pantà. Els moments en què l'embassament assoleix la seva cota màxima són els que afavoreixen més la presència de determinades espècies, i sobretot és quan la seva seguretat queda garantida de la millor forma, ja que la mateixa aigua evita el pas de certs depredadors (per exemple l'home o els gats) a les zones de nidificació.

#### \* Meteorologia

Aquest any 2002 no ha fet gaire fred. Evidentment durant els tres primers mesos de l'any i els dos darrers s'han registrat temperatures força baixes, però en cap cas s'ha arribat a temperatures inferiors als zero graus centígrads. En aquests mesos d'hivern alguns dies es van recollir temperatures màximes força elevades.

La calor estival no ha estat gaire accentuada. El mes de juny va ser quan es van obtenir els registres mes alts, hi va haver bastants dies que es van superar els 30 graus. En canvi al juliol i a l'agost, tot i que també va fer calor, aquesta va ser molt moderada, les temperatures van superar els 30 graus més aviat en poques ocasions.

Després de tres anys força secs, aquest 2002 ha estat molt plujós. Els mesos que menys ha plogut poc han estat el febrer i el juliol. Els mesos d'abril, maig, agost, setembre, octubre, novembre i desembre ha plogut força. En concret hi ha hagut diversos mesos en què s'han arribat a superar els cent litres de pluja per metre quadrat.

El total d'aigua recollida al llarg de l'any va doblar la xifra de l'any anterior. A l'observatori de Casa Riera (prop de les Masuques) es van recollir 675 l/m<sup>2</sup>. En dos observatoris de Vilafranca es van recollir 794,5 l/m<sup>2</sup> i 801,2 l/m<sup>2</sup>. A l'observatori del Vendrell es va arribar al total de 857,7 l/m<sup>2</sup>. A l'observatori de Vilanova es va arribar al total de 740,2 l/m<sup>2</sup>.

En resum diríem que ha estat un any poc fred i molt plujós.

Les dades meteorològiques a partir de les quals hem redactat els paràgrafs precedents han estat obtingudes mercès a dos observatoris meteorològics.

El primer observatori que ens ha facilitat dades està situat a Vilafranca, a uns tres o quatre quilòmetres del Parc del Foix i uns deu quilòmetres de l'embassament.

El segon observatori que ens ha facilitat dades està situat a la masia Casa Riera, al costat mateix del riu Foix, prop de les Masuques, però dins del terme municipal de Santa Margarida i els Monjos. És a dir que aquest segon observatori estaria ubicat al Parc del Foix.

Hi pot haver hagut petites diferències entre les dades d'un i altre observatori. Diferències que no tenen gran importància si tenim en compte que, per exemple entre l'embassament i el turó de les Tres Partions aquestes diferències també es produeixen, i a vegades de forma més accentuada.

Al final de la memòria s'adjunta un annex amb les dades meteorològiques facilitades pels dos observatoris.

En primer lloc per l'Estació de Viticultura i Enologia de l'Institut Català de la Vinya i el Vi de la Generalitat de Catalunya, són dades recollides al Penedès a través de la seu de Vilafranca del Penedès. S'hi inclou informació diària de temperatura ambient, temperatura màxima, temperatura mínima, oscil·lació de la temperatura, temperatura mitjana, pluviometria, evaporació, vent i hores de sol. També hi ha les mitjanes i els totals de cada mes i de cada deu dies.

En segon lloc per l'observatori de l'empresa TN-PRODUCCIONS, i recollides pel meteoròleg Toni Mestres a la masia Casa Riera. Es tracta d'uns gràfics mensuals que per una banda recullen la temperatura ambient les 24 hores del dia (per tant hi podem trobar les màximes i mínimes) i per una altra banda hi ha les quantitats de pluja diàries. Al peu del gràfic hi ha indicades d'altres informacions (sobre el vent, humitat, pressió atmosfèrica, radiació solar, etc.) que també es podrien demanar si fos del nostre interès.

A continuació hi ha un gràfic resum de l'any amb les temperatures màximes i mínimes (en valors absoluts) recollides a l'observatori de Casa Riera. I un altre gràfic resum anual dels dies i quantitats de pluja recollides en aquest mateix observatori.

#### \* Acció de l'home sobre el medi

De la mateixa manera que ja ho havíem comentat en informes anteriors, cal destacar totes aquelles accions que des de la direcció del Parc del Foix es desenvolupen encaminades a la preservació d'aquest espai natural. Les feines de vigilància, informació i sensibilització que estan duent a terme els guardes del Parc és fonamental. També d'altres tasques de manteniment i la resolució dels problemes puntuals que poden anar apareixent, avancen mercès a la labor dels guardes. Així doncs tot l'equip humà que treballa per al Parc del Foix ha estat un punt clau en la conservació del medi, i han lluitat per evitar o solucionar les constants agressions a què es veu sotmès. Des de fa uns anys s'ha començat a entreveure una perspectiva molt clara de conservació per al futur d'aquest territori.

En general cada cop es va notant una major conscienciació dels visitants respecte la preservació de la natura. Amb tot encara cal vetllar el cert descontrol que hi ha sobretot a les tardes d'algunes vigílies o de dies festius (motocicletes,...) o alguns abocaments de deixalles en les zones més concorregudes.

Entre les moltes accions que s'han dut a terme des de la direcció del parc cal assenyalar l'edició de diversos tríptics informatius. La difusió dels tríptics sobretot es fa entre un bon nombre de visitants que acudeixen al centre d'informació o que es posen en contacte amb els guardes del parc. Cal destacar els tríptics d'informació general sobre el parc, i també els que fan referència a aspectes més concrets com ara els ocells, la pesca, els incendis, la campanya de preservació de la tortuga de rierol, les migracions de tardor, algun itinerari, etc.

L'aguait que es va construir el passat 2001, aquest 2002 es va deixar enllestit (hi faltaven bancs per seure). També es va posar una cadena al camí, per tal d'evitar l'accés motoritzat fins a l'aguait. Així doncs, que ja ha entrat en ple funcionament. Ara caldrà millorar-lo pel que fa a oferir informació de cara als visitants. Aquest aguait ha quedat situat en una zona òptima per a l'observació de les aus (sempre i quan el nivell de les aigües es mantingui alt), just al seu davant hi tenim un dels millors llocs on observar ocells del Parc del Foix. A més de diferents ambients naturals propis de les zones humides (zones de canyissars i de canyar, bosc de ribera...) habitualment és dels llocs on hi ha una major diversitat d'espècies.

En referència a l'illa que a l'octubre del 1998 es va construir a la cua de l'embassament ha començat a agafar una certa importància com a punt estratègic de repòs i tranquil·litat per a algunes aus. Aquesta illa és fàcilment observable des del mateix aguait.

En relació a la campanya de preservació de la tortuga de rierol enfront de les espècies al·lòctones que hi competeixen (sobretot les tortugues de Florida) que es duu a terme al Parc del Foix, pensem que cal seguir actuant. Nosaltres mateixos hem recollit dues femelles de tortuga de Florida que de bon matí sortien, o potser ja tornaven, de fer la posta. Una el 7-6-2002 al camí del fondo de l'Alzina i una altra el 18-6-2002 al camp d'oliveres de sota Castellet. Aquests exemplars un cop recollits es van lliurar als guardes del parc i posteriorment són traslladats al C.R.A.R.C. de Masquefa. Ja l'any anterior, el 7-7-2001, se n'havia recollit una. També en una altra data (9-8-2002) es va agafar una altra tortuga de Florida riu Foix amunt, fora dels límits del parc, per la zona de Rodamilans al municipi de Sant Martí Sarroca. Malauradament encara hi ha molts exemplars que caldrà anar retirant mica a mica.

Per altra banda en alguna sortida (el 15-8-2002 i dies anteriors), en passar per la zona del camp d'oliveres de sota Castellet, s'han descobert un alt nombre de postes de tortuga enterrades en aquest conreu. Moltes de les quals s'han trobat depredades, possiblement per alguna guineu.

Pensem que una de les accions que es podrien dur a terme de cara als propers anys és la de fer una passejada per les zones on surten a pondre aquestes tortugues, així se'n podrien recollir algunes. En tot cas es podria esbrinar a quines hores i en quines dates surten a fer la posta per tal d'incidir-hi amb major efectivitat. Amb les poques dades de què disposem nosaltres, tot apunta a què cal estar a l'aguait des de finals de maig (o abans) fins a l'agost (possiblement principis d'agost). Pel que fa a l'horari, en totes les ocasions les hem trobat de bon matí, però probablement caldria anar-hi abans, en plena nit.

El passat 2001 es va produir l'ampliació del Parc del Foix cap al municipi de Santa Margarida i Els Monjos. Fins aleshores no s'hi havia anat massa. Aquest any 2002 ja s'hi han realitzat diverses prospeccions per tal de millorar els nostres coneixements sobre la fauna d'aquest territori. Tot i que hi ha zones fortament transformades per l'activitat humana, també n'hi ha de gran valor natural; fruit de la riquesa que comporta la combinació de les terres agrícoles amb les forestals. En destaquem algunes zones de màquies i garrigues a la zona de les muntanyes de la Pòpia i també les clapes de bosc de ribera que flanquegen bona part del riu Foix.

En els nostres quaderns de camp han quedat anotades algunes accions irregulars per a les quals en un futur cal preveure solucions, o millor encara, mirar si es poden prevenir. Fem constar que enguany n'hi ha menys que l'any passat, d'anotacions d'aquesta mena.

11-2-2002 Algú ha tallat canyes a la cua de l'embassament

11-2-2002 A prop de Castellet hi ha un cotxe d'ocellaires, amb almenys 10 gàbies al seu interior. Possiblement sols ha fet una parada al Parc del Foix, però per uns moments ens fa pensar que potser ha plantat paranyes per la zona.

6-3-2002 Un gat volta pels canyissars de la cua de l'embassament.

25-3-2002 Dues persones busquen espàrrecs per la vora de l'aigua en una zona restringida.

25-3-2002 Diverses persones passegen amb dos gossos vora l'aigua en una zona d'accés restringit.

18-6-2002 A la presa hi ha 4 carpins i una serp d'aigua morts

26-6-2002 Al fondo de l'Alzina hi ha algunes carpes mortes

6-12-2002 Un home entra a collir plantes en una zona d'accés restringit.

6-12-2002 Un gat volta pels canyissars de la cua de l'embassament

6-12-2002 Un home passeja per la zona dels canyissars i es dedica a molestar les aus

25-12-2002 Un gat volta pels canyissars de la cua de l'embassament

25-12-2002 Hi ha algun caçador per la zona de la Timba i riu Foix.

Desembre 2002 Un familiar que ha vingut al Pantà, ens explica que un diumenge de desembre hi havia diversa gent que sortia de la presa carregada de molsa.

També cal fer constar que l'obertura de nous camins pot comportar greus amenaces per a la fauna protegida. En concret per la zona del Corral de la Muntanya se n'ha obert un, i també un altre del turó de les Tres Partions cap a la Plana Morta. Aquests camins poden perjudicar directament a l'àliga cuabarrada, una parella de les quals habita al Parc del Foix. Aquesta és una espècie amenaçada a nivell mundial, i per tant cal ésser molt respectuosos amb les seves àrees de nidificació i caça.

L'obertura de més i més camins en determinades àrees forestals, l'únic que fa és agredir i esquarterar el paisatge. Aquests camins, que han estat fets amb bones intencions, per tal de facilitar l'accés al bosc quan hi ha un incendi, sovint acaben per ser perjudicials, ja que hi pot accedir gent que aboca deixalles, o fins i tot hi van a fer la costellada amb el conseqüent perill d'incendi.

Per la zona de cal Cassanyes s'hi ha estat fent una roturació. Cal tenir present que les zones boscoses ja han estat castigades pel foc algunes vegades, i que en conjunt la massa forestal del Parc del Foix és més aviat pobra. Cal anar amb molt de compte amb els mètodes de roturació que es fan servir, i per exemple evitar de malmetre els arbres grans, els marges, respectar l'època de cria dels animals, etc...

La riera de Marmellar fins ara sempre ens havia semblat que presentava molt bones condicions pel que fa a la qualitat de l'aigua. Aquest any 2002 hem detectat puntualmet la presència d'alguns abocaments de contaminants. Sembla ser que poden provenir del nou polígon industrial que s'ha estat construint uns pocs quilòmetres més amunt. Caldria vetllar per tal que això no passi, i en tot cas fer-ho saber a les autoritats corresponents, ja que és inacceptable que unes indústries acabades de construir no hagin previst la depuració i eliminació dels residus que produeixen.

De la mateixa manera que en anys anteriors, deixem constància d'alguns aspectes sobre els quals val la pena reflexionar, i si és possible millorar en la mesura de les nostres possibilitats, amb tot ens cal dir que poc a poc ja es van notant avenços.

#### 1- Aspectes relacionats amb l'aigua:

- La qualitat de l'aigua (contaminants).
- La navegació no controlada ni permesa d'embarcacions.
- La pesca fora de les zones establertes.
- Vehicles tirats a l'aigua.
- El vol d'aparells motors prop de l'aigua.
- Arribada de deixalles a través de les rierades.

#### 2- Aspectes relacionats amb les infraestructures humanes:

- La contaminació acústica d'alguns dies (sobretot els festius hi ha joves amb motos fent curses per la carretera).
- La mort d'animals atropellats a la carretera.
- L'aïllament i senyalització de les línies elèctriques, o el seu soterrament (per evitar electrocucions de cigonyes o rapinyaires per exemple).

#### 3- Aspectes relacionats amb les zones forestals:

- El foc al bosc.
- Cotxes cremats prop de zones forestals.
- L'abocament de deixalles.
- La tala no controlada d'arbres, de canyes o altres plantes.
- L'accés humà a determinats llocs (cal vetllar d'una forma molt especial per



la tranquil·litat a les zones de nidificació i als dormidors) En especial cal vigilar a l'època dels espàrrecs i a la dels bolets.

#### 4- Aspectes relacionats amb animals:

- La caça abusiva als entorns del Parc.
- La introducció d'animals no autòctons (oques, peixos, tortugues, etc).
- La presència de gats i gossos solts.

És evident que cadascun dels aspectes que acabem de detallar afecten amb major o menor incidència la qualitat del Parc. També hi ha aspectes sobre els quals ja s'ha notat una incidència i que per tant han millorat de forma molt considerable. Hi ha algun punt que potser ha quedat una mica de banda i caldria estudiar possibles propostes per reconduir la situació.

En anys anteriors ja vam alertar de les conseqüències de la baixada del nivell d'aigua de l'embassament i de la necessitat de construir una represa que mantingui el nivell alt a la cua del pantà. Una represa ja eliminaria una part substancial dels sediments que arriben a l'embassament, a més, en el cas de contenir macròfits, incrementaria la qualitat de l'aigua, sobretot però, es mantindria el nivell al màxim en la zona que potencialment té un major interès natural del Parc el Foix. Fins i tot n'hi podria haver més d'una de represa, a mode de basses de decantació.

#### \* El projecte Ardea 2000

Fem un breu repàs al que s'havia esdevingut en els darrers temps: Al llarg del 1998, 1999 i 2000 aquesta au aquàtica ja havia mostrat indicis reproductors, sobretot actituds de zel, també s'havia vist algun exemplar transportant branques, com si volgués fer niu. A finals de l'any 1999 es van col·locar 9 plataformes (simulant nius) repartides per tres zones de la cua. Ben aviat els bernats pescaires es van acostumar a la presència dels materials, i el 13-2-2000 per primera vegada observem a dos bernats aturats al damunt les plataformes. Al llarg del 2000 s'hi van anar observant en diferents dates, fins i tot en una ocasió un adult arreglava les branques de la base. Cada vegada es veia més a prop la nidificació del berrat pescaire al Parc del Foix. Per falta d'aigua a l'embassament el 2001 es van aturar els avenços obtinguts, i hi va haver molt poques observacions de bernats aturats a les plataformes. Aquest 2002 s'ha tornat a la situació del 2000, és a dir que els bernats s'han tornat a fer seves les plataformes i se'ls ha vist regularment aturats i reposant per aquesta zona. Potser, ara que ja han passat 3 anys des de la col·locació de les plataformes caldria fer-ne una revisió per veure s'hi s'han malmès gaire a causa de les inclemències del temps.

Les observacions més destacades del 2002 han estat:

El dia 13-3-2002 anotem actituds de zel en dues parelles diferents.

El 20-4-2002 una parella mostra actituds de zel.

El 7-4-2002 un exemplar aturat al niu número 6 de la zona 2

El 5-5-2002 un exemplar aturat al niu número 2 de la zona 1

El 23-5-2002 un exemplar aturat al niu número 4 de la zona 2

El 7-6-2002 un exemplar aturat al niu número 2 de la zona 1

El 27-7-2002 i en d'altres dates hi ha bernats pescaires aturats als pins de les plataformes, tot i que no estan damunt dels nius artificials.

#### \* Seguiment de les migracions d'aus rapinyaires i celebració del dia internacional de les aus

Aquest ha estat el cinquè any que es realitzava aquesta "Campanya de seguiment de migracions d'aus rapinyaires al Penedès, tardor-2002". El mes de setembre es van aplegar alguns aficionats a la natura al puig de l'Àliga i al turó de les Tres Partions, gent que ja havia vingut en edicions anteriors i també gent que hi acudia per primera vegada.

La celebració del dia internacional de les aus, va ser un èxit. Es van alliberar dos xoriguers, un astor i dos mussols. L'assistència de públic va ser molt nombrosa, des de mainada fins a gent gran, també van ser-hi presents alguns agents forestals. Aquest any a més va venir un equip de TV3, a filmar l'alliberament. El mateix dissabte va sortir un tall de les imatges que havien pres al telenotícies del vespre.

Amb motiu d'aquest conjunt d'activitats es van repartir uns fulletons informatius, que a més permetien reconèixer les siluetes dels principals rapinyaires migrants. Van ser molt ben acollits entre els assistents, a més es van enviar als mitjans de comunicació (premsa i ràdio) de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

El balanç de persones que van participar en aquests actes fou el següent:

14-9-2002 observació migracions al matí - 22 persones  
21-9-2002 observació migracions al matí - 23 persones  
5-10-2002 celebració del dia internacional de les aus - 70 persones

#### \* El cens d'ocells hivernants

Aquest any 2002 també es va participar en el "Cens Hivernal d'Ocells Aquàtics" organitzat per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb "Wetlands international - International Waterbird Census Western Palearctic". Durant el dia 13-1-2002 es van recollir dades quantitatives de totes les espècies d'aus detectades. Els resultats es van trametre a l'organització d'aquest cens. Amb les informacions del pantà de Foix i tota la resta de dades recollides a Catalunya se n'elabora un informe a nivell nacional, que a la seva vegada després forma part d'un altre informe a nivell europeu.

En concret s'hi va anar a la tarda des de les 15 hores fins a les 18,30 hores. Es va aprofitar per visitar les joques d'algunes espècies, així és molt millor a l'hora de contar les quantitats. Per exemple de corb marí gros se'n van contar 165, de repicatalons uns 200 i de cruixidells a l'entorn de 30. En total es van anotar 45 espècies diferents d'aus, entre les que es consideren aquàtiques i les que no s'hi consideren.

#### \* El programa SOCC

El SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya) és un programa de seguiment de l'avifauna impulsat des de la Institut Català d'Ornitologia – ICO, abans anomenat Grup Català d'Anellament. Aquest programa compta amb el suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del SOCC és conèixer les tendències temporals que es produeixen en l'abundància dels ocells comuns a Catalunya, factor essencial per poder determinar l'estat de conservació de les diferents espècies d'ocells i dels seus hàbitats. Es tracta d'un programa de seguiment continu, que requereix un esforç reduït (quatre matins per any) però mantingut any rera any.

El SOCC es basa en el transecte com a mètode per obtenir índexs d'abundància de les diferents espècies d'ocells. Arreu de Catalunya se segueixen unes pautes comunes per tal que les dades es puguin comparar al llarg dels anys. Els transectes han de mesurar aproximadament uns 3 quilòmetres, i han d'estar dividits en 6 seccions de longituds similars. S'han de realitzar al matí, entre la sortida del sol i les quatre hores següents, cada vegada que es fa l'itinerari almenys s'hi ha d'invertir un mínim de dues hores. Els 4 censos que es fan cada any han de programar-se de la següent manera: dos censos hivernals; un al gener i un al desembre, i dos censos en època de nidificació; el primer entre el 15 d'abril i el 15 de maig, i el segon entre el 15 de maig i el 15 de juny. A l'hora de fer els censos cal que hi hagi unes determinades condicions meteorològiques favorables, si no s'ha d'esperar a un altre dia.

Aquest 2002 per primera vegada hem participat en el programa SOCC, i a més ho hem fet escollint un transecte per l'interior del Parc del Foix. D'entre les categories establertes des de l'ICO es participa en la de "mostreig en ambients mediterranis". En concret s'ha escollit un recorregut que té el seu inici a cal Bladet i que passa per cal Semison (veure el planell en un dels annexes de la memòria). El recorregut transcorre per diferents ambients naturals entre els quals l'alzinar, la pineda, la brolla i els conreus. L'itinerari es realitza per partida doble, en cada una de les jornades hi participen dos ornitòlegs que van separats uns 50 o 100 metres i que prenen nota de les observacions per separat.

Aquest any 2002 les dates en què s'ha realitzat l'activitat són les següents:

- 1er cens hivernal – no realitzat (encara no es participava al SOCC)
- 1er cens època de nidificació – 26-4-2002
- 2n cens època de nidificació – 23-5-2002
- 2n cens hivernal – 6-12-2002

Al final de la memòria, en els annexes, s'hi ha inclòs una còpia de les fitxes de recollida de dades dels diferents mostreigs del SOCC 2002 que s'han enviat a l'ICO.

#### Els ocells del Parc al 2002

El total d'espècies que nosaltres tenim citades al llarg dels darrers 50 anys al Parc del Foix ha quedat en 215, aquesta xifra ha augmentat de 5 espècies més que el passat any 2001. Destaquem el control per primera vegada al Parc del Foix segons els nostres arxius de les següents aus.

1er. trimestre

Ànec carolí (*Aix sponsa*) 20-3-2002

2on. trimestre

Xatrac gros (*Sterna caspia*) 12-4-2002

Terrerola vulgar (*Calandrella brachydactyla*) 22-5-2002

3er. trimestre

Còbit roquer (*Oenanthe leucura*) 3-8-2002

Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*) 18-9-2002

4rt. trimestre

---

D'aquestes aus citades per primera vegada al Parc del Foix, podem observar que n'hi ha una que correspon a una espècie al·lòctona. Possiblement es tracti d'ocells escapats de la vida en captivitat o bé alliberats per algú. Ens referim a l'ànec carolí.

El cas del còbit roquer possiblement correspon a una dispersió postnupcial. No molt lluny del Parc del Foix hi ha algunes zones de nidificació d'aquesta espècie per exemple al Garraf i al Montmell. Per altra banda caldrà estar a l'aguait per si alguna parella s'instal·la al Parc del Foix, ja que hi pot trobar ambients naturals favorables.

La resta de citacions de noves espècies (xatrac gros, terrerola vulgar i àliga calçada) corresponen a aus que en les seves migracions travessen les nostres comarques i que aquest any s'han pogut observar al Parc del Foix. Es tracta d'espècies poc abundants.

Al llarg de cada trimestre s'han anat observant aus de diferents espècies, aquest 2002 el total anual ha arribat a 154 ocells diferents anotats. Durant cada un dels trimestres hi ha hagut observacions d'un bon nombre d'espècies, en general se'n detecten més quan en un trimestre s'agafa un període migratori. Vegem com han quedat els totals d'espècies observades per trimestre.

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1er. trimestre | 91 espècies diferents  |
| 2on. trimestre | 112 espècies diferents |
| 3er. trimestre | 109 espècies diferents |
| 4rt. trimestre | 90 espècies diferents  |

Tot seguit anem a fer un comentari de cada una de les espècies observades. La redacció del text es fa a partir de les dades obtingudes en les visites que hem dut a terme durant l'any 2002 al Parc del Foix. Amb tot quan calgui s'utilitzaran dades recollides en anys anteriors per tal d'establir alguna comparació o per parlar de la variació que s'ha còpsat en algunes espècies.

Aquest any hem introduït un seguit de taules referents a la fenologia, nidificació, densitat, etc. que s'han adaptat a cada espècie. Aquestes taules han estat confeccionades a partir de les observacions recollides als nostres arxius al llarg dels darrers 10 anys.

Hem recopilat unes quantes observacions dels guardes del Parc del Foix, de guardes forestals, o d'altres persones aficionades a la natura, les que hem cregut que podien tenir major interès apareixen en el text seguides entre parèntesi de les inicials de la persona col·laboradora. Les persones de qui hem obtingut informacions són: Pere Xavier Albornà, (PAR), Martí Cardona (MCM), Frederic Casas (FCF), Jordi Cruells (JCR), Helena Estevan (HEH), Montse Mercadé (MMS), Marc Peris (MPM), Domingo Serrano (DSC), Jordi Serrano (JSA), Joaquim Soler (JSM) i Pedro Torres (PTE). Les observacions que no van seguides de cap d'aquestes inicials, cal atribuir-les a l'equip redactor de la memòria.

### **Cabusset** (*Tachybaptus ruficollis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |

|             |   |
|-------------|---|
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Abril - juny       | x |
| Juliol - setembre  | x |
| Octubre - desembre | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

Comentaris sobre la nidificació - El 2-8-2002 s'observa un exemplar jove. Aquesta espècie els darrers anys va experimentar una regressió, i per exemple el passat 2001 no va nidificar al pantà. Aquest 2002 sembla que li ha estat favorable (sobretot pel nivell de les aigües) i ha tornat a reproduir-se en aquest espai natural. Fa anys hi havien niat més de 10 parelles, aquest any la quantitat ha estat molt menor.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

### **Cabussó emplomallat** (*Podiceps cristatus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1995, 1996, 1998, 2000 i 2001

### **Cabussó collnegre** (*Podiceps nigricollis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - El 25-8-2002 (PTE) s'anota un exemplar a la zona dels pollancre de cal Bladet. Es tracta d'una espècie que de forma esporàdica ds darrers anys s'ha vist alguns dies per l'embassament, en èpoques de pas o a l'hivern.

### **Corb marí gros** (*Phalacrocorax carbo*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant

última citació prenupcial – 16-4-2002 (PAR, DSC)  
primera citació postnupcial – 20-8-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        |   |  |
| Augmenta                                                       | x |  |

Observacions d'interès - Durant l'hivern l'embassament acull més d'un centenar d'exemplars. De dia la majoria de corbs marins resten al pantà, n'hi ha un petit percentatge que es dispersen cap a altres zones humides properes. S'han vist a l'embocadura del riu Foix i les platges de Cubelles, al port de Vilanova i la Geltrú, o als pèlags de les guixeres de Vilobí.

El 13-1-2002 al dormider n'hi ha 165, el dia 11-2-2002 n'hi ha 162, el 23-11-2002 n'hi ha 94, el 15-12-2002 n'hi ha 125 i el 26-12-2002 n'hi ha 137. En general doncs, n'hi ha una quantitat força numerosa. Les darreres setmanes de l'any han ampliat la zona dels dormiders. Ara a més d'ocupar diversos exemplars de pi blanc, també n'hi ha d'instal.lats en pollancre.

El 30-11-2002 un exemplar ha agafat una anguila d'uns 60 a 70 centímetres. Té problemes per empassar-se-la, ja que gairebé no li cap al pap. Al seu costat hi ha dos o tres corbs marins més que intenten de prendre-li.

El 28-2-2002 ja s'observen exemplars amb plomatge estival

Com en anys anteriors la marxa cap als territoris de cria es va iniciar a l'entorn del mes de març, de forma graonada van anar minvant, i a l'abril es van observar els darrers exemplars. Els exemplars juvenils són els que aprofiten fins a darrera hora per mantindre's al pantà de Foix, ja que poden pescar carpes amb relativa facilitat.

Durant els períodes de pas migratori es poden observar exemplars migrants des de qualsevol lloc del Parc del Foix, fins i tot des del puig de l'Àliga i el turó de les Tres Partions. Els dies 25-3-2002 i 3-9-2002 s'anoten petits grups en vol migratori.

### **Martinet menut** (*Ixobrychus minutus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   | ? |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  |   |
| Octubre - desembre                    |  |   |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          | x        |             |
| anys anteriors |       |          | x        |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  | x |
| 10 a 100                          |  |   |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |  |   |
| Conreus, ermots i marges                     |  |   |
| Penya-segats i roquissars                    |  |   |
| Màquies i garrigues                          |  |   |
| Bosc                                         |  |   |
| Zones humides                                |  | x |

Observacions d'interès - Ha estat observat comptades vegades els mesos d'abril, maig i juny d'aquest any. Les darreres citacions, del 23-5-2002 i del 12-6-2002 (PTE, PAR), ens fan pensar en possibilitats de cria per a aquesta espècie. Els seus hàbits discrets i amagadissos dificulten el poder confirmar si realment algun dels darrers anys ha niat al Parc del Foix.

### **Martinet de nit** (*Nycticorax nycticorax*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |  |
|-------------|--|--|
| - sedentari |  |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Gener - març                          |  |  |

|             |   |
|-------------|---|
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Abril - juny       |   |
| Juliol - setembre  | x |
| Octubre - desembre |   |

Observacions d'interès - És una espècie que es cita poques vegades, tant al pas prenupcial com al postnupcial. El dia 15-8-2002 vam poder observar 4 exemplars. També tenim notícia de dues observacions més, corresponents al 2-7-2002 (PAR) i al 12-9-2002 (PTE, PAR).

### **Martinet ros** (*Ardeola ralloides*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - El martinet ros és una espècie molt escassa que els darrers anys s'ha anat veient en algunes èpoques de pas. Les citacions són molt escasses, però potser cada vegada una mica menys. El 6-5-2002 s'anota un exemplar a la zona de Clarianacal (PTE, JCR).

### **Esplugabous** (*Bubulcus ibis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Observacions d'interès - El dia 13-1-2002 poc després de la posta del sol passen un grup de 10 exemplars i un altre de 5 exemplars. Volen alts seguint la vall de Foix en direcció a la costa.

Els hiverns anteriors al 2000 era una au habitual a l'embassament, ja que hi acudia a dormir diàriament i amb una quantitat que solia rondar el centenar d'exemplars. Els dos darrers anys hem de considerar que és un ocell més aviat estrany i difícil de veure al Parc del Foix. Solament s'ha observat unes poques vegades; exemplars que hi passen en vol i que ni tan sols s'aturen al pantà. És molt possible que en trobar condicions desfavorables durant un cert temps (nivell massa baix al pantà) vagin optar per cercar un nou punt on ajocar-se i d'aleshores ençà han deixat de fer-ho a l'embassament.

### **Martinet blanc** (*Egretta garzetta*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Observacions d'interès - De la mateixa manera que ja vam comentar l'any passat ha minvat força. Ha desaparegut la concentració que s'havia produït els darrers hiverns, en què s'havien ajocat un bon nombre de martinets blancs a la cua de l'embassament.

### **Agró blanc** (*Egretta alba*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998 i 1999

### **Bernat pescaire** (*Ardea cinerea*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  | x |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  | x |
| - de pas    |  | x |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------------------------|--|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |  |   |
| Estable                                                        |  | x |
| Augmenta                                                       |  |   |

Observacions d'interès - És la sisena temporada consecutiva en què es veu aquesta au durant tots els mesos de l'any al pantà de Foix. Tot i que a l'estiu hi ha menys exemplars, en general n'hi podem trobar entre deu i vint. Sovint es concentren a la cua de l'embassament, però quan cerquen aliment es reparteixen arreu de les aigües estancades, fins i tot riu Foix amunt i a d'altres torrenteres dels voltants.

Tot i que no s'ha pogut constatar la seva nidificació, d'uns anys ençà es vénen reproduint tot un seguit d'actituds de festeig, que ens porten a pensar que aquesta au tard o d'hora es reproduirà al Parc del Foix. El dia 13-3-2002 anotem actituds de zel en dues parelles diferents. El 20-4-2002 una parella mostra actituds de zel. Els dies 7-4-2002, 5-5-2002, 23-5-2002, 7-6-2002 i 27-7-2002 hi ha algun bernat damunt alguna de les plataformes que es van col·locar a mode de nius artificials.

En el redactat corresponent al projecte "Ardea 2000" (veure pàgines anteriors d'aquesta memòria) es recull informació diversa sobre alguns comportaments del bernat pescaire al Parc del Foix.

En alguna ocasió s'han observat exemplars en vol migratori que travessaven les terres del parc.

### **Agró roig** (*Ardea purpurea*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  |   |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  | x |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Migrant  
primera citació prenupcial – 7-4-2002  
última citació prenupcial – 8-6-2002  
primera citació postnupcial – 8-7-2002  
última citació postnupcial – 5-9-2002 (PTE)

Observacions d'interès - Ha estat observat tant al pas migratori prenupcial com al postnupcial. Els exemplars vistos, en general es sedimenten un temps a l'embassament, ja que hi troben condicions favorables.

### **Cigonya negra** (*Ciconia nigra*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  |   |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  | x |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  |   |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès - Ha estat observada els dies 25-8-2002 i 31-8-2002 (PTE, JSA). Per tant com els darrers anys es mantenen les poques citacions al pas postnupcial.

### **Cigonya blanca** (*Ciconia ciconia*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès – El 15-5-2002 (HEH) passen 2 exemplars en migració.

### **Ànec blanc** (*Tadorna tadorna*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1987

### **Ànec carolí** (*Aix sponsa*)

Observat el 2002

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - Al Parc del Foix es tracta d'una espècie introduïda, de la qual a Europa n'hi ha algunes poblacions asilvestrades. Es cita per primera vegada el 20-3-2002.

### **Ànec mandarí** (*Aix galericulata*)

Observat el 2002

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Observacions d'interès - Es tracta d'una espècie d'au que no és autòcona. Amb tot, a Europa hi ha poblacions d'ànec mandarí que tot i ser d'origen domèstic, han arribat a asilvestrar-se i s'han anat estenent. Desconeixem si els exemplars que s'han observat han estat introduïts, o bé han arribat pel seu compte a l'embassament. Destaquem l'observació del 13-3-2002 en què es veuen 8 exemplars.

### **Ànec xiulador** (*Anas penelope*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès – Aquest any s'ha citat els dies 16-1-2002 i 14-2-2002 (PAR, DSC), en ambdues ocasions 2 exemplars.



**Ànec grisè (Anas strepera)**

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 20-3-2002  
                                      primera citació postnupcial – 6-12-2002

Observacions d'interès – Aquest any s'ha observat moltes més vegades que els anys anteriors, tant a principis d'any com a finals.

**Xarxet (Anas crecca)**

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 9-4-2002  
                                      primera citació postnupcial – 6-9-2002

**Ànec collverd (Anas platyrhynchos)**

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

Comentaris sobre la nidificació – A primers d'any ja s'anoten molt aparellats. El 24-2-2002 observem algunes actituds de festeig o zel. El dia 7-4-2002 s'observa una parella realitzant una còpula. El 23-5-2002 anotem un mínim de 5 femelles amb polls acabats de sortir del niu. En dies següents se segueixen observant altres femelles amb pollades. Aquest any calculem que hi ha hagut a l'entorn d'una quinzena de parelles nidificants, algunes més que l'anterior any, que el pantà estava força baix.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Hi ha determinades èpoques de l'any, que el pantà acull tota una colla d'ànecs que es dispersen riu Foix amunt per cercar aliment, i que quan han menjat retornen a l'embassament.

Passat l'estiu es produeix la muda del plomatge aleshores mascles, femelles i joves semblen confondre's.

### **Ànec cuallarg** (*Anas acuta*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1999 i 2001

### **Xarrasclet** (*Anas querquedula*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1999, 2000 i 2001

### **Ànec cullerot** (*Anas clypeata*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

Hivernant

última citació prenupcial – 7-4-2002

primera citació postnupcial – 30-9-2002 (PTE, PAR)

Observacions d'interès - Tot i ser un ànec força escàs i d'aparició poc habitual al Parc del Foix, cada vegada sembla mostrar una tendència més favorable per presentar-se en aquest espai. Destaquem algunes observacions força nombroses de fins a 15 exemplars.

### **Xibec** (*Netta rufina*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  |   |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès - El 28-8-2002 localitzem una femella nedant prop de l'illa, just al davant de l'aguait. Més tard marxa volant riu amunt.

### **Morell cap-roig** (*Aythya ferina*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  |   |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès – Tan sols s'ha anotat una sola vegada en tot l'any, el 30-5-2002 en període migratori, tot i que un pèl tard.

### **Morell xocolater** (*Aythya nyroca*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1988

### **Morell de plomall** (*Aythya fuligula*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Observacions d'interès – Es tracta d'una espècie molt escassa aquí, que feia uns quants hiverns que no es veia.

### **Morell d'ulls grocs** (*Bucephala clangula*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1983

### **Bec de serra mitjà** (*Mergus serrator*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1966

### **Aligot vesper** (*Pernis apivorus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Migrant

primera citació prenupcial – 12-5-2002

última citació prenupcial – 12-6-2002 (PTE, JSA, JCR)

primera citació postnupcial – 5-9-2002

última citació postnupcial – 5-10-2002

Observacions d'interès - El 18-9-2002 des del turó de les Tres Partions anotem el pas de 25 exemplars migrants. Poc abans de les 19 hores un exemplar fa un picat força espectacular i s'atura dalt d'un pi proper al turó per ajocar-se, en adonar-se de la nostra presència torna a alçar el vol. Just uns minuts més tard, al punt de les 19 hores un altre exemplar ha fet el mateix i s'ha quedat a dormir enmig d'un pi que quedava una mica més allunyat. Encara hi havia sol però ja faltava poc per la posta i cap a aquesta hora ja no deuen trobar corrents d'aire favorables i per tant s'aturen a dormir.

Com en anys anteriors sobretot s'observa durant el pas migratori de tardor. En les sortides al Puig de l'Àliga i al Turó de les Tres Partions s'hi ha vist força.

### **Milà negre** (*Milvus migrans*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |
|-------------|--|
| - sedentari |  |
| - estival   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |

|             |   |
|-------------|---|
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Juliol - setembre  | x |
| Octubre - desembre |   |

Observacions d'interès - El milà negre es veu de forma força esporàdica durant qualsevol dels dos períodes migratoris. El 14-4-2002 (PTE, JSA), el 31-8-2002 (JSA) i el 15-9-2001 (HEH) s'anota en pas. També fou vist des del puig de l'Àliga el dia 11-9-2002; un exemplar que com d'altres rapinyaires seguia la serralada Litoral en direcció sud-oest.

### **Milà reial** (*Milvus milvus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès – Aquest ocell migrant ha estat vist el 3-5-2002 (MMS) des de cal Semison.

### **Voltor comú** (*Gyps fulvus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1996

### **Àliga marcenca** (*Circaetus gallicus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           |       |          | x        |             |
|            | anys anteriors |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Migrant

primera citació prenupcial – 6-4-2002 (PTE)

última citació prenupcial – no s'anota perquè n'hi ha d'estivals

primera citació postnupcial – 11-9-2002

última citació postnupcial – 14-10-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       | x |

Observacions d'interès - Aquest any s'obtenen citacions des de l'abril fins a l'octubre, cada mes hi ha alguna observació, destaquem la del 12-5-2002 en ple període reproductor. Els mesos freds de l'any migren cap a altres contrades més càlides.

Els dies d'observació de les migracions que es van fer des del puig de l'Àliga i el turó de les Tres Partions es van observar de primer exemplars no migrants i més endavant (a partir del 11-9-2002) exemplars en vol migratori.

El dia 8-9-2002 observem com un exemplar captura una serp.

### **Arpella vulgar** (*Circus aeruginosus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Migrant  
 primera citació prenupcial – 14-2-2002 (PAR, DSC)  
 última citació prenupcial – 2-4-2002  
 primera citació postnupcial – 30-8-2002  
 última citació postnupcial – 7-10-2002

Observacions d'interès - El 20-3-2002 observem una arpella que té algunes plomes de l'ala trencades, sembla el mateix exemplar que es va veure el 6-3-2002.

El 3-10-2002 des de les Tortes s'anota el pas d'alguns migrants, el darrer es queda a dormir a una pineda.

Aquesta rapinyaire s'observa habitualment com a migrant, sobretot durant el pas de tardor. Des del puig de l'Àliga i del turó de les Tres Partions se solen observar exemplars solitaris o en petits estols que segueixen la serralada Litoral en direcció sud-oest. Des del mateix pantà també s'observen i a vegades s'hi aturen a reposar i a cercar aliment, o fins i tot s'hi poden sedimentar uns dies.

### **Arpella pàl·lida** (*Circus cyaneus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Observacions d'interès - Aquest any s'ha citat durant l'època de pas migratori postnupcial, el dia 11-9-2002, un exemplar seguint la ruta migratoria que travessa les muntanyes del Parc del Foix en direcció sud-oest. Al pas primaveral no es va citar.

Com en alguns anys anteriors també s'ha observat un exemplar hivernant de forma esporàdica. En concret els dies 10-11-2002 i 4-12-2002 (PTE,JCR) es va observar una femella. Les àrees d'hivernada d'aquesta espècie són molt extenses, i en el nostre cas, a banda d'abastar part del Parc del Foix de ben segur que s'estén uns quants quilòmetres enllà.

### **Esparver cendrós** (*Circus pygargus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

|            |  |
|------------|--|
| - divagant |  |
|------------|--|

Observacions d'interès - Ha estat observat durant el període migratori postnupcial, els dies 11-9-2002 i 13-9-2002 (HEH). Es tracta d'una au rapinyaire que nia a algunes zones de Catalunya, però que a les comarques del Penedès tan sols es pot considerar com a migrant. Les zones més properes on s'ha confirmat la seva reproducció són l'Anoia i la Conca de Barberà.

### **Astor** (*Accipiter gentilis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       | x        |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – A banda d'una parella que tenim localitzada als boscos de la presa de l'embassament, una altra sembla que ocupa algun dels boscos que hi ha a les muntanyes dels entorns del turó de les Tres Partions; s'hi anota els dies 26-8-2002 i 28-8-2002 amb actituds territorials. El 27-9-2002 prop de la presa un exemplar surt a marcar territori just quan passava una arpella en vol migratori.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - En la celebració del dia internacional de les aus, el 5-10-2002 es va alliberar una femella d'aquesta espècie procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

Al mes de febrer i març (20-2-2002 i 13-3-2002) es va detectar la permanència d'aquesta au rapinyaire als entorns de la seva zona de cria. El cant d'un mascle ens va alertar de la seva presència en els boscos dels entorns de l'embassament, com en anys anteriors. L'astor ha passat molt desapercebut al llarg de tot l'any, la qual cosa ja és força normal en aquesta espècie.

Aquesta és una au que en general realitza pocs moviments migratoris, malgrat tot hi ha anys en què se'n veuen passar alguns, aquest any es va observar en pas els dies 28-9-2002 i 13-10-2002.

### **Esparver vulgar** (*Accipiter nisus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | ? |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           |       |          |          | x           |
|            | anys anteriors |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |            |   |
|-----------------------------------|------------|---|
|                                   | 1 a 10     | x |
|                                   | 10 a 100   |   |
|                                   | Més de 100 |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Hivernant                      última citació prenupcial – 9-4-2002  
primera citació postnupcial – 26-8-2002

Observacions d'interès - El 23-11-2002 en vesprejar, un esparver caça per la cua de l'embassament, fa aixecar moltes cueretes blanques de les seves joques.

El 15-12-2002 Prop de la Timba un esparver i dos xoriguers es fan fora entre ells per defensar un territori de caça en el cas de l'esparver i un territori on estan establerts tot l'any en el cas dels xoriguers.

Aquesta és una espècie que es pot veure pràcticament tot l'any, tot i que aquest 2002 no s'ha vist de maig a juliol. Hi ha alguna parella que podria nidificar als boscos del Parc del Foix, així ens ho fa pensar algunes observacions d'anys anteriors. Amb tot, la densitat de parelles reproductores seria molt baixa.

Els exemplars hivernants són els que s'observen amb major facilitat i freqüència, tant es van veure a principis d'any com en el darrer trimestre. En els dies del pas migratori postnupcial hi va haver una bona quantitat d'avistaments des del puig de l'Àliga i del turó de les Tres Partions.

### **Aligot (*Buteo buteo*)**

Observat el 2002

| Fenologia |             |   |
|-----------|-------------|---|
|           | - sedentari | x |
|           | - estival   |   |
|           | - hivernant | x |
|           | - de pas    | x |
|           | - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |                    |   |
|---------------------------------------|--------------------|---|
|                                       | Gener - març       | x |
|                                       | Abril - juny       | x |
|                                       | Juliol - setembre  |   |
|                                       | Octubre - desembre | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           |       | x        |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |            |   |
|-----------------------------------|------------|---|
|                                   | 1 a 10     | x |
|                                   | 10 a 100   |   |
|                                   | Més de 100 |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |                                  |   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                                                                | Disminueix, espècie en regressió | x |
|                                                                | Estable                          |   |
|                                                                | Augmenta                         |   |

Observacions d'interès - La parella que des de feia un grapat d'anys ocupava els boscos dels entorns de l'embassament l'any passat ens va semblar que no hi va nidificar. Aquest any 2002 en canvi s'ha anat veient, però possiblement està una mica desplaçada cap al sud.

Els mesos de gener, febrer i març per una banda, i d'octubre, novembre i desembre per una altra banda, hi ha més aligots establerts a la zona com a hivernants, aleshores se'ls veu tant en àrees boscoses com en terres de conreu.

### Àliga daurada (*Aquila chrysaetos*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2000

### Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès – El dia 18-9-2002 (PTE, PAR, HEH, MMS, FCF) s'observa un exemplar en migració des de les Tortes. Aquesta és una espècie que a les nostres comarques sols s'anota en èpoques de pas migratori. Sembla ser que d'uns anys ençà a nivell de Catalunya l'àliga calçada s'està expandint.

### Àliga cuabarrada (*Hieraetus fasciatus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Boscos                                       |   |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - El dia 6-2-2002 s'observa un exemplar adult.

El dia 7-8-2002 per la zona de les roques Boveres s'observen 3 exemplars, un adult i dos juvenils. L'adult té una pota penjant. Els joves semblen d'aquest any (són de color força ataronjat). Un dels exemplars joves porta un radiotransmissor a l'esquena, li surt com una antena. Sentim les veus d'exclamació potser a causa de la nostra presència a la vall.



Al mes de gener del 2003 en Joan Real (Universitat de Barcelona) ens confirma que l'exemplar que portava radiotransmissor va néixer la primavera del 2002 i que actualment està localitzat per la zona de Toledo.

Els dies 11-9-2002 i 14-9-2002 des del Turó de les Tres Partions i del Puig de l'Àliga observem la parella d'àligues en vol, es pot observar perfectament a l'exemplar de la pota trencada.

### Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Migrant  
 primera citació prenupcial – 2-4-2002  
 última citació prenupcial – 5-5-2002  
 primera citació postnupcial – ?  
 última citació postnupcial – 3-10-2002

Observacions d'interès – Des de fa uns quants anys aquesta au rapinyaire ha estat citada amb certa regularitat en els passos migratoris. Alguns anys s'arriben a sedimentar durant un temps a l'embassament, ja que hi troben aliment (sobretot carpes) en abundància.

### Xoriguer petit (*Falco naumanni*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2000

### Xoriguer (*Falco tinnunculus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              | x |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 30-5-2002 anotem un grupet de 3 exemplars, entre els quals hi ha joves sortits del niu fa poc, i que encara van acompanyats per un adult.

Migrant  
 primera citació postnupcial – 30-8-2002  
 última citació postnupcial – 27-10-2002

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |
|----------------------------------------------------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió |   |
| Estable                          | x |
| Augmenta                         |   |

Observacions d'interès - En la celebració del dia internacional de les aus, el 5-10-2002 es van alliberar dos exemplars d'aquesta espècie procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

El 15-12-2002 Prop de la Timba un esparver i dos xoriguers es fan fora entre ells per defensar un territori de caça en el cas de l'esparver i un territori on estan establerts tot l'any en el cas dels xoriguers.

Hi ha dies que es detecta un marcat pas migratori postnupcial, que se sol iniciar a finals d'agost, al setembre és bastant notable i a l'octubre es manté amb certa intensitat. Destaquem el 22-9-2002 en què s'anoten un mínim de 33 xoriguers migrants en dues hores i 20 minuts, a la tarda, des de les Tortes.

A l'hivern també s'anota algun exemplar establert a la zona, sobretot a l'entorn de diferents conreus.

### **Falcó cama-roig** (*Falco vespertinus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1998

### **Esmerla** (*Falco columbarius*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | ? |

Observacions d'interès – Es tracta d'un petit falcònid molt escàs, de costums discrets, amagadissos i molt feréstecs, la qual cosa dificulta la seva observació. En el pas migratori de tardor es va anotar el dia 28-9-2002 des del turó de les Tres Partions en vol cap al sud-oest.

L'observació d'exemplars a l'hivern no és molt habitual, però els darrers anys ha estat força regular. El dia 1-3-2002 (PTE) se'n va observar un prop de la masia Xoriguera. El 13-12-2002 s'anota un possible exemplar d'aquesta espècie al costat del convent de Sant Domingo de Penyaforat.

### **Falcó mostatxut** (*Falco subbuteo*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          | x        |             |
| anys anteriors |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Es tracta d’una au nidificant que aprofita els nius d’altres ocells, i per tant sol esperar a què aquests acabin. Així doncs, que la seva nidificació és tardana. La citació del 5-7-2002 podria correspondre a un nidificant que es va localitzar en un tram del bosc de ribera que hi ha al Foix, en una zona entre els Monjos i la Ràpita. En algun any anterior s’havia situat als entorns de l’embassament. El fet de dependre del niu d’altres espècies per poder començar a nidificar és un factor que li dóna certa irregularitat tant pel que fa a les dates de reproducció (es es poden retardar més o menys), com a la situació (que també varia força d’un any a l’altre).

Migrant primera citació postnupcial – 8-9-2002  
última citació postnupcial – 12-10-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d’interès - En les migracions postnupcials va ésser força abundant, destaquem per exemple el dia 22-9-2002 que en poc més de dues hores, des de les Tortes, s’anota el pas de 17 exemplars migrants.

### **Falcó de la Reina** (*Falco eleonorae*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          |   |  |
| Abril - juny                          |   |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    |   |  |

Observacions d’interès – El 17-9-2002 s’observa un exemplar des de la muntanya de les Tortes en vol migratori. Aquest és el segon any que obtenim dades d’aquesta espècie al Parc de Foix. En general a Catalunya s’anoten alguns exemplars migrants des de l’estiu i fins a l’octubre. Tot i no ser molt freqüent, a finals d’agost i al setembre és quan s’anota més vegades. El falcó de la reina és una au reproductora a les illes balears.

### **Falcó pelegrí** (*Falco peregrinus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  | x |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          |   |  |
| Abril - juny                          |   |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    |   |  |

Observacions d’interès - Els darrers anys sembla que hi ha hagut una lleugera recuperació de les seves poblacions a les terres del Penedès. Tot i que la seva densitat es manté baixa s’han localitzat unes poques parelles reproductores establertes en noves zones. És una au poc habitual al Parc del Foix, únicament s’ha citat com a migrant o en dispersió postnupcial. El 16-7-2002 es va observar un exemplar prop de la cua de l’embassament.

### **Perdiu** (*Alectoris rufa*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari | x |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          | x |  |
| Abril - juny                          | x |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    | x |  |

|            |  |
|------------|--|
| - divagant |  |
|------------|--|

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - No és un ocell abundant, però n'hi ha algunes parelles repartides per diferents punts de les muntanyes del Parc del Foix. La pressió cinegètica sobre aquest ocell és forta i la seva població pateix oscil·lacions al llarg dels anys. El 6-12-2002 prop de cal Semison trobem les restes d'una perdiu morta per un caçador. Ha estat observada a diferents llocs durant tots els trimestres de l'any.

### **Guatlla** (*Coturnix coturnix*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1977

### **Faisà** (*Phasianus colchicus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1997 i 2000

### **Rascló** (*Rallus aquaticus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | ? |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors |       |          | ?        |             |

Hivernant                      última citació prenupcial – 13-3-2002  
                                          primera citació postnupcial – 27-9-2002

Observacions d'interès – Aquest any, en haver-hi un bon nivell d'aigua a l'embassament, el rascló ha estat força habitual a les zones de canyissos, canyes i bogues de la cua de l'embassament. Aquesta mena d'ambients humits són els que agraden al rascló. Es tracta d'una au molt amagadissa, diríem que més del 90 per cent de vegades que s'anota no es veu, sols es localitza per les seves veus i reclams.

### **Polla pintada** (*Porzana porzana*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998 i 2000

**Rascletó** (*Porzana parva*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1998

**Rasclet** (*Porzana pusilla*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1978 i 1998

**Guatlla maresa** (*Crex crex*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1967

**Polla d'aigua** (*Gallinula chloropus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

Comentaris sobre la nidificació – Ha estat un any en què s’han pogut reproduir un bon nombre de parelles d’aquesta espècie. Tant al riu Foix com al mateix pantà. Des de finals de maig i fins a l’agost s’han anat anotant diferents pollades sortides del niu que nedaven junt amb els adults.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d’interès – Hi ha hagut bastants exemplars hivernants, el nivell alt de l’embassament els ha estat beneficiós. També s’observen en diferents trams del riu Foix i de la riera de Marmellar.

**Fotja** (*Fulica atra*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |  |       |          |          |             |
|----------------|--|-------|----------|----------|-------------|
|                |  | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |  | x     |          |          |             |
| anys anteriors |  | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  | x |
| 10 a 100                          |  |   |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

Comentaris sobre la nidificació – El 2-4-2002 un adult està covant al niu. El 7-4-2002 un adult està covant al niu. El 9-4-2002 localitzem un altre niu amb un adult covant. En un altre indret una parella marca territori. El 18-5-2002 un adult està covant al niu.

El 23-5-2002 una femella passeja amb dos polls nounats. A partir d'aquesta data s'anoten polls sortits del niu acompanyats pels adults i més endavant els exemplars juvenils.

En total aquest any 2002 s'han localitzat entre 5 i 6 parelles de fotja nidificants al Parc del Foix.

Totes les observacions han estat realitzades a l'entorn de la cua de l'embassament, en concret des de l'aguait o des de la carretera. Les condicions del nivell de l'aigua i de la vegetació que enguany hi ha hagut a aquesta zona han permès de poder localitzar els nius des de força lluny.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------------------------|--|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |  |   |
| Estable                                                        |  | x |
| Augmenta                                                       |  |   |

Observacions d'interès – A banda de la població de fotges que s'ha reproduït a l'embassament, a la tardor i hivern augmenta la quantitat d'exemplars. Enguany se n'han arribat a trobar a l'entorn d'una trentena com a màxim.

### **Grua** (*grus grus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998 i 1999

### **Sisó** (*Tetrax tetrax*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1972

### **Cames llargues** (*Himantopus himantopus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  |   |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  | x |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  |   |
| Octubre - desembre                    |  |   |

| Nidificant     |  |       |          |          |             |
|----------------|--|-------|----------|----------|-------------|
|                |  | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |  |       |          |          | x           |
| anys anteriors |  | x     |          |          |             |

Observacions d'interès – La primera citació fou molt primerenca, del 6-3-2002. Destaquem l'observació de 8 exemplars el dia 25-3-2002. Aquest any no hi ha hagut gaires observacions. Fa anys una parella es va

reproduir al pantà de Foix, però no s'hi ha reproduït més aquesta espècie. Pensem que des que aquest espai està protegit hi torna a haver possibilitats reals que en un futur hi tornin a niar, fins i tot amb certa regularitat. De tota manera, caldria vetllar per millorar algunes condicions que li poden dificultar la nidificació; des de la construcció de la represa, fins a la presència de gats a les platgetes que es formen alguns anys.

### **Torlit** (*Burhinus oedicnemus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1950-1970 aprx. (arxiu Sc. ornitològica Museu de Vilafranca).

### **Corriol petit** (*Charadrius dubius*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |  |   |  |  |
|-------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--|
| - sedentari |   | Gener - març                          |  | x |  |  |
| - estival   | x | Abril - juny                          |  | x |  |  |
| - hivernant |   | Juliol - setembre                     |  |   |  |  |
| - de pas    | x | Octubre - desembre                    |  |   |  |  |
| - divagant  |   |                                       |  |   |  |  |

  

| Nidificant     |   |       |          |          |             |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
|                |   | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |   |       | x        |          |             |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

  

| Estimació de parelles nidificants |   | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x | Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| 10 a 100                          |   | Conreus, ermots i marges                     |   |
| Més de 100                        |   | Penya-segats i roquissars                    |   |
|                                   |   | Màquies i garrigues                          |   |
|                                   |   | Bosc                                         |   |
|                                   |   | Zones humides                                | x |

Estival                                      primera citació prenupcial – 13-3-2002  
última citació postnupcial – 26-6-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès – El nivell alt de l'aigua de l'embassament no va impedir la presència d'aquesta au limícola al pantà. Ja es va citar molt aviat, a meitats de març. La darrera observació va ser a finals de juny, recordem que l'any anterior s'havia citat fins a finals de setembre (28-9-2001). Des del març i fins al juny s'hi ha observat una o dues parelles que marcaven territori.

### **Corriol gros** (*Charadrius hiaticula*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1950-1970 aprx. (arxiu Sc. ornitològica Museu de Vilafranca).

### **Daurada grossa** (*Pluvialis apricaria*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2001

### **Fredulega** (*Vanellus vanellus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  | Observacions al llarg dels trimestres |   |
|-------------|--|---------------------------------------|---|
| - sedentari |  | Gener - març                          | x |

|             |   |
|-------------|---|
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Abril - juny       |   |
| Juliol - setembre  |   |
| Octubre - desembre | x |

Observacions d'interès – El desembre del 2001 va ser molt fred i va provocar el desplaçament d'aus d'aquesta espècie cap a les terres del Penedès. Al gener del 2002 encara se'n van veure algunes, el 8-1-2002 (PTE, MMS) un grupet de 16 exemplars passa volant prop de Torrelletes. Passat l'estiu s'ha tornat a observar; el 7-11-2002 un exemplar solitari volant una estona per la zona de la cua de l'embassament.

### **Territ menut** (*Calidris minuta*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998, 1999, 2000 i 2001

### **Territ de Temminck** (*Calidris Temminckii*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1998

### **Territ beclarg** (*Calidris ferruginea*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2001

### **Territ variant** (*Calidris alpina*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1999 i 2001

### **Becadell sord** (*Lymnocyptes minimus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1998

### **Becadell comú** (*Gallinago gallinago*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  |   |
| Juliol - setembre                     |  |   |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès - Aquest any 2002 aquesta au s'ha observat tan sols una vegada, el dia 22-1-2002 (PTE, MMS) a la bassa del mas Bellestar. El becadell alguns anys havia arribat a ser força habitual al Parc del Foix, com a migrant i com a hivernant.

### **Becada** (*Scolopax rusticola*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  |   |
| Juliol - setembre                     |  |   |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès – El passat desembre del 2001 va ser molt fred i va provocar el desplaçament d'aus d'aquesta espècie de les valls i muntanyes de la serralada Prelitoral cap a terres que, com les del Parc del Foix, es van mantenir amb condicions menys fredes i amb ben poca neu. Al gener del 2002 encara es va obtenir alguna citació; el 3-1-2002 (PTE) se'n troba una de morta per un tret.



Aquesta és una au molt difícil d'observar, ja que a més de ser escassa té un plomatge i un comportament amagadís que en dificulta la seva detecció. És una au hivernant de costums crepusculars, sol passar el dia amagada enmig de la vegetació, la seva coloració marronosa li permet un camuflatge diríem que perfecte.

### **Tètol cuanegre** (*Limosa limosa*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1973 i 1985

### **Tètol cuabarrat** (*Limosa lapponica*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1950-1970 aprx. (arxiu Sc. ornitològica Museu de Vilafranca).

### **Gamba roja pintada** (*Tringa erythropus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1998

### **Gamba roja vulgar** (*Tringa totanus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1999 i 2001

### **Gamba verda** (*Tringa nebularia*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998, 1999 i 2001

### **Xivita** (*Tringa ochropus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès – Es va observar amb certa regularitat durant tot l'agost i primers de setembre, molt possiblement es tractava d'exemplars en dispersió postnupcial, o dels primers migrants. Les xivites se solen sedimentar durant uns dies a l'embassament, en especial quan hi ha zones de fang a les vores de l'aigua. En el pas prenupcial es va obtenir un registre el 16-4-2002 (PTE, PAR, DSC) i un altre el 26-4-2002 (PAR). Pel que fa a l'observació d'exemplars hivernants no n'hi ha hagut cap.

### **Valona** (*Tringa glareola*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1999, 2000 i 2001

### **Xivitona** (*Actitis hypoleucos*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Migrant

primera citació prenupcial – 6-3-2002

última citació prenupcial – 23-5-2002

primera citació postnupcial – 7-7-2002 (PTE)

última citació postnupcial – 21-9-2002 (PTE)

Observacions d'interès - Aquesta és una au que se sol observar aturada a les vores de l'aigua, o en vol baix força arran de la superfície de l'aigua. Com en anys anteriors se sol presentar al Parc del Foix durant els passos migratoris, que a la primavera es pot allargar bastant i passat el període reproductor ja pot ésser força primerenc. A l'hivern també es pot citar, però no és gaire freqüent, enguany per exemple no s'hi va veure.

**Gavina menuda** (*Larus minutus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1999

**Gavina vulgar** (*Larus ridibundus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1997, 1999 i 2001

**Gavià fosc** (*Larus fuscus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2001

**Gavià argentat** (*Larus cachinnans*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1999, 2000 i 2001

**Xatrac gros** (*Sterna caspia*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  |   |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  |   |
| - divagant  |  | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  |   |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès – Entre els dies 12-4-2002 i 16-4-2002 (PTE, JSA, MMS, JCR) s'observen fins a 5 exemplars. Aquesta és la primera vegada que anotem el xatrac gros al Parc del Foix. És una espècie molt escassa a les nostres comarques, tan sols la teníem citada en comptades ocasions en zones litorals.

**Fumarell carablanc** (*Chlidonias hybridus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  |   |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  | x |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  |   |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès – És un ocell migrant molt escàs, que sols es cita alguns anys. El dia 1-9-2002 (PTE) s'anoten dos exemplars a la cua de l'embassament.

**Fumarell negre** (*Chlidonias niger*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1980 i 2001

**Colom roquer** (*Columba livia*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  | x |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  |   |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  |   |
| 10 a 100                          |  | x |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |  | x |
| Conreus, ermots i marges                     |  |   |
| Penya-segats i roquissars                    |  |   |
| Màquies i garrigues                          |  |   |
| Bosc                                         |  |   |
| Zones humides                                |  |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------------------------|--|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |  |   |
| Estable                                                        |  | x |
| Augmenta                                                       |  |   |

Observacions d'interès - Al Parc del Foix se n'observen petites poblacions, quasi totes lligades a algun habitatge o nucli urbà. En general no s'allunyen gaire de les cases que els acullen. Es tracta d'una espècie que es presenta en estat domèstic o semi-domèstic.

**Xixella** (*Columba oenas*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  | x |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  |   |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  |   |
| 10 a 100                          |  | x |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |  |   |
| Conreus, ermots i marges                     |  |   |
| Penya-segats i roquissars                    |  | x |
| Màquies i garrigues                          |  |   |
| Bosc                                         |  |   |
| Zones humides                                |  |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------------------------|--|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |  | x |
| Estable                                                        |  |   |

|          |  |
|----------|--|
| Augmenta |  |
|----------|--|

Observacions d'interès - Hi ha algunes parelles que nien a les pedreres dels entorns de Clariana i també en alguns roquissars de les muntanyes del Preparc, a vegades també ho fan a algun dels masos mig enderrocats. Alguns dies hi ha exemplars que vénen a beure aigua a l'embassament, sobretot els mesos estivals.

### **Tudó** (*Columba palumbus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   | x |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 7-6-2002 trobem la closca d'un ou al terra, es tracta de l'ou d'un poll nascut de fa poc. Els dies 12-5-2002, 7-6-2002 i 5-7-2002 s'anoten comportaments de zel

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       | x |

Observacions d'interès - És una au molt freqüent als boscos que hi ha als costats del pantà, a més s'acostuma a veure per les terres de cultiu i també sobrevolant qualsevol àrea del Parc del Foix. El tudó és una au sedentària que es reproduïx als boscos dels entorns de l'embassament i també a diferents zones del Preparc. Quan han acabat de reproduir-se es solen agrupar en estols que poden ser bastant numerosos. Des dels cims més alts del parc alguna vegada s'anoten en pas migatori, viatgen en grups que poden ser bastant nombrosos, per exemple el 6-10-2002 es va observar un grup de 62 exemplars migrants. Durant els períodes de caça n'hi ha que se solen refugiar al bosc de ribera del pantà, en aquesta zona se salven dels trets, ja que no s'hi pot caçar.

### **Tórtora turca** (*Streptopelia decaocto*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |



Darreres observacions anys - 2001

### **Lloro de la Patagònia** (*Cyanoliseus patagonus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2001

### **Cotorra de pit gris** (*Myiopsitta monachus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998 i 2000

### **Cucut reial** (*Clamator glandarius*)

Observat el 2002

|             |   |
|-------------|---|
| Fenologia   |   |
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Observacions al llarg dels trimestres |   |
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

|                |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
| Nidificant     |       |          |          |             |
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          | x        |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Estimació de parelles nidificants |   |
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

|                                                                |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |  |
| Estable                                                        |   |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie que està patint una regressió molt accentuada, abans era força abundant a les terres del Penedès, ara resulta molt difícil de trobar, ha esdevingut extremadament escàs. És una espècie estival, però les seves arribades prenupcials són molt i molt primerenques. Parasita les garses, que tampoc són abundants al Parc del Foix, tan sols les trobem en zones on predominen els conreus. El cucut reial va ser observat el dia 25-5-2002 (PTE) prop de Penyafel.

### **Cucut** (*Cuculus canorus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |  |   |  |
|-------------|---|---------------------------------------|--|---|--|
| - sedentari |   | Gener - març                          |  |   |  |
| - estival   | x | Abril - juny                          |  | x |  |
| - hivernant |   | Juliol - setembre                     |  |   |  |
| - de pas    | x | Octubre - desembre                    |  |   |  |
| - divagant  |   |                                       |  |   |  |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       | x        |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            | x |  |
| 10 a 100                          |   |  |
| Més de 100                        |   |  |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------|---|--|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |  |
| Conreus, ermots i marges                     | x |  |
| Penya-segats i roquissars                    |   |  |
| Màquies i garrigues                          | x |  |
| Bosc                                         | x |  |
| Zones humides                                | x |  |

Estival                                      primera citació prenupcial – 9-4-2002  
última citació postnupcial – 28-5-2002

Observacions d'interès - Aquesta espècie és migrant i estival. Sobretot la descobrim pel seu popular cant, quan deixa de cantar ja ens passa desapercebut.

### Òliba (*Tyto alba*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998, 1999 i 2000

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari | x |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    |   |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Gener - març                          |  |  |
| Abril - juny                          |  |  |
| Juliol - setembre                     |  |  |
| Octubre - desembre                    |  |  |

| Nidificant     |   |       |          |          |             |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
|                |   | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |   |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            | x |  |
| 10 a 100                          |   |  |
| Més de 100                        |   |  |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------|---|--|
| Zones urbanes o nuclis habitats              | x |  |
| Conreus, ermots i marges                     |   |  |
| Penya-segats i roquissars                    | x |  |
| Màquies i garrigues                          |   |  |
| Bosc                                         |   |  |
| Zones humides                                |   |  |

### Xot (*Otus scops*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998, 1999 i 2001

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   | x |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Gener - març                          |  |  |
| Abril - juny                          |  |  |
| Juliol - setembre                     |  |  |
| Octubre - desembre                    |  |  |

| Nidificant     |   |       |          |          |             |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
|                |   | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |   |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            | x |  |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------|---|--|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |  |
| Conreus, ermots i marges                     | x |  |

|            |  |
|------------|--|
| 10 a 100   |  |
| Més de 100 |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Penya-segats i roquissars |   |
| Màquies i garrigues       |   |
| Bosc                      | x |
| Zones humides             |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |  |
| Estable                                                        |   |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

### Duc (*Bubo bubo*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari | x |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    |   |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          |   |  |
| Abril - juny                          | x |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    | x |  |

| Nidificant     |       |          |          |             |  |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|--|
|                | segur | probable | possible | no detectat |  |
| 2002           | x     |          |          |             |  |
| anys anteriors | x     |          |          |             |  |

| Estimació de parelles nidificants |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            | x |  |
| 10 a 100                          |   |  |
| Més de 100                        |   |  |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------|---|--|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |  |
| Conreus, ermots i marges                     |   |  |
| Penya-segats i roquissars                    | x |  |
| Màquies i garrigues                          |   |  |
| Bosc                                         |   |  |
| Zones humides                                |   |  |

Comentaris sobre la nidificació – Sembla ser que al Parc del Foix n'hi podria haver diverses parelles, ja que hi troba ambients favorables. Per ara s'ha detectat una parella ben establerta i una altra de molt possible.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - El duc és la major de les aus rapinyaires nocturnes, és un gran caçador.

El 19-4-2002 al fondo del Llampeig trobem una egagròpila de duc.

El 7-8-2002 en unes balnes de les coves Boveres trobem restes d'animals depredats pel duc disperses pel terra, també hi ha restes d'algun altre rapinyaire nocturn com pot ser l'òliba o el gamarús. En concret trobem restes de les següents espècies: eriçó clar, musaranya comuna, musaranya nana, conill, rata cellarda, ratolí de bosc, rata negra, rata comuna, ratolí domèstic, ratolí mediterrani, rata d'aigua, talpó comú, llargandaix ocel.lat, i d'algun rèptil (dragó o sargantana) i ocell (túrdid sp. i sílvud sp.) que no vam poder classificar. (Veure annex).

El 18-10-2002 al fondo del Llampeig trobem plomes, restes de menjar i un niu vell de duc amb tot d'ossos i plomes (també hi ha restes disperses que podrien ser d'òliba o gamarús). Hi ha plomes de gaig, garsa i faisà, i ossos de conill, rata comuna, rata negra, ratolí de bosc, musaranya comuna, talpó comú i d'un ocell i d'un ratolí que no podem classificar. (Veure annex).

Al mes de desembre s'escolta el seu cant des de Torrelletes.

### Mussol (*Athene noctua*)

Observat el 2002

| Fenologia |
|-----------|
|-----------|

| Observacions al llarg dels trimestres |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|



|             |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gener - març       | x |
| Abril - juny       | x |
| Juliol - setembre  |   |
| Octubre - desembre | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ertos i marges                      | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - En la celebració del dia internacional de les aus, el 5-10-2002 es van alliberar dos exemplars d'aquesta espècie procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

El mussol en determinades zones esta essent molt castigat, sobretot pels atropellaments i per la manera de treballar les terres conreades. Els darrers anys ha minvat molt.

### **Gamarús** (*Strix aluco*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ertos i marges                      |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | ? |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - Se segueix localitzant en el mateix territori on en anys passats s'hi va trobar una parella. En algunes visites a zones rocoses es van trobar restes d'egagròpiles velles que podrien ser d'aquesta espècie.

### Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |  |   |  |  |
|-------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--|
| - sedentari |   | Gener - març                          |  |   |  |  |
| - estival   | x | Abril - juny                          |  | x |  |  |
| - hivernant |   | Juliol - setembre                     |  |   |  |  |
| - de pas    | x | Octubre - desembre                    |  |   |  |  |
| - divagant  |   |                                       |  |   |  |  |

  

| Nidificant     |   |       |          |          |             |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
|                |   | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |   |       | x        |          |             |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

  

| Estimació de parelles nidificants |   | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   | Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| 10 a 100                          | x | Conreus, ermots i marges                     | x |
| Més de 100                        |   | Penya-segats i roquissars                    |   |
|                                   |   | Màquies i garrigues                          | x |
|                                   |   | Bosc                                         |   |
|                                   |   | Zones humides                                |   |

Estival                                      primera citació prenupcial – 19-4-2002  
última citació postnupcial – 16-6-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta au de costums crepusculars i nocturns es manté amb bona densitat a les muntanyes del preparc.

### Siboc (*Caprimulgus ruficollis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |  |   |  |  |
|-------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--|
| - sedentari |   | Gener - març                          |  |   |  |  |
| - estival   | x | Abril - juny                          |  | x |  |  |
| - hivernant |   | Juliol - setembre                     |  |   |  |  |
| - de pas    | x | Octubre - desembre                    |  |   |  |  |
| - divagant  |   |                                       |  |   |  |  |

  

| Nidificant     |   |       |          |          |             |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
|                |   | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |   |       | x        |          |             |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

  

| Estimació de parelles nidificants |   | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x | Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| 10 a 100                          |   | Conreus, ermots i marges                     | x |
| Més de 100                        |   | Penya-segats i roquissars                    |   |
|                                   |   | Màquies i garrigues                          |   |

|               |  |
|---------------|--|
| Bosc          |  |
| Zones humides |  |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |  |
| Estable                                                        |   |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès – El siboc és de costums crepusculars i nocturns. Al Parc del Foix hi és bastant escàs, ocupa algunes àrees on es combinen els terrenys conreats amb les marginades i els ermots.

### Ballester (*Apus melba*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          | x        |             |
| anys anteriors |       |          | x        |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Estival                                      primera citació prenupcial – 13-3-2002  
última citació postnupcial – 6-10-2002

Observacions d'interès – A la primavera i durant l'estiu es van anar veient en poca quantitat per l'embassament. Hi acudeixen a caçar insectes i també se'ls pot observar quan tenen set, ja que baixen a beure aigua; en ple vol passen a prop de la superfície, obren la boca i sense aturar-se agafen una mica d'aigua. Acabat l'estiu comencen a marxar cap a l'Àfrica.

Durant el setembre i l'octubre se'n poden contemplar grups força nombrosos que passen migrant per les muntanyes del preparc tot seguint la línia de la serralada Litoral. Destaquem l'observació d'aproximadament un miler d'exemplars migrants, que van passar el 21-9-2002 per es muntanyes del puig de l'Àliga i del turó de les Tres Partions.

Hi ha indicis de cria a algun penya-segat de les muntanyes del preparc, de tota manera no ha estat comprovat fins al moment. Aquesta au realitza desplaçaments relativament grans per cercar aliment des dels llocs on nidifica.

### Falciot negre (*Apus apus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              | x |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Estival                      primera citació prenupcial – 2-4-2002  
última citació postnupcial – 21-9-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - En aquest espai natural hi ha un bon nombre de falciots que es reproduïxen a les poblacions, a les parets rocoses i també n'hi ha alguns que ho fan en punts més aïllats com ara a una edificació abandonada del mateix entorn del pantà.

Aquesta és una altra au típicament estival. En acabar la seva reproducció els exemplars de casa nostra ja comencen a migrar; a finals de juliol ja han marxat. Més endavant tots els falciots que es veuen són provinents de terres més nòrdiques. El pas al setembre, se sol produir més a prop de la línia de costa, alguns però, migren per les serralades Litoral o Prelitoral. Destaquem l'observació d'uns 300 exemplars migrants del dia 22-8-2002.

### Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès – El falciot pàl·lid, tot i nidificar en alguns penya-segats del litoral del Garraf, resulta força difícil de veure tera endins (al Penedès). A més, és molt fàcil que ens passi desapercebut, ja que té una gran similitud (de forma, color, comportament...) amb el falciot negre. Aquest any es va citar dues vegades; el 12-6-2002 (PTE, JCR) prop de la Casa Alta, i el 3-9-2002 des del turó de les Tres Partions.

### Blauet (*Alcedo atthis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 20-3-2002  
primera citació postnupcial – 18-6-2002

|                                                                |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta espècie viu molt lligada als medis aquàtics on hi ha peixos. A l'embassament sols s'hi observa com a hivernant i de pas, amb tot, algun any podria haver-s'hi reproduït. Es va anotar amb força regularitat tot el primer trimestre. A l'abril i maig no es va citar en cap ocasió. A meitats de juny ja es va tornar a observar al pantà, tot i que encara sigui ple estiu, el blauet ja ha finalitzat la seva reproducció i per això es comencen a dispersar cap a zones on poden trobar aliment. Hi ha dades d'anys anteriors que ens fan pensar en la seva reproducció en algun tram proper del riu Foix.

### Abellerol (*Merops apiaster*)

Observat el 2002

|             |   |  |                                       |  |   |
|-------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| Fenologia   |   |  | Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
| - sedentari |   |  | Gener - març                          |  |   |
| - estival   | x |  | Abril - juny                          |  | x |
| - hivernant |   |  | Juliol - setembre                     |  | x |
| - de pas    | x |  | Octubre - desembre                    |  |   |
| - divagant  |   |  |                                       |  |   |

|            |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
| Nidificant |                |       |          |          |             |
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Estimació de parelles nidificants |   |
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Hi ha algunes parelles que nidifiquen en terrenys on hi ha talusos, tant si aquests talusos són petits com si són grans. Fa pocs anys hi havia un major nombre de parelles establertes, darrerament han minvat. El 16-6-2002 es troba una parella que intervén a un niu.

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Estival | primera citació prenupcial – 26-4-2002<br>última citació postnupcial – 18-9-2002 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |  |
| Estable                                                        |   |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - El 15-8-2002 aproximadament surten uns 60 exemplars de les joques. Des dels cims més alts del Parc del Foix, a finals d'agost i al setembre s'anoten exemplars en pas.

**Gaig blau**(*Coracias garrulus*)

Observat el 2002

|                  |   |  |                                              |  |   |
|------------------|---|--|----------------------------------------------|--|---|
| <b>Fenologia</b> |   |  | <b>Observacions al llarg dels trimestres</b> |  |   |
| - sedentari      |   |  | Gener - març                                 |  |   |
| - estival        |   |  | Abril - juny                                 |  | x |
| - hivernant      |   |  | Juliol - setembre                            |  |   |
| - de pas         | x |  | Octubre - desembre                           |  |   |

|            |  |
|------------|--|
| - divagant |  |
|------------|--|

Observacions d'interès – Com en anys anteriors s'ha observat ocasionalment durant el pas migratori prenupcial. El 29-4-2002 (PTE, JCR, JSA) un exemplar al fondo de la Bovera. El 13-5-2002 (HEH) un exemplar prop cal Semison.

### **Puput** (*Upupa epops*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               | x |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 23-5-2002 localitzem un exemplar que intervé a un niu situat a un marge. El 28-5-2002 en un altre indret una parella marca territori.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

### **Colltort** (*Jynx torquilla*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           |       |          | x        |             |
|            | anys anteriors |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |

|               |  |
|---------------|--|
| Zones humides |  |
|---------------|--|

Observacions d'interès – Enguany es va citar menys que en anys anteriors. El 26-4-2002 se sent a cantar per la cua de l'embassament.

A les nostres comarques la seva fenologia és estival, de tota manera algun hivern se n'ha vist algun, en temporades poc fredes i en punts de la costa on l'hivern és més suau. Sembla que hi ha alguna parella reproductora al Parc del Foix, en tot cas es tracta d'una espècie escassa, molt localitzada i que no és constant en la seva reproducció, és a dir que hi ha anys que no cria a l'àrea que s'abasta des del Parc del Foix.

### **Picot verd** (*Picus viridis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - Hi ha unes quantes parelles de picot verd que habiten al Parc del Foix. Ho fan en zones de conreus arbrats i de bosc, sobretot a algunes de les muntanyes del preparc i també als boscos de ribera que envolten el riu Foix. Des de l'embassament no se solen sentir gairebé mai, són més habituals cap a les fondalades que aporten l'aigua al Foix.

### **Terrerola vulgar** (*Calandrella brachydactyla*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - El 22-5-2002 (PTE, JCR) s'anoten 4 exemplars per la zona del Maset del Rossell. Aquesta au havia estat força abundant a les comarques del Penedès i entorns, fins i tot hi nidificava amb certa presència. Les darreres dècades han estat fatals per a l'espècie; ha sofert una regressió molt forta, actualment diríem que ha desaparegut de casa nostra. Tan sols s'observa de forma més aviat ocasional a les èpoques de pas migratori.

**Cogullada vulgar** (*Galerida cristata*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  | x |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  |   |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

| Nidificant     |  |       |          |          |             |
|----------------|--|-------|----------|----------|-------------|
|                |  | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |  | x     |          |          |             |
| anys anteriors |  | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  |   |
| 10 a 100                          |  | x |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |  |   |
| Conreus, ermots i marges                     |  | x |
| Penya-segats i roquissars                    |  |   |
| Màquies i garrigues                          |  |   |
| Bosc                                         |  |   |
| Zones humides                                |  |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------------------------|--|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |  | x |
| Estable                                                        |  |   |
| Augmenta                                                       |  |   |

Observacions d'interès - Es mantenen les poques parelles de cogullada que viuen als entorns dels conreus. Aquesta au, de tota manera, ha minvat molt a causa dels canvis que s'han produït en la manera de treballar el camp.

**Cogullada fosca** (*Galerida theklae*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  | x |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  |   |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

| Nidificant     |  |       |          |          |             |
|----------------|--|-------|----------|----------|-------------|
|                |  | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |  | x     |          |          |             |
| anys anteriors |  | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  | x |
| 10 a 100                          |  |   |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |  |   |
| Conreus, ermots i marges                     |  |   |
| Penya-segats i roquissars                    |  |   |
| Màquies i garrigues                          |  | x |
| Bosc                                         |  |   |
| Zones humides                                |  |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------------------------|--|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |  |   |
| Estable                                                        |  | x |



|          |  |
|----------|--|
| Augmenta |  |
|----------|--|

Observacions d'interès - Els darrers anys en vam descobrir un petit nucli a les muntanyes del preparc, es tracta d'una espècie que és molt escassa.

### **Cotoliu** (*Lullula arborea*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           |       | x        |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Hivernant                      última citació prenupcial – 9-4-2002  
                                       primera citació postnupcial – 13-10-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - De fet, podem trobar la cotoliu durant tot l'any al Parc del Foix, el que passa és que a l'hivern n'hi ha moltes més que no pas a l'estiu. A les muntanyes del preparc s'hi reproduïxen unes quantes parelles, molt poques. Fora de l'època de nidificació és més fàcil de trobar-ne de sedimentades en terres de cultiu. El dia 13-10-2002 s'anoten dos exemplars en vol migratori que vénen del nord.

### **Alosa** (*Alauda arvensis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 27-1-2002  
                                       primera citació postnupcial – 13-10-2002

Observacions d'interès - Tan sols s'observen exemplars hivernants o en pas. A vegades es poden quedar a passar uns dies en terrenys agrícoles o ermotats, allà hi poden ser més o menys habituals. Al Parc del Foix hi predominen les àrees forestals, mentre que les terres de conreu són poc extenses, això fa que les citacions d'aquesta au siguin més aviat escasses. L'alosa nia a zones més altes del Penedès, cap a la serralada Prelitoral. A partir del 13-

10-2002 es van observar petits grupets d'aloses. A l'hivern poden formar estols més o menys numerosos que van d'un camp a un altre.

### Oreneta de ribera (*Riparia riparia*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Migrant

primera citació prenupcial – 16-3-2002

última citació prenupcial – 12-5-2002

### Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   | x |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - Aquesta és una mena d'oreneta que es pot observar durant gairebé tot l'any. Hi ha hagut alguns anys que diferents parelles s'han reproduït al Parc del Foix, darrerament tenen certs problemes i pràcticament no nidifiquen a cap indret d'aquest espai natural. A la tardor es van anotar exemplars, ja en dispersió postnupcial o bé en migració.

### Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              | x |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Entre els dies 16-7-2002 i 18-8-2002 s’anoten diverses evidències de reproducció; nius, exemplars joves, becada, etc. Hi ha bastantes parelles que nien repartides arreu del Parc del Foix; en alguns nuclis urbans o en masies aïllades.

Estival                                      primera citació prenupcial – 6-3-2002  
última citació postnupcial – 14-10-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |  |
| Estable                                                        |   |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d’interès - El 15-8-2002 més de 200 exemplars surten dels canyissars on s’han ajocat. A partir de l'estiu bastants exemplars es concentren per ajocar-se als canyars de la cua de l'embassament, durant el dia es dispersen per la rodalia o resten al mateix pantà, els agrada voleiar pel damunt de l'aigua ja que hi troben molts insectes. Durant els períodes de migracions també és habitual de veure'n bastantes que fan una pausa en el seu viatge per tal de caçar mosquits i beure aigua a aquest indret. Des dels cims més alts del Parc del Foix també es fa evident el pas migratori d’aquesta espècie.

### Oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           |       |          | x        |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

Comentaris sobre la nidificació – L’any passat es va obtenir la primera citació corresponent a la reproducció segura i amb èxit d’aquesta espècie al Parc del Foix. A les terres de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf per ara tan sols es disposava d'algunes dades (molt poques) d'intents de nidificació, que en alguna ocasió no van arribar a bona fi. Aquest 2002 tan sols ha estat anotada com a migrant.

### Oreneta cuablanca (*Delichon urbica*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |
|-------------|--|
| - sedentari |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |

|             |   |
|-------------|---|
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Abril - juny       | x |
| Juliol - setembre  | x |
| Octubre - desembre | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            | x |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 15-8-2002 s'observen exemplars joves sortits del niu fa uns dies.

Estival                                      primera citació prenupcial – 6-3-2002  
última citació postnupcial – 13-10-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - En el pas migratori postnupcial hi ha dies de grans concentracions; formen estols amb un gran nombre d'orenets bastant agrupades que viatgen cap al sud-oest.

Hi ha una bon nombre d'orenets cuablanques que nien al Parc del Foix, sobretot als nuclis urbans. És de costums força gregaris i se sol reproduir en colònies més o menys grans. Ha minvat força respecte uns quants anys enrera.

### **Trobat** (*Anthus campestris*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       | x        |          |             |
| anys anteriors |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 5-7-2002 anotem conductes territorials a les muntanyes del Preparc, per la zona del Maset del Rossell.

Estival primera citació prenupcial – 22-5-2002 (PTE)  
última citació postnupcial – 4-8-2002 (PTE)

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |  |
| Estable                                                        |   |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

### Piula dels arbres (*Anthus trivialis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          |   |  |
| Abril - juny                          |   |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    |   |  |

Migrant primera citació postnupcial – 15-8-2002  
última citació postnupcial – 28-9-2002

### Titella (*Anthus pratensis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant | x |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          | x |  |
| Abril - juny                          | x |  |
| Juliol - setembre                     |   |  |
| Octubre - desembre                    | x |  |

Hivernant última citació prenupcial – 2-4-2002  
primera citació postnupcial – 12-10-2002

Observacions d'interès – A la titella se la sol veure en zones agrícoles; camps poc llaurats i ermots, a vegades també pot atansar-se a àrees forestals que tinguin vegetació baixa. Les vores de l'aigua i alguns punts estanyats de la cua de l'embassament també li agraden força. Els mesos estivals aquí no s'hi observa, han migrat cap als països del nord a reproduir-se. Al Penedès tan sols és una au hivernant.

Al mes d'octubre es van detectar exemplars migrants des de les muntanyes més altes del Parc del Foix.

El 26-12-2002 un grupet d'aproximadament 20 exemplars es deixa caure als canyissars de la cua de l'embassament per ajocar-s'hi.

### Grasset de muntanya (*Anthus spinoletta*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998 (possibles)

### Grasset de costa (*Anthus petrosus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1998

### Cuereta groga (*Motacilla flava*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |  |
|-------------|--|--|
| - sedentari |  |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Gener - març                          |  |  |

|             |   |
|-------------|---|
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Abril - juny       |   |
| Juliol - setembre  | x |
| Octubre - desembre |   |

Observacions d'interès - Va ser observada alguns dies durant el pas migratori postnupcial (11-9-2002 al 22-9-2002). En el pas de primavera no es va citar.

### **Cuereta torrentera** (*Motacilla cinerea*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           |       |          | x        |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 12-5-2002  
                                      primera citació postnupcial – 27-7-2002

Observacions d'interès - Tot i que algun any es pot observar com a sedentària, el més habitual és que a l'estiu es desplaci cap a cursos fluvials més nets o cabalosos. Per tant, en general cal considerar la cuereta torrentera com a una espècie hivernant. Les citacions d'aquest 2002, però, s'allarguen fins a meitats de juny per la qual cosa pensem que hi ha possibilitats que hagués niat en algun tram recòndit del riu Foix, proper al pantà. En anys passats havia niat excepcionalment per la zona de la Timba i al riu Foix a prop de les Masuques.

Al setembre i octubre es va anotar el pas d'alguns exemplars migrants des dels cims del puig de l'Àliga i del Turó de les Tres Partions.

### **Cuereta blanca** (*Motacilla alba*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |
|----------------------------------------------|--|
|----------------------------------------------|--|

| nidificants |   |
|-------------|---|
| 1 a 10      |   |
| 10 a 100    | x |
| Més de 100  |   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats | x |
| Conreus, ermots i marges        | x |
| Penya-segats i roquissars       |   |
| Màquies i garrigues             |   |
| Bosc                            |   |
| Zones humides                   | x |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès – A l'octubre es van citar exemplars en pas migratori des dels cims més alts del Parc del Foix.

El 16-11-2002 aproximadament n'hi ha unes 50 que surten de la joca dels canyissars. El 23-11-2002 una estona abans de fer-se fosc unes 200 cueretes blanques s'alcen d'una joca al costat de la paret mig caiguda (a la cua de l'embassament), la presència d'un esparver n'és la causa.

A banda dels exemplars sedentaris, a l'hivern es nota un augment de cueretes blanques vingudes del nord. De dia es dispersen pels conreus i per les vores del pantà. Al vespre es reuneixen a les joques.

### **Cargolet** (*Troglodytes troglodytes*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 28-2-2002 trobem un niu vell en un forat d'una balma. El 12-5-2002 localitzem un niu amb ous, els adults estan covant. El 28-6-2002 anotem un grup de joves que fa poc que han abandonat el niu.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       | x |

Observacions d'interès – El cargolet ha estat anotat al llarg de tot l'any. Ocupa les zones boscoses on hi ha un sotabosc més aviat frondós, tant el trobem a les vores del mateix embassament com a determinades àrees del preparc. El 30-11-2002 trobem un exemplar atropellat prop de Castellet.

### **Pardal de bardissa** (*Prunella modularis*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 6-3-2002  
primera citació postnupcial – 18-10-2002

Observacions d'interès - En general passa molt desapercebut, ja que s'amaga entre la vegetació, cal estar atents a les veus que emet.

### **Pit-roig** (*Erithacus rubecula*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Algunes parelles nidifiquen en determinats indrets, sobretot a sectors obacs i frondosos, tant del mateix embassament com en algunes fondalades. El 5-7-2002 s'observa un exemplar juvenil, que fa pocs dies que deu haver abandonat el niu.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       | x |

Observacions d'interès - A l'hivern esdevé molt abundant; n'arriben del nord, aquests hivernants s'afegeixen a la petita població sedentària. En aquesta època de l'any es poden anotar per qualsevol àrea del Parc del Foix.

### **Rossinyol** (*Luscinia megarhynchos*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |



|            |  |
|------------|--|
| - divagant |  |
|------------|--|

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                | x |

Comentaris sobre la nidificació – Hi ha un bon nombre de parelles que nidifiquen als entorns de l'embassament, al rossinyol li agraden els ambients freds i humits. També hi ha algunes parelles que nien a les muntanyes del preparc, aquí ho fan amb una densitat molt baixa, i sobretot estan ubicades a les fondalades. El dia 30-7-2002 s'observa un exemplar jove, sortit fa pocs dies del niu.

Estival                                      primera citació prenupcial – 19-4-2002  
última citació postnupcial – 17-9-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Durant l'abril i el maig canten molt i resulten fàcils de localitzar, al juny ja canten menys i a partir de llavors tan sols emeten unes veus molt discretes o resten en silenci, per això són més difícils de situar.

### **Cotxa blava** (*Luscinia svecica*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998, 1999 i 2000

### **Cotxa fumada** (*Phoenicurus ochruros*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Sols disposem de dades de l'any 2000 i 2001 sobre la seva nidificació a una pedrera de Uniland (que més aviat queda fora els límits del Parc del Foix). També el passat 2001 ens va semblar que ho podia haver fet a les ruïnes de cal Balaguer. És una espècie que en època de cria passa molt desapercebuda, a més de ser molt escassa.

Hivernant                      última citació prenupcial – 16-3-2002  
                                      primera citació postnupcial – 7-10-2002

Observacions d'interès - El 24-2-2002 trobem les restes d'un exemplar depredat a l'interior d'una balma al fondo del Perot.

### **Cotxa cua-roja** (*Phoenicurus phoenicurus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

Migrant                      primera citació prenupcial – 25-4-2002 (PTE)  
                                      última citació prenupcial – 16-5-2002 (PTE)  
                                      primera citació postnupcial – 21-8-2002 (PTE)  
                                      última citació postnupcial – 6-10-2002

### **Bitxac rogenic** (*Saxicola rubetra*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  |   |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie típicament migrant, tot i que pot ser relativament habitual, s'observa molt poc al Parc del Foix. Es va anotar els dies 16-4-2002 i 15-9-2002 (PTE).

### **Bitxac comú** (*Saxicola torquata*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |   |
|-------------|---|---|
| - sedentari |   | x |
| - estival   |   |   |
| - hivernant | x |   |
| - de pas    | x |   |
| - divagant  |   |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 a 10                            |  |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |



última citació postnupcial – 17-7-2002 (PTE)

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - El còbit és una espècie estival que de forma molt localitzada nia a les muntanyes del Preparc. Se situa en ambients naturals on hi ha un predomini de la vegetació baixa i s'hi alternen clapes rocoses. La seva densitat és molt i molt baixa.

### **Còbit roquer** (*Oenanthe leucura*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - El 3-8-2002 (PTE, HEH) a les roques Boveres s'observa un exemplar durant una bona estona. Aquesta citació possiblement correspon a un exemplar en dispersió postnupcial. No molt lluny del Parc del Foix hi ha algunes zones de nidificació d'aquesta espècie; per exemple al Garraf i al Montmell. Per altra banda caldrà estar a l'aguait per si alguna parella s'instal·la al Parc del Foix, ja que hi pot trobar ambients naturals favorables. En especial al còbit roquer li agrada ocupar penya-segats i zones rocoses, a vegades també es pot assentar en pedreres, tant si estan abandonades, com en actiu.

### **Merla roquera** (*Monticola saxatilis*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2001

### **Merla blava** (*Monticola solitarius*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              | x |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El dia 5-7-2002 observem actituds de zel. El 28-2-2002 trobem un niu vell en un forat d'una balma. El 13-12-2002 trobem un niu vell al forat d'una paret, al convent de Sant Domingo de Penyafort.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta és una au que es localitza a l'entorn d'ambients rocosos i també en algunes construccions derruïdes o abandonades. En el Parc del Foix hi podem situar diferents parelles nidificants, que tenen els seus territoris repartits, sobretot per les muntanyes del preparc. El 24-2-2002 a mig matí un mascle descansa amagat a la penombra dins una balma al fondo del Perot.

### Merla (*Turdus merula*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari | x |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    |   |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          | x |  |
| Abril - juny                          | x |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    | x |  |

| Nidificant     |   |       |          |          |             |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
|                |   | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x |       |          |          |             |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            |   |  |
| 10 a 100                          |   |  |
| Més de 100                        | x |  |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------|---|--|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |  |
| Conreus, ermots i marges                     | x |  |
| Penya-segats i roquissars                    |   |  |
| Màquies i garrigues                          | x |  |
| Bosc                                         | x |  |
| Zones humides                                | x |  |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - El 28-2-2002 es troben plomes i restes d'un exemplar depredat.

És un dels ocells que gaudeixen d'una densitat considerable arreu del Parc. Als entorns de l'embassament s'hi concentra un bon nombre de parelles, també a les boscúries més frondoses, als llocs més secs n'hi ha una quantitat menor.

### Griva cerdana (*Turdus pilaris*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari |   |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant | x |  |
| - de pas    | x |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          | x |  |
| Abril - juny                          |   |  |
| Juliol - setembre                     |   |  |
| Octubre - desembre                    | x |  |

Hivernant

última citació prenupcial – 9-1-2002 (PTE)  
primera citació postnupcial – 29-11-2002

Observacions d'interès - És una espècie que no es veu tots els anys, tan sols algun hivern que faci prou fred com per desplaçar-les de més al nord fins aquí.

### **Tord** (*Turdus philomelos*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       | x |

Observacions d'interès - A l'hivern s'anota en quantitats força considerables, en arribar la primavera sols en queda una petita part. Hi ha un nombre molt baix de parelles que es reproduïxen des de fa molt pocs anys al Parc del Foix.

El dia 25-3-2002 un exemplar està trencant cargols, es tracta d'un comportament típic d'aquesta espècie. Els cargols formen part de la dieta del tord, els trenquen per tal de poder-se'ls menjar.

El 25-10-2002 trobem un exemplar atropellat prop de Castellet, just en començar el camí que marxa cap al riu Foix i la Timba.

### **Tord ala-roig** (*Turdus iliacus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 11-2-2002  
                                      primera citació postnupcial – 13-12-2002

Observacions d'interès - Tan sols s'observen a l'hivern, a l'embassament hi troben un bon refugi, i durant els dies de caça n'hi sol haver uns quants, ja que poden escapar de les escopetes.

### **Griva** (*Turdus viscivorus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 5-5-2002 un adult porta becada. El 7-6-2002 observem 4 joves sortits fa poc del niu.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - Hi ha unes quantes parelles sedentàries que es reproduïxen a aquest espai natural. A l'hivern s'hi poden afegir d'altres exemplars provinents de terres més fredes. La griva pot viure repartida per diferents ambients naturals dels que trobem al Parc del Foix, de tota manera es presenta amb una densitat força baixa. En general la podem situar als bosquets de ribera i a les pinedes que flanquegen les terres de conreu.

### Rossinyol bord (*Cettia cetti*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

Comentaris sobre la nidificació – El dia 5-5-2002 un exemplar marca territori. El 12-5-2002 dos exemplars es persegueixen i realitzen una parada nupcial a més també marquen territori.





**Boscarla menjamosquits** (*Acrocephalus palustris*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 1999

**Boscarla de canyar** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Migrant

primera citació postnupcial – 27-7-2002

última citació postnupcial – 27-9-2002

Observacions d'interès – Com s'esdevé la majoria d'anys, la boscarla de canyar aquest any tan sols ha estat citada durant el pas migratori postnupcial. En el pas migratori primaveral no es va poder anotar. La fenologia d'aquest moixó es correspon a la d'una espècie migrant, tot i això, algun any podria haver-se reproduït a la cua de l'embassament.

**Balquer** (*Acrocephalus arundinaceus*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1997, 1998, 2000 i 2001

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

**Bosqueta pàl·lida** (*Hippolais pallida*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1973

**Bosqueta vulgar** (*Hippolais polyglotta*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

|            |  |
|------------|--|
| - divagant |  |
|------------|--|

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                | x |

Comentaris sobre la nidificació – Hi ha una certa quantitat de parelles reproductores que es reparteixen per diferents sectors del Parc del Foix, algunes molt a prop de l'embassament, d'altres a les muntanyes del prearc o a l'entorn de zones agrícoles, sempre en espais poc o gens arbrats. El 26-6-2002 una parella marca territori. Un cop finalitzada l'època de cria ja no canten i en general passen molt desapercebudes.

Estival                                      primera citació prenupcial – 26-4-2002  
última citació postnupcial – 15-8-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

### Tallareta cuallarga (*Sylvia undata*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Durant el període apte per a la reproducció n'hi ha una bona densitat en alguns sectors muntanyosos, a les àrees de vegetació baixa. El 5-7-2002 observem un grup de joves, que encara resten molt lligats al territori de cria.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |

|          |  |
|----------|--|
| Augmenta |  |
|----------|--|

Observacions d'interès - Aquesta és una au que viu a les muntanyes del prepark, en zones obertes on hi ha un predomini arbustiu. En general es pot citar al llarg de tot l'any. Els hiverns que fa molt de fred solen abandonar aquestes muntanyes i desplaçar-se a altres indrets més temperats (a vegades a la mateixa costa), però en hiverns com els dels darrers anys (que amb prou feines glaça) no marxen.

### Tallarol de garriga (*Sylvia cantillans*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |   |
|-------------|---|---------------------------------------|---|
| - sedentari |   | Gener - març                          |   |
| - estival   |   | Abril - juny                          | x |
| - hivernant |   | Juliol - setembre                     | x |
| - de pas    | x | Octubre - desembre                    |   |
| - divagant  |   |                                       |   |

Migrant primera citació postnupcial – 26-8-2002  
última citació postnupcial – 28-9-2002

Observacions d'interès - Aquest és un tallarol que al Penedès sobretot nidifica a la serralada Prelitoral. A les muntanyes del Parc del Foix, ubicades a la serralada Litoral, no tenim constància que s'hi hagi reproduït mai, només s'hi observa durant els passos migratoris. Aquest any el tallarol de garriga va ser citat al pas prenupcial només el dia 9-4-2002, en canvi al pas postnupcial es va anotar bastantes vegades.

### Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |   |
|-------------|---|---------------------------------------|---|
| - sedentari | x | Gener - març                          | x |
| - estival   |   | Abril - juny                          | x |
| - hivernant |   | Juliol - setembre                     | x |
| - de pas    |   | Octubre - desembre                    | x |
| - divagant  |   |                                       |   |

| Nidificant     |   | segur | probable | possible | no detectat |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
| 2002           | x |       |          |          |             |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   | Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| 10 a 100                          |   | Conreus, ermots i marges                     | x |
| Més de 100                        | x | Penya-segats i roquissars                    |   |
|                                   |   | Màquies i garrigues                          | x |
|                                   |   | Bosc                                         | x |
|                                   |   | Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – La seva densitat és força alta, hi ha un bon nombre de parelles nidificants repartides per qualsevol lloc del Parc del Foix (llevat de l'interior de les zones urbanes no ajardinades). Al llarg de molts dies d'estiu s'observen polls volanders acabats de sortir del niu. El 19-4-2002 anotem un exemplar en zel.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

|                                       |                    |   |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| Observacions al llarg dels trimestres |                    |   |
|                                       | Gener - març       | x |
|                                       | Abril - juny       | x |
|                                       | Juliol - setembre  | x |
|                                       | Octubre - desembre | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Boscors                                      | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Algunes parelles nien a diferents indrets boscosos, sempre i quan siguin suficientment frescos, en general el podem trobar a algunes obagues frondoses i als boscos de ribera. El dia 7-6-2002 anotem un exemplar jove.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       | x |  |

Observacions d'interès - El tallarol de casquet es pot veure al llarg de tot l'any, si bé la seva presència és detectada més aviat per les veus i cants que emet, que no pas per les vegades que es deixa observar. Durant els períodes de pas, i de forma més pronunciada a la tardor, són molt abundants.

### Mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Boscors                                      | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Aquesta és una espècie estival, que es reproduïx en quantitat molt baixa als entorns de l'embassament. El 5-7-2002 es va localitzar un grupet d'exemplars joves que feia poc havien abandonat el niu.

Estival  
primera citació prenupcial – 9-4-2002  
última citació postnupcial – 6-9-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |  |  |

|          |   |
|----------|---|
| Estable  | x |
| Augmenta |   |

Observacions d'interès - Tot i que en veure'l hi ha una certa dificultat per identificar-lo, el seu cant és inconfusible. Els dies que arriben i mentre dura l'aparellament canten molt. Un cop han finalitzat la seva nidificació pràcticament no canten, sols emeten una veu més aviat suau i discreta.

### **Mosquiter xiulaire** (*Phylloscopus sibilatrix*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1977 (el 2000 citació possible)

### **Mosquiter comú** (*Phylloscopus collybita*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El dia 23-5-2002 al fondo de l'Alzina un mascle canta insistentment, al cap de poca estona descobrim la parella d'adults que estan alimentant a dos o tres polls que acaben de sortir del niu. Aquesta parella es va situant en algunes visites posteriors al mateix lloc. A més també se'n localitza una altra al torrent del Llampeig que també canta en aquestes dates corresponents al seu període reproductor.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       | x |

Observacions d'interès - D'entre els mosqueters aquesta és l'única espècie que es pot veure a l'hivern. Hi ha dies en què n'hi ha una quantitat prou notable, se'ls pot observar per les parts altes dels arbres tot realitzant vols de caça. Consumeixen una munió de petits insectes. Els dies d'hivern que comença a fer bon temps i fins a l'arribada de la primavera molts exemplars hivernants canten força.

### **Mosquiter de passa** (*Phylloscopus trochilus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Migrant

primera citació prenupcial – 19-4-2002  
última citació prenupcial – 12-5-2002  
primera citació postnupcial – 15-8-2002  
última citació postnupcial – 27-9-2002

### **Reietó** (*Regulus regulus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie de fenologia hivernant, que no s'anota tots els hiverns. Es va anotar només a principis d'any, al gener i febrer.

### **Bruel** (*Regulus ignicapillus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Boscors                                      | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Hi ha unes quantes parelles que nidifiquen a punts localitzats del Parc del Foix, en àrees boscoses. Els dies 7-6-2002, 5-7-2002 i 8-7-2002 observem exemplars juvenils.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - Com en anys anteriors, aquesta és una espècie que es pot observar, o bé podem escoltar les seves veus i cants, al llarg de tot l'any. Els mesos més freds de l'any en pot augmentar un xic la seva població ja que arriben alguns individus hivernants.

### **Papamosques gris** (*Muscicapa striata*)

Observat el 2002

| Fenologia |
|-----------|
|-----------|

| Observacions al llarg dels trimestres |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gener - març       |   |
| Abril - juny       | x |
| Juliol - setembre  | x |
| Octubre - desembre |   |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Hi ha unes poques parelles que es reproduïxen a diferents àrees de bosc de ribera de les mateixes vores del pantà o del riu Foix. Un cop han finalitzat la seva nidificació passen força desapercebuts, i aviat emprenen les seves migracions. El 30-5-2002 un exemplar amb becada intervé a un niu. El 26-6-2002 els dos membres d'una parella porten becada. El 15-8-2002 anotem exemplars joves.

Estival                                      primera citació prenupcial – 23-5-2002  
última citació postnupcial – 6-9-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

### **Mastegatxes** (*Ficedula hypoleuca*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Migrant                                      primera citació prenupcial – 26-4-2002  
última citació prenupcial – 12-5-2002  
primera citació postnupcial – 15-8-2002  
última citació postnupcial – 27-9-2002

Observacions d'interès - El mastegatxes només s'observa durant els períodes migratoris, hi ha dies en els quals són força abundants, tot i que en general acostumen a passar més aviat desapercebuts. Es poden sedimentar un breu temps a l'entorn de zones boscoses.

### **Mallerenga cuallarga** (*Aegithalos caudatus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |



|            |  |
|------------|--|
| - de pas   |  |
| - divagant |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Octubre - desembre | x |
|--------------------|---|

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 28-2-2002 s'observa una parella que està construint niu. El 12-5-2002 uns adults porten becada. Durant força dies s'anoten exemplars joves (18-5-2002, 23-5-2002, 30-5-2002, 26-6-2002 i 5-7-2002).

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta és una au sedentària que podem trobar a força indrets del Parc del Foix. La major part de l'any van en estols mixtes, junt amb d'altres espècies de mallerengues, amb bruels, mosqueters i raspinells. Durant els mesos aptes per a la reproducció se les veu aparellades.

### Mallerenga emplomallada (*Parus cristatus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 12-5-2002 observem un exemplar amb becada. El 5-7-2002 i el 30-7-2002 s'observen exemplars joves sortits del niu.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |

|          |  |
|----------|--|
| Augmenta |  |
|----------|--|

Observacions d'interès - Aquesta mallerenga sobretot ocupa àrees boscoses, en especial li agrada estar a prop de llocs on troba arbres morts (cremats, etc.), ja que aprofita per buscar-hi erugues i petits insectes. En general la seva població es pot considerar sedentària, i per tant s'observa al llarg de tot l'any.

### Mallerenga petita (*Parus ater*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  | x |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  |   |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  |   |

| Nidificant     |  |       |          |          |             |
|----------------|--|-------|----------|----------|-------------|
|                |  | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |  | x     |          |          |             |
| anys anteriors |  |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  | x |
| 10 a 100                          |  |   |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |  |   |
| Conreus, ermots i marges                     |  |   |
| Penya-segats i roquissars                    |  |   |
| Màquies i garrigues                          |  |   |
| Bosc                                         |  | x |
| Zones humides                                |  |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 23-5-2002 observem una parella cantant amb certa insistència, més tard descobrim que entren amb becada a un niu situat a una paret de pedres i ciment. Un cop localitzat aquest niu podem observar (de lluny) com hi intervien seguidament.

El nombre de parelles que es reproduïxen als entorns del pantà és molt baix, almenys n'hem detectat dues de diferents. En general sempre es mouen per un sector boscós i obac a l'entorn de les muntanyes de cal Bladet, on el bosc està més ben desenvolupat i els pins són més grans. Malgrat això, a l'hivern es poden allunyar una mica dels seus territoris.

### Mallerenga blava (*Parus caeruleus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |  |   |
|-------------|--|---|
| - sedentari |  | x |
| - estival   |  |   |
| - hivernant |  |   |
| - de pas    |  |   |
| - divagant  |  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

| Nidificant     |  |       |          |          |             |
|----------------|--|-------|----------|----------|-------------|
|                |  | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |  | x     |          |          |             |
| anys anteriors |  | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            |  |   |
| 10 a 100                          |  | x |
| Més de 100                        |  |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|----------------------------------------------|--|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |  | x |
| Conreus, ermots i marges                     |  |   |
| Penya-segats i roquissars                    |  |   |
| Màquies i garrigues                          |  |   |
| Bosc                                         |  | x |

|               |  |
|---------------|--|
| Zones humides |  |
|---------------|--|

Comentaris sobre la nidificació – El 26-4-2002 localitzem un niu ocupat d'aquesta espècie. El 23-5-2002 observem una parella que entra al niu, està situat a dalt d'un pal metàl·lic foradat. El 7-6-2002 veiem polls volanders, acaben d'abandonar el niu. El 5-7-2002 s'observen joves.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Hi ha unes quantes parelles de mallerenga blava escampades per diferents sectors del Parc del Foix, sobretot prop de l'embassament i del riu Foix, de tota manera és un ocell poc abundant.

### **Mallerenga carbonera** (*Parus major*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  | Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| - sedentari | x |  | Gener - març                          | x |  |
| - estival   |   |  | Abril - juny                          | x |  |
| - hivernant |   |  | Juliol - setembre                     | x |  |
| - de pas    |   |  | Octubre - desembre                    | x |  |
| - divagant  |   |  |                                       |   |  |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            |   |  | Zones urbanes o nuclis habitats              |   |  |
| 10 a 100                          |   |  | Conreus, ermots i marges                     | x |  |
| Més de 100                        | x |  | Penya-segats i roquissars                    |   |  |
|                                   |   |  | Màquies i garrigues                          | x |  |
|                                   |   |  | Bosc                                         | x |  |
|                                   |   |  | Zones humides                                |   |  |

Comentaris sobre la nidificació – El 23-5-2002 una parella alimenta polls volanders. Els dies 12-5-2002, 28-5-2002, 7-6-2002 i 18-6-2002 observem exemplars juvenils. Com d'altres espècies de petits ocells la mallerenga carbonera pot realitzar una posta més primerenca i una segona posta més tardana.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta és una au sedentària que està establerta a força zones del Parc, és bastant abundant. Té un cant molt potent i característic que és inconfusible, a més pot fer una bona varietat de veus i reclams. Sovint és més fàcil de localitzar pels sons que emet, tot i que també es deixa veure bastant.

### **Raspinell** (*Certhia brachydactyla*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  | Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| - sedentari | x |  | Gener - març                          | x |  |
| - estival   |   |  | Abril - juny                          | x |  |
| - hivernant |   |  | Juliol - setembre                     | x |  |
| - de pas    |   |  | Octubre - desembre                    | x |  |

|            |  |
|------------|--|
| - divagant |  |
|------------|--|

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 19-4-2002 un exemplar transporta algun material al bec, podria estar fent niu o fins i tot alimentant polls. El 12-5-2002 observem com una parella dona becada als polls volanders. El 27-7-2002 s'anoten joves.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie molt lligada als arbres, s'alimenta dels insectes que troba entre les esclotxes de l'escorça dels troncs i grans branques dels arbres. En general és més habitual escoltar el seu cant o la seva veu que no pas que es deixi observar, de tota manera sovint el podem veure ascendint pels troncs dels pins i d'altres arbres.

### **Teixidor** (*Remiz pendulinus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 20-3-2002  
                                          primera citació postnupcial – 25-10-2002

Observacions d'interès – El teixidor se sol citar a l'hivern, gairebé sempre al mateix lloc; entre la vegetació de canyissars negats d'aigua que hi ha a les vores del tram on el riu Foix inicia l'embassament.

La citació del 30-5-2002, a banda de resultar força sorprenent, ens fa pensar que hi ha possibilitats que aquesta espècie nidifiqui en algun bosc de ribera del Foix. Fa anys s'havia localitzat riu Foix amunt, a uns 7 o 8 quilòmetres del Parc del Foix. Al proper riu Anoia també hi nia de forma estable i amb certa densitat.

### **Oriol** (*oriolus oriolus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   | x |
| - hivernant |   |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |            |   |
|-----------------------------------|------------|---|
|                                   | 1 a 10     |   |
|                                   | 10 a 100   | x |
|                                   | Més de 100 |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Estival                                      primera citació prenupcial – 26-4-2002  
última citació postnupcial – 6-9-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |                                  |   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                                                                | Disminueix, espècie en regressió |   |
|                                                                | Estable                          | x |
|                                                                | Augmenta                         |   |

Observacions d'interès - Com en anys anteriors a l'agost o setembre s'agrupen a dormir al bosquet de ribera de la cua de l'embassament. El 28-8-2002 surten 5 exemplars dels dormiders i més tard se'n veuen 3 més.

L'oriol és un ocell estival que ens crida l'atenció pel seu bonic cant, també fa una veu prou singular i distintiva. Cal anar amb compte a no confondre alguns dels sons que emeten els estornells, ja que a vegades intenten imitar-lo.

### Botxí (*Lanius excubitor*)

Observat el 2002

| Fenologia |             |   |
|-----------|-------------|---|
|           | - sedentari | x |
|           | - estival   |   |
|           | - hivernant |   |
|           | - de pas    |   |
|           | - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |                    |   |
|---------------------------------------|--------------------|---|
|                                       | Gener - març       | x |
|                                       | Abril - juny       | x |
|                                       | Juliol - setembre  | x |
|                                       | Octubre - desembre | x |

| Nidificant |                |       |          |          |             |
|------------|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|            |                | segur | probable | possible | no detectat |
|            | 2002           | x     |          |          |             |
|            | anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |            |   |
|-----------------------------------|------------|---|
|                                   | 1 a 10     | x |
|                                   | 10 a 100   |   |
|                                   | Més de 100 |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – A les zones muntanyoses amb predomini arbustiu hi trobem algunes parelles nidificants, també n'hi ha alguna que ho fa en terres més planeres, a l'entorn dels cultius on s'hi combinen ermots i marges.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |                                  |   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                                                                | Disminueix, espècie en regressió |   |
|                                                                | Estable                          | x |
|                                                                | Augmenta                         |   |



| nidificants |   |
|-------------|---|
| 1 a 10      |   |
| 10 a 100    | x |
| Més de 100  |   |

| Zones urbanes o nuclis habitatats |   |
|-----------------------------------|---|
| Conreus, ermots i marges          |   |
| Penya-segats i roquissars         |   |
| Màquies i garrigues               | x |
| Bosc                              | x |
| Zones humides                     |   |

Comentaris sobre la nidificació – Els dies 18-6-2002 i 15-8-2002 s'observen exemplars juvenils.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - El gaig és un còrvid que podem trobar tot l'any a la major part de llocs del Parc del Foix. No és una au molt abundant, però se sol situar força sovint mercès als crits escandalosos que fa  
El 7-6-2002 un gaig es baralla amb una merla.

### **Garsa** (*Pica pica*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            | x |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie que se sol veure per les terres de conreu que hi ha al costat del riu Foix. També pels volts del Turó de les Tres Partions n'hi ha alguna que hi arriba procedent de les urbanitzacions properes. Tot i ser una au relativament comuna i fàcil de veure a moltes zones de l'embassament o del parc no hi és present.

### **Gralla** (*Corvus monedula*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys - 2001

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |

|             |  |
|-------------|--|
| - hivernant |  |
| - de pas    |  |
| - divagant  |  |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès – Aquest any no hem vist cap vegada a la gralla. A la pedrera on nidificaven els darrers anys s'ha estat treballant a la zona on tenien els nius, i això les pot haver desplaçat més lluny del Parc del Foix.

Sembla ser que aquesta era la darrera localitat de les comarques que envolten el pantà (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) on encara hi havia alguna parella de gralla que s'hi reproduïa, almenys fins al passat 2001.

### **Corb** (*Corvus corax*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitatats            |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie sedentària que durant molts anys es va reproduir als entorns del pantà de Foix, en diverses de les zones on hi ha penya-segats, encara que siguin més aviat petits.



Aquest gran còrvid sembla afectat per un o altre problema. Les seves poblacions han davallat molt arreu del Penedès, i ara és un ocell molt més escàs que fa uns anys. Al Parc del Foix el corb sembla haver desaparegut com a nidificant.

### Estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |  |  |   |
|-------------|---|---------------------------------------|--|--|---|
| - sedentari | x | Gener - març                          |  |  | x |
| - estival   |   | Abril - juny                          |  |  | x |
| - hivernant | x | Juliol - setembre                     |  |  | x |
| - de pas    | x | Octubre - desembre                    |  |  | x |
| - divagant  |   |                                       |  |  |   |

  

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

  

| Estimació de parelles nidificants |   | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   | Zones urbanes o nuclis habitats              | x |
| 10 a 100                          |   | Conreus, ermots i marges                     |   |
| Més de 100                        | x | Penya-segats i roquissars                    |   |
|                                   |   | Màquies i garrigues                          |   |
|                                   |   | Bosc                                         |   |
|                                   |   | Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – El 12-5-2002 anotem alguns exemplars amb becada. El 16-6-2002 hi ha unes quantes parelles que intervenen als nius.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Hi ha diverses parelles d'estornell vulgar establertes sobretot als nuclis urbans i en alguna urbanització, sempre en àrees humanitzades. A l'hivern n'arriben molts exemplars que formen grans estols. Sovint s'ajouen a les canyes de la cua de l'embassament i darrerament també ho fan en alguns grans arbres.

Hi ha alguns exemplars d'estornell vulgar que hibriden amb l'estornell negre.

### Estornell negre (*Sturnus unicolor*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   | Observacions al llarg dels trimestres |  |  |   |
|-------------|---|---------------------------------------|--|--|---|
| - sedentari | x | Gener - març                          |  |  | x |
| - estival   |   | Abril - juny                          |  |  | x |
| - hivernant |   | Juliol - setembre                     |  |  | x |
| - de pas    |   | Octubre - desembre                    |  |  | x |
| - divagant  |   |                                       |  |  |   |

  

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

  

| Estimació de parelles nidificants |  | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|---|
| 1 a 10                            |  | Zones urbanes o nuclis habitats              | x |
|                                   |  | Conreus, ermots i marges                     |   |

|            |   |
|------------|---|
| 10 a 100   |   |
| Més de 100 | x |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Penya-segats i roquissars |  |
| Màquies i garrigues       |  |
| Bosc                      |  |
| Zones humides             |  |

Comentaris sobre la nidificació – El 12-5-2002 anotem alguns exemplars amb becada.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - D'aquest estornell gairebé se'n pot dir el mateix que de l'espècie anterior. Hi ha alguns exemplars d'estornell negre que hibriden amb l'estornell vulgar, aleshores resulta força complicat de diferenciar a les dues espècies.

### **Pardal** (*Passer domesticus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari | x |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    |   |  |
| - divagant  |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          | x |  |
| Abril - juny                          | x |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    | x |  |

| Nidificant     |   |       |          |          |             |
|----------------|---|-------|----------|----------|-------------|
|                |   | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x |       |          |          |             |
| anys anteriors | x |       |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            |   |  |
| 10 a 100                          |   |  |
| Més de 100                        | x |  |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------|---|--|
| Zones urbanes o nuclis habitat               | x |  |
| Conreus, ermots i marges                     | x |  |
| Penya-segats i roquissars                    |   |  |
| Màquies i garrigues                          |   |  |
| Bosc                                         |   |  |
| Zones humides                                |   |  |

Comentaris sobre la nidificació – Aquesta és una espècie sedentària que en general trobem als entorns urbans. Ocupen sobretot les poblacions i també les cases de les urbanitzacions, a vegades també n'hi ha algunes parelles en cases solitàries o en masies (per exemple a la caseta de la presa de l'embassament). N'hi ha bastantes parelles reproductores, que solen fer niu sota les teules o en altres forats. El 5-7-2002 intervenen als nius. El 15-8-2002 observem exemplars joves.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

### **Pardal xarrec** (*Passer montanus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  |
|-------------|---|--|
| - sedentari | x |  |
| - estival   |   |  |
| - hivernant |   |  |
| - de pas    |   |  |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Gener - març                          | x |  |
| Abril - juny                          | x |  |
| Juliol - setembre                     | x |  |
| Octubre - desembre                    | x |  |

|            |  |
|------------|--|
| - divagant |  |
|------------|--|

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               | x |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Sovint s'anoten exemplars als conreus que hi ha a la cua del pantà. Algunes parelles nidifiquen per aquesta part del Parc; en forats de torres elèctriques i en forats d'oliveres, també solen situar nius a les parets de la Timba. El 5-5-2002 observem actituds de zel. El 16-7-2002 un adult transporta becada. El 28-8-2002 es veu un grupet d'exemplars joves.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta espècie ocupa zones més aviat rurals, tot i que també pot estar a l'entorn d'àrees més urbanes.

Podem considerar el pardal xarrec com una espècie sedentària, a l'hivern la seva població és més gregària, s'observen agrupats per les zones agrícoles, en especial als camps que encara no estan llaurats, hi busquen llavors de plantes silvestres, de les anomenades "males herbes".

### **Pardal roquer**(*Petronia petronia*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    | x |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Aquesta és una espècie molt localitzada que viu en algunes àrees rocoses dels entorns del pantà. Hi ha algunes poques parelles que es reproduïxen a les pedreres dels entorns de Clariana i també de Santa Margarida i els Monjos, a més també n'hi ha a algun dels penya-segats dels entorns del

pantà. Ha estat anotat algunes vegades que s'han visitat aquests indrets, i també ocasionalment més a prop del pantà de Foix.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

### **Pinsà** (*Fringilla coelebs*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  |   |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 16-3-2002  
                                          primera citació postnupcial – 26-9-2002

Observacions d'interès - De dia són molt abundants a les terres de conreu, sobretot als camps que encara no estan llaurats, ja que cerquen aliment entre les herbes ruderals. Al Vespre entren a ajocar-se a les extensions boscoses que envolten l'embassament.

Entre el 26-9-2002 i el 27-10-2002 des dels cims del puig de l'Àliga i el turó de les Tres Partions es van anotar molts exemplars migrants en vol cap al sud-oest.

El 20-2-2002 trobem plomes i restes d'un exemplar depredat.

El pinsà és una espècie típicament hivernant, en general molt abundant. Tot i això, l'any 1999 es va anotar un mascle cantant en ple estiu per la zona del riu Foix, la qual cosa ens va fer pensar en la possibilitat que excepcionalment hi pogués haver alguna parella reproductora. Al Penedès la nidificació és ben consolidada a la serralada Prelitoral, i esporàdicament ho poden fer a la serralada Litoral. Aquest any no ha estat citat en època reproductora.

### **Pinsà mec** (*Fringilla montifringilla*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1998 (exemplar possible)

### **Gafarró** (*Serinus serinus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   | x |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Gener - març                          |  | x |
| Abril - juny                          |  | x |
| Juliol - setembre                     |  | x |
| Octubre - desembre                    |  | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              | x |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         | x |

|               |  |
|---------------|--|
| Zones humides |  |
|---------------|--|

Comentaris sobre la nidificació – Entre els dies 12-5-2002 i 8-7-2002 sovint s'observen exemplars juvenils, moltes vegades encara vam amb els seus progenitors.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - El gafarró és una espècie que es pot observar durant tot l'any, a l'hivern forma estols que a vegades es desplacen fins als conreus no llaurats, aquests grups poden ser bastant numerosos. També en trobem en terrenys boscosos, pràcticament es pot anotar arreu del Parc del Foix.

Una mica abans de la primavera canten molt, i seguidament realitzen vols de zel. Un cop han finalitzat la seva activitat reproductora esdevenen una mica més discrets. A la tardor s'anoten alguns exemplars que travessen les muntanyes del Parc en vols migratoris, directes cap al sud-oest.

### Verdum (*Carduelis chloris*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  | Observacions al llarg dels trimestres |   |  |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| - sedentari | x |  | Gener - març                          | x |  |
| - estival   |   |  | Abril - juny                          | x |  |
| - hivernant | x |  | Juliol - setembre                     | x |  |
| - de pas    | x |  | Octubre - desembre                    | x |  |
| - divagant  |   |  |                                       |   |  |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |  |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------------------|---|--|
| 1 a 10                            |   |  | Zones urbanes o nuclis habitat               | x |  |
| 10 a 100                          | x |  | Conreus, ermots i marges                     | x |  |
| Més de 100                        |   |  | Penya-segats i roquissars                    |   |  |
|                                   |   |  | Màquies i garrigues                          |   |  |
|                                   |   |  | Bosc                                         | x |  |
|                                   |   |  | Zones humides                                |   |  |

Comentaris sobre la nidificació – El dia 18-6-2002 s'observa un grupet de joves.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Quan comença a fer bon temps ja es van aparellant i se sent cantar als mascles. El verdum ocupa diverses àrees del Parc del Foix; terres conreades, diferents sectors de muntanya i també alguns parcs i jardins de nuclis urbans.

A la tardor i a l'hivern se'ls acostuma a veure en agrupacions a l'entorn dels conreus que encara no han estat llaurats o a les vores on hi creixen ravenisses, blets i altres herbes ruderals, a vegades van junt amb d'altres ocells fringíl·lids.

### Cadernera (*Carduelis carduelis*)

Observat el 2002

| Fenologia | Observacions al llarg dels trimestres |
|-----------|---------------------------------------|
|-----------|---------------------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gener - març       | x |
| Abril - juny       | x |
| Juliol - setembre  | x |
| Octubre - desembre | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        | x |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               | x |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Bosc                                         | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Moltes parelles nien a diferents punts del Parc. Els joves sortits del niu de primer se'ls veu junt amb els adults i després es poden agrupar en estols més grans. El dia 5-5-2002 s'observen polls que han sortit del niu fa molt poc. Entre el 18-6-2002 i el 28-8-2002 en moltes ocasions anotem exemplars joves que encara van en grups familiars.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - La cadenera és un ocell força comú arreu del Parc del Foix. N'hi ha una bona part que són sedentàries, a més també podem trobar exemplars hivernants i migrants.

Al mes d'octubre es van citar petits grups de migrants, en ruta cap al sud-oest. Els mesos de tardor i hivern se solen agrupar en estols que poden ser bastant nombrosos, sobretot volten per les terres agrícoles poc treballades, en especial els agraden els camps, els ermots i els marges on hi ha ravenisses i altres herbes que encara no han estat llaurades.

El 20-2-2002 trobem plomes i restes d'un exemplar depredat.

### **Lluer** (*Carduelis spinus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Hivernant                      última citació prenupcial – 13-1-2002  
                                      primera citació postnupcial – 12-10-2002

Observacions d'interès – Durant tot el mes d'octubre obtenim diverses citacions d'exemplars que passen migrant pels cims més alts del Parc del Foix, ho fan en petits grupets. Alguns d'aquests lluers s'arriben a sedimentar i es poden veure aturats en terres de conreu o als seus entorns. A l'hivern hi ha anys que se'n veuen bastants i d'altres anys en què se'n veuen pocs. Ha estat molt més abundant els darrers mesos de l'any.

### **Passerell** (*Carduelis cannabina*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     |   |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Hi ha unes quantes parelles sedentàries que es reproduïxen a les muntanyes del Parc del Foix.

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |
| Estable                                                        | x |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - Durant els mesos de tardor i hivern formen estols junt amb d'altres fringíl·lids, en aquestes èpoques de l'any sobretot s'observen a l'entorn de les zones de conreu, en especial als camps que no estan llaurats i als marges o ermots.

### **Trencapinyes** (*Loxia curvirostra*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant |   |
| - de pas    |   |
| - divagant  | x |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - El trencapinyes és un ocell que al Parc del Foix es cita de forma bastant esporàdica, això no vol dir que sigui molt difícil d'observar, sinó que més aviat és molt irregular. És una espècie que depèn molt de la fructificació dels pins i del temps que triguen les pinyes a deixar caure els pinyons. Al Parc del Foix la majoria dels pins són de l'espècie pi planc (*Pinus halepensis*), que deixen caure la llavor de seguida. Cal tenir present que la serralada Litoral queda més allunyada que altres serres que els són més favorables. Aquí el trencapinyes, en general, es deixa veure els anys que més al nord tenen bones reproduccions, quan allà esgoten l'aliment, inicien uns moviments dispersius més o menys erràtics per buscar menjar. Això pot esdevenir-se en qualsevol època de l'any ja que fins i tot nien a l'hivern, tot depèn de la quantitat de pinyes disponibles.

Aquest any es van observar el dia 8-6-2002 i el 8-7-2002, en la segona observació hi anaven exemplars adults i joves.

### **Pinsà borroner** (*Pyrrhula pyrrhula*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1950-1970 aprx. (arxiu Sc. ornitològica Museu de Vilafranca).

### **Durbec** (*Coccothraustes coccothraustes*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          |   |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

Observacions d'interès - Hi ha anys que se n'observen alguns, sobretot a la tardor, quan els lledoners tenen fruit. Aquesta és una espècie hivernant força escassa. La seva observació, entre d'altres factors, depèn força de les condicions que troben en zones més nòrdiques; si el temps i l'abundància d'aliment no els són favorables es desplacen cap al sud, en cas contrari gairebé no se'n veuen per aquí. Molt sovint els trobem a l'entorn dels boscos de ribera, cerquen aliment en diversos arbres i arbusts silvestres.

Enguany sols es va citar un exemplar solitari el 25-12-2002 al bosquet de ribera del costat del pont que travessa el riu Foix a la cua de l'embassament.

### Verderola (*Emberiza citrinella*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari |   |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    |   |

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie que al Parc del Foix costa molt d'observar. A les nostres comarques té una fenologia típicament hivernant, però sols se situa amb certa regularitat a punts molt localitzats de la serralada Prelitoral, sempre a les vores de conreus ubicats a bastanta altitud sobre el nivell del mar.

Les nevades de meitats del desembre 2001 van deixar la serralada Prelitoral i altres punts de la geografia catalana amb un gruix de neu molt considerable, això va provocar un desplaçament de molts ocells cap a terres menys nevades. Aquell desembre ja es va citar la verderola, i el 6-3-2002 es torna a citar al mateix indret.

### Gratapalles (*Emberiza cirulus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | x |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          | x |
| Juliol - setembre                     | x |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           | x     |          |          |             |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            |   |
| 10 a 100                          | x |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitats              |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          |   |
| Boscos                                       | x |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Els dies 27-7-2002 i 30-7-2002 observem exemplars joves.



| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| Disminueix, espècie en regressió                               |   |  |
| Estable                                                        | x |  |
| Augmenta                                                       |   |  |

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie que presenta una població sedentària, que a més sol incrementar-se amb exemplars hivernants. El gratapalles tot i tenir una densitat més aviat baixa pot ocupar bastants dels ambients naturals que hi ha al Parc del Foix. Els mascles canten pràcticament al llarg de tot l'any, si bé hi ha èpoques que ho fan molt poc, només a punta de dia. Sobretot se'ls pot trobar a l'entorn de les àrees agrícoles, en marginades, bosquets de ribera, pinedes, etc.

### Sit negre (*Emberiza cia*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  | Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|-------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| - sedentari | ? |  | Gener - març                          |  | x |
| - estival   |   |  | Abril - juny                          |  |   |
| - hivernant | x |  | Juliol - setembre                     |  |   |
| - de pas    | x |  | Octubre - desembre                    |  | x |
| - divagant  |   |  |                                       |  |   |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors |       | x        |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |  | Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |  |   |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------------------|--|---|
| 1 a 10                            | x |  | Zones urbanes o nuclis habitats              |  |   |
| 10 a 100                          |   |  | Conreus, ermots i marges                     |  |   |
| Més de 100                        |   |  | Penya-segats i roquissars                    |  |   |
|                                   |   |  | Màquies i garrigues                          |  | x |
|                                   |   |  | Bosc                                         |  |   |
|                                   |   |  | Zones humides                                |  |   |

Hivernant                      última citació prenupcial – 6-3-2002  
primera citació postnupcial – 19-10-2002

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie que en general presenta una fenologia hivernant. Amb tot, hi ha anys que alguna parella pot restar tota la temporada en determinades àrees de les muntanyes del prepirineu, i nidificar-hi.

### Hortolà (*Emberiza hortulana*)

No observat el 2002

Darreres observacions anys – 1950-1970 aprx. (arxiu Sc. ornitològica Museu de Vilafranca).

### Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |  | Observacions al llarg dels trimestres |  |   |
|-------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| - sedentari |   |  | Gener - març                          |  | x |
| - estival   |   |  | Abril - juny                          |  |   |
| - hivernant | x |  | Juliol - setembre                     |  |   |
| - de pas    | x |  | Octubre - desembre                    |  | x |
| - divagant  |   |  |                                       |  |   |

Hivernant                      última citació prenupcial – 6-3-2002  
primera citació postnupcial – 16-11-2002

Observacions d'interès - El repicatalons és un moixó que normalment fa vida a l'entorn dels ambients aquàtics. En general el podem trobar buscant aliment en la vegetació de canyes i canyissos que hi ha a la cua de l'embassament i també en alguns conreus poc llaurats. D'uns anys ençà sembla que ha augmentat progressivament la xifra de repicatalons que podem trobar al Parc del Foix.

Tenen diversos dormiders situats en els canyars i canyissars de la cua de l'embassament. El 13-1-2002 aproximadament uns 200 entren al dormider. El 26-12-2002 aproximadament uns 60 entren al dormider.

### **Cruixidell** (*Miliaria calandra*)

Observat el 2002

| Fenologia   |   |
|-------------|---|
| - sedentari | ? |
| - estival   |   |
| - hivernant | x |
| - de pas    | x |
| - divagant  |   |

| Observacions al llarg dels trimestres |   |
|---------------------------------------|---|
| Gener - març                          | x |
| Abril - juny                          |   |
| Juliol - setembre                     |   |
| Octubre - desembre                    | x |

| Nidificant     |       |          |          |             |
|----------------|-------|----------|----------|-------------|
|                | segur | probable | possible | no detectat |
| 2002           |       |          |          | x           |
| anys anteriors | x     |          |          |             |

| Estimació de parelles nidificants |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 a 10                            | x |
| 10 a 100                          |   |
| Més de 100                        |   |

| Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------|---|
| Zones urbanes o nuclis habitat               |   |
| Conreus, ermots i marges                     | x |
| Penya-segats i roquissars                    |   |
| Màquies i garrigues                          | x |
| Bosc                                         |   |
| Zones humides                                |   |

Comentaris sobre la nidificació – Fa 20 o 30 anys era molt abundant com a nidificant ocupava les zones conreades i de vegetació baixa. Els canvis que ha sofert l'agricultura al Penedès li han estat molt perjudicials, en especial l'afavoriment del monocultiu de la vinya a costa de la desaparició dels camps de cereal i sobretot de les vorades entre camps, que eren els llocs on feien el niu, també l'excessiva mecanització d'algunes tasques agràries.

El 2000 es va anotar un indret on hi havia una parella que possiblement hi va nidificar, per la zona del Corral de Muntanya, prop de Torrelletes. Aquest any 2002 no se n'ha localitzat cap, en tot cas n'hi pot haver un nombre tan baix (potser una o dues parelles) que resulten molt difícils de trobar.

Hivernant                      última citació prenupcial – 20-3-2002  
                                      primera citació postnupcial – 16-11-2002

| Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Disminueix, espècie en regressió                               | x |
| Estable                                                        |   |
| Augmenta                                                       |   |

Observacions d'interès - A l'hivern es poden observar alguns exemplars, però és poc habitual. Uns quants cruixidells acudeixen a un dormider de la cua de l'embassament, just a la zona dels canyissos, al mateix indret on s'ajouen els repicatalons. El 13-1-2002 aproximadament uns 30 exemplars entren al dormider. El 20-3-2002 aproximadament uns 10 exemplars entren al dormider, se sent algun cant. El 16-11-2002 n'hi ha uns 6 que surten de la joca dels canyissars.