

MEMÒRIA ORNITOLÒGICA DE L'ANY 2003

Recull de dades i textos a càrrec
d'Humbert Salvadó, Cisco Guasch i Xavier Bayer.



sumari

Sortides realitzades durant l'any
Nivell de les aigües a l'embassament
Meteorologia
Acció de l'home sobre el medi
Seguiment de les migracions d'aus rapinyaires i celebració del dia internacional de les aus
El cens d'ocells hivernants
El programa SOCC
El programa PERNIS
Els ocells del Parc del Foix al 2003
Annexes

- Annex 1 - Taula comprimida amb les observacions del 2003
- Annex 2 - Taula amb els totals, percentatges, ... de les observacions del 2003
- Annex 3 - Migració postnupcial de rapinyaires
- Annex 4 - Observacions d'altres vertebrats
- Annex 5 - Fitxes d'anàlisi d'egagròpiles
- Annex 6 - La participació al SOCC (còpies fitxes SOCC)
- Annex 7 - La participació al programa PERNIS (còpies fitxes PERNIS)
- Annex 8 - Mortalitat d'aus i altres animals a la carretera
- Annex 9 - Recull de premsa del 2003
- Annex 10 - Dades meteorològiques del 2003

* Sortides realitzades durant l'any

Al llarg de l'any 2003 s'ha fet un total de 108 sortides al Parc del Foix. Les visites realitzades a aquest espai natural, per mesos i trimestres, han estat les següents:

gener	8 sortides	1er. trimestre	23 sortides
febrer	7 sortides		
març	8 sortides		
abril	10 sortides	2on. trimestre	25 sortides
maig	9 sortides		
juny	6 sortides		
juliol	7 sortides	3er. trimestre	33 sortides
agost	9 sortides		
setembre	17 sortides		
octubre	12 sortides	4rt. trimestre	27 sortides
novembre	8 sortides		
desembre	7 sortides		

Com en els anys anteriors s'ha mantingut una mínima periodicitat de 4 visites mensuals. Al setembre i octubre és quan es fa un major nombre de visites, això és degut a què en aquests mesos hi ha el pas migratori postnupcial, que sobretot a les muntanyes del preparc és força espectacular. De fet aquest any s'ha anat al Parc del Foix en força ocasions, i tots els mesos.

El total d'hores que s'han dedicat a la recollida de dades en lessortides de camp és el següent:

1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt trimestre	TOTAL
64 h. 45 min.	82 h. 35 min.	97h. 40min.	89 h. 20 min.	334 h. 20 min.

Com sempre s'intenta diversificar els dies de visita i també els horaris, ja que així es poden contrastar millor les dades obtingudes. Els dies feiners els entorns del Parc del Foix gaudeixen d'una major tranquil.litat, en canvi els dies festius hi ha una notable presència de gent. Per aquesta raó es produeixen més alteracions a la calma que hi hauria d'haver als espais protegits. Ambtot, s'intenta d'anar-hi tant en feiners com en festius. Tot i que són molt millors els dies feiners, en els festius si s'hi va a primera hora encara hi ha tranquil.litat.

	1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt trimestre	TOTAL
dilluns	1	1	2	2	6 dies
dimarts	3	2	7	4	16 dies
dimecres	3	1	2	1	7 dies
dijous	3	7	5	6	21 dies
divendres	8	9	2	1	20 dies
dissabte	2	3	12	10	27 dies
diumenge	3	2	3	3	11 dies

Prioritàriament les visites es fan al matí, que és quan els ocells mostren major activitat. Al migdia solen restar més quiets i canten menys. A la tarda també s'hi acudeix força ja que és el moment que moltes espècies es desplacen cap als punts on s'ajouen.

En alguns casos la sortida s'ha perllongat tot el matí i fins el migdia. En d'altres ocasions que s'hi ha anat de tarda s'ha esperat a què es fes fosc per tal de detectar la presència d'aus nocturnes

	1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt trimestre	TOTAL
matí	12	14	26	15	67 dies
migdia	3	2	0	1	6 dies
tarda	8	9	7	11	35 dies

En la majoria d'ocasions s'ha anat a l'embassament i els seus entorns, sobretot la part de la cua, que és on hi ha una major diversitat d'ambients naturals i on les aus troben millors llocs per refugiar-se. Les muntanyes del preparc també han estat força seguides, en especial durant els passos migratoris. En alguna jornada s'ha fet una sortida mixta, és a dir que s'ha anat a l'embassament i a alguna muntanya del preparc.

	1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt trimestre	TOTAL
pantà	20	15	13	14	62 dies
preparc	3	10	20	13	46 dies

En concret les sortides s'han fet als següents llocs:

--primer trimestre--

- 1-1-2003 Zones de la cua de l'embassament, riu Foix i fondo de l'Alzina
- 5-1-2003 Turó de les Tres Partions, la Sanabra, Maset del Rossell i convent de st. Domingo
- 6-1-2003 Zones de la cua de l'embassament
- 10-1-2003 Zones de la cua i centre de l'embassament i cal Semison
- 12-1-2003 Zones de la cua i centre de l'embassament i cal Semison
- 21-1-2003 Santa Margarida, Albarnar i riera de Llitra
- 22-1-2003 Zones de la cua i centre de l'embassament
- 31-1-2003 Zones de la cua, centre i presa de l'embassament
- 7-2-2003 Zones de la cua i centre de l'embassament i riu Foix
- 13-2-2003 Zones de la cua i centre de l'embassament
- 16-2-2003 Zones de la cua de l'embassament i Timba
- 18-2-2003 Riu Foix, Casa Riera, la Torreta i convent de st. Domingo
- 19-2-2003 Zones de la cua de l'embassament
- 21-2-2003 Zones de la cua de l'embassament

27-2-2003	Zones de la cua de l'embassament i fondo de l'Alzina
4-3-2003	Zones de la cua, centre i presa de l'embassament i fondo de l'Alzina
7-3-2003	Zones de la cua de l'embassament, Timba i fondo de l'Alzina
13-3-2003	Zones de la cua de l'embassament i fondo de l'Alzina
14-3-2003	Zones de la cua de l'embassament i riu Foix
15-3-2003	Zones de la cua de l'embassament
21-3-2003	Zones de la cua de l'embassament, cal Semison i font d'Horta
28-3-2003	Zones de la cua de l'embassament
29-3-2003	Zones de la cua de l'embassament i riu Foix

--segon trimestre--

1-4-2003	Penyafel i l'Albornar
4-4-2003	Zones de la cua de l'embassament, la Creu, cal Bladet i font d'Horta
6-4-2003	Torrent de la Garsosa i fondo de Cova Pineda
12-4-2003	Zones de la cua de l'embassament riu Foix i fondo de l'Alzina
12-4-2003	Roques Boveres
14-4-2003	Zones del centre de l'embassament i fondo de l'Alzina
17-4-2003	Zones de la cua de l'embassament
17-4-2003	Torrelletes, Cal Balaguer i Casa Alta
22-4-2003	Zones de la cua de l'embassament i font d'Horta
24-4-2003	Zones de la cua i centre de l'embassament i cal Semison
2-5-2003	Zones de la cua de l'embassament, Lourdes, Timba i fondo de l'Alzina
8-5-2003	Zones de la cua de l'embassament i font d'Horta
10-5-2003	Convent de st. Domingo, Bellestar, turó de la Sanabra, Maset del Rossell i la Torreta
15-5-2003	Maset del Rossell i pedrera Uniland
16-5-2003	Zones de la cua de l'embassament i font d'Horta
16-5-2003	Roques Boveres i Torrelletes
22-5-2003	Zones de la cua i centre de l'embassament i cal Semison
30-5-2003	Zones de la cua de l'embassament i font d'Horta
30-5-2003	Torrelletes i Corral de Muntanya
4-6-2003	Convent de st. Domingo, Casa Riera i font de Sant Llorenç
5-6-2003	Zones de la cua de l'embassament, Timba i fondo de l'Alzina
8-6-2003	Zones de la presa de l'embassament, Lourdes i font d'Horta
13-6-2003	Zones de la cua de l'embassament i boscos de Clarianacal
20-6-2003	Zones de la presa de l'embassament, fondo de l'Alzina i font d'Horta
27-6-2003	Barranc de sant Llorenç

--tercer trimestre--

1-7-2003	Zones de la cua de l'embassament, Clariana i fondo de l'Alzina
5-7-2003	Zones de la cua de l'embassament i Clariana
6-7-2003	La Timba
8-7-2003	Espitlles, mas Albornar i riera de Llitrà
17-7-2003	Zones de la cua de l'embassament
19-7-2003	Puig de l'Àliga
26-7-2003	Zones de la cua de l'embassament i Lourdes
1-8-2003	Zones de la cua de l'embassament
2-8-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
5-8-2003	Zones de la cua, centre i presa de l'embassament
12-8-2003	Zones de la cua de l'embassament, Timba i Lourdes
12-8-2003	Zona del convent de st Domingo del riu Foix
16-8-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
23-8-2003	Zones de la cua de l'embassament, Timba i cal Semison
28-8-2003	Zones de la cua de l'embassament
30-8-2003	Puig de l'Àliga
4-9-2003	Puig de l'Àliga
6-9-2003	Puig de l'Àliga
8-9-2003	Puig de l'Àliga
9-9-2003	Cal Semison i les Tortes

10-9-2003	Puig de l'Àliga
11-9-2003	Zones de la cua de l'embassament
12-9-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
13-9-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
14-9-2003	Zones de la cua de l'embassament i riu Foix
15-9-2003	Turó de les Tres Partions
16-9-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
18-9-2003	Convent de st. Domingo, fondo st Llorenç, Turó tres Partions, Casa Alta i Bellestar
20-9-2003	Zones de la cua de l'embassament
20-9-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
24-9-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
27-9-2003	Puig de l'Àliga
28-9-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions

--quart trimestre--

1-10-2003	Turó de les Tres Partions
2-10-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
4-10-2003	Puig de l'Àliga i Turó de les Tres Partions
5-10-2003	Turó de les Tres Partions
11-10-2003	Turó de les Tres Partions
11-12-2003	Puig de l'Àliga
14-10-2003	Zones de la cua de l'embassament
18-10-2003	Turó de les Tres Partions
20-10-2003	Turó de les Tres Partions
23-10-2003	Zones de la cua de l'embassament i les Tortes
25-10-2003	Turó de les Tres Partions
30-10-2003	Zones de la cua i presa de l'embassament, Lourdes i Clariana
1-11-2003	Turó de les Tres Partions
4-11-2003	Zones de la cua de l'embassament i riu Foix
8-11-2003	Turó de les Tres Partions
11-11-2003	Mas Albornar
16-11-2003	Zones de la cua de l'embassament i Timba
20-11-2003	Zones de la cua de l'embassament
22-11-2003	Turó de les Tres Partions
29-11-2003	Zones de la cua de l'embassament i riu Foix
5-12-2003	Zones de la cua, centre i presa de l'embassament
8-12-2003	Zones del centre de l'embassament
11-12-2003	Zones de la cua i centre de l'embassament i cal Semison
18-12-2003	Zones de la cua de l'embassament, riu Foix i Masuques
26-12-2003	Mas Albornar
28-12-2003	Zones de la cua de l'embassament
30-12-2003	Zones de la cua, centre i presa de l'embassament

* Nivell de les aigües a l'embassament

L'any 2003 hi ha hagut força aigua al pantà. En general el nivell ha estat al màxim la major part de l'any. Tot el primer trimestre l'embassament estava ple. Al segon també estava ple fins a primers de juny que va començar a baixar de forma insignificant. Al tercer trimestre es van assolir les cotes més baixes, en cap cas es va baixar excessivament. L'estiu va ser molt sec i la baixada podia haver estat molt dolenta, però no va ser així. Cap a finals de juliol i a l'agost va ser quan estava més sec. Ambtot només es va arribar a baixar a l'entorn dels 130 centímetres aproximadament. A primers de setembre ja va ploure i el nivell es va recuperar aviat. A l'octubre es tornava a omplir completament l'embassament. Hi ha hagut molts dies en què les aigües a la presa saltaven pel sobreexidor. Com en anys anteriors hi ha hagut unes quantes riuades causades per la caiguda de pluges

El bon nivell d'aigua a l'embassament ha estat favorable per la reproducció de la majoria d'espècies d'aus aquàtiques (ànec collverd, polla d'aigua, fotja, cabusset...).

El cabal d'aigua del riu Foix també ha estat molt bo al llarg de tot l'any. Ha afavorit la nidificació d'algunes espècies lligades als ambients aquàtics (polla d'aigua, cuereta torrentera...).

* Meteorologia

L'any 2003 ha estat un any força càlid. A l'hivern no ha fet gaire fred, ni a primers d'any ni a finals. Tan sols s'ha arribat a temperatures per sota dels zero graus en comptades ocasions dels mesos de gener i febrer. A finals d'any no s'hi ha arribat cap vegada. Al llarg dels mesos hivernals alguns dies es va arribar a valors màxims a l'entorn dels 20 graus.

A partir de la segona quinzena de juny la calor estival es va disparar, i es van superar els 30 graus habitualment des d'aleshores i fins a finals d'agost. Aquesta calor, acompanyada de la falta de pluges que es va patir al juny, juliol i gairebé tot el mes d'agost, van comportar un estiu molt calorós i eixut, amb un elevat perill d'incendis.

Les pluges recollides al llarg de l'any han arribat als valors que calia esperar d'acord amb les mitjanes més habituals per aquesta zona. El que passa és que han anat molt mal repartides; els mesos de setembre i octubre han suposat quasi la meitat de la pluja caiguda al llarg de l'any.

Al límit del Parc de Foix, a l'observatori de Casa Riera (prop de les Masuques), es va recollir un total de 518,8 l/m² en tot l'any. Als observatoris de les capitals més properes es van recollir els següents totals per al 2003: El Vendrell 747,2 l/m², Vilanova i la Geltrú 587,7 l/m², Vilafranca 621,7 l/m² i 632,6 l/m² (a dos observatoris diferents).

Les dades meteorològiques han estat obtingudes mercès a dos observatoris meteorològics. Al final de la memòria s'adjunta un annex amb les dades que ens han facilitat.

L'observatori de l'empresa TN-PRODUCCIONS, amb dades recollides pel meteoròleg Toni Mestres, està situat a la masia Casa Riera, al costat mateix del riu Foix, prop de les Masuques, però dins del terme municipal de Santa Margarida i els Monjos. Aquest observatori queda ubicat al Parc del Foix. Aquest observatori ens ha facilitat dos gràfics anuals. En un primer gràfic es recull la temperatura ambient les 24 hores del dia (per tant hi podem trobar les màximes i mínimes). A l'altre gràfic hi ha les quantitats de pluja mensuals. Al peu dels gràfics hi ha indicades d'altres informacions (sobre el vent, humitat, pressió atmosfèrica, radiació solar, etc.) que també es podrien demanar si fos del nostre interès.

L'observatori de l'Estació de Viticultura i Enologia de l'Institut Català de la Vinya i el Vi de la Generalitat de Catalunya, està situat a Vilafranca, a uns tres o quatre quilòmetres del Parc del Foix i uns deu quilòmetres de l'embassament. Ens ha facilitat informació diària de temperatura ambient, temperatura màxima, temperatura mínima, oscil·lació de la temperatura, temperatura mitjana, pluviometria, evaporació, vent i hores de sol. També hi ha les mitjanes i els totals de cada mes i de cada deu dies.

* Acció de l'home sobre el medi

Des de la posta en marxa del Parc del Foix s'han produït moltes millores des d'una òptica de conservació i protecció de la natura. També s'ha treballat molt per tal d'informar i conscienciar al públic que visita l'espai natural. Algunes accions destacades del present any 2003 han estat:

- La inauguració del centre de gestió i informació del Parc del Foix situat a la Marina.
- La col·locació de quatre plafons amb les aus del Parc del Foix a l'observatori de la cua de l'embassament.
- La continuació de la campanya per a la protecció de la tortuga de rierol (enfront la tortuga de Florida).

En els nostres quaderns de camp han quedat anotades algunes accions irregulars per a les quals en un futur cal preveure solucions, o millor encara, mirar si es poden prevenir.

1-1-2003 - Quatre persones estan dinant a la vora de l'aigua, prop dels dormidors de corb marí gros, en zona restringida.

5-1-2003 - Sis vehicles tot terreny s'aturen al camí sobre mateix del niu d'àligues, sembla ser que són caçadors que han de fer una batuda.

5-1-2003 - Als entorns del Maset del Rossell hi ha tres o quatre caçadors amb gossos.

10-1-2003 - Un ultralleuger vola molt baix a prop del pantà de Foix.

7-2-2003 - Hi ha alguns arbres caiguts pel vent.

4-4-2003 - Hi ha un gos abandonat prop de la Creu

12-4-2003 - Veiem un cotxe estibat i abandonat prop del cementiri

5-10-2003 - Hi ha un grup de motos quads que van pels camins del Parc del Foix (zona turó Tres Partions, Plana Morta...) tot fent força soroll.

14-10-2003 - Un gos abandonat a la carretera, per la zona de la cua de l'embassament.

23-10-2003 - Un gat volta pels canyissars prop de l'aigua i foragita ocells

1-11-2003 - Hi ha quatre motos quads que van pels camins del Parc del Foix

8-11-2003 - Hi ha tres motos que van pels camins del Parc del Foix

29-11-2003 - A la carretera de Castellet i fins a la de Clariana hi ha jovent que fa curses de motos i també passen alguns cotxes que corren molt.

* Seguiment de les migracions d'aus rapinyaires i celebració del dia internacional de les aus

Aquest ha estat el sisè any que es realitzava aquesta "Campanya de seguiment de migracions d'aus rapinyaires al Penedès, tardor-2003". El mes de setembre es van aplegar alguns aficionats a la natura al puig de l'Àliga i al turó de les Tres Partions, gent que ja havia vingut en edicions anteriors i també gent que hi acudia per primera vegada.

La celebració del dia internacional de les aus, va ser un èxit. Es van alliberar dos xoriguers i un aligot. L'assistència de públic va ser molt nombrosa, des de mainada fins a gent gran (enguany moltes famílies amb els seus fills), també van ser-hi presents alguns agents forestals i periodistes del Diari de Vilanova.

Amb motiu d'aquest conjunt d'activitats es van repartir uns fulletons informatius, que a més permetien reconèixer les siluetes dels principals rapinyaires migrants. Van ser molt ben acollits entre els assistents, a més es van enviar als mitjans de comunicació (premsa i ràdio) de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

Entre el públic assistent hi va haver gent de La Granada, Moja, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Banyeres del Penedès, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona i d'altres poblacions. A més de la gent que ve expressament a les jornades d'observació, a vegades algun grup de ciclistes que passa per allà s'interessa per l'activitat. El balanç de persones que van participar en aquests actes fou el següent:

20-9-2003 observació migracions al matí - 22 persones

4-10-2003 observació migracions al matí - 14 persones

11-10-2003 celebració del dia internacional de les aus – més de 60 persones.

* El cens d'ocells hivernants

Com en els anys anteriors aquest 2003 també es va participar en el "Cens Internacional d'Ocells Aquàtics Hivernants a Catalunya" organitzat per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb "Wetlands international - International Waterbird Census Western Palearctic". Durant el dia 12-1-2003 es van recollir dades quantitatives de totes les espècies d'aus detectades. Els resultats es van trametre a l'organització d'aquest cens. Amb les informacions del pantà de Foix i tota la resta de dades recollides a Catalunya se n'elabora un informe a nivell nacional, que a la seva vegada després forma part d'un altre informe a nivell europeu.

En concret s'hi va anar al matí des de les 8 hores fins a les 13,30 hores. En total es van anotar 49 espècies diferents d'aus, entre les que es consideren aquàtiques i les que no s'hi consideren.

* El programa SOCC

El SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya) és un programa de seguiment de l'avifauna impulsat des de la Institut Català d'Ornitologia – ICO, abans anomenat Grup Català d'Anellament. Aquest programa compta amb el suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del SOCC és conèixer les tendències temporals que es produeixen en l'abundància dels ocells comuns a Catalunya, factor essencial per poder determinar l'estat de conservació de les diferents espècies d'ocells i dels seus hàbitats. Es tracta d'un programa de seguiment continu, que requereix un esforç reduït (quatre matins per any) però mantingut any rera any.

El SOCC es basa en el transecte com a mètode per obtenir índexs d'abundància de les diferents espècies d'ocells. Arreu de Catalunya se segueixen unes pautes comunes per tal que les dades es puguin comparar al llarg dels anys. Els transectes han de mesurar aproximadament uns 3 quilòmetres, i han d'estar dividits en 6 seccions de longituds similars. S'han de realitzar al matí, entre la sortida del sol i les quatre hores següents, cada vegada que es fa l'itinerari s'hi ha d'invertir entre dues hores i dues hores i quaranta minuts. Els 4 censos que es fan cada any han de programar-se de la següent manera: dos censos hivernals; un al gener i un al desembre, i dos censos en època de nidificació; el primer entre el 15 d'abril i el 15 de maig, i el segon entre el 15 de maig i el 15 de juny. A l'hora de fer els censos cal que hi hagi unes determinades condicions meteorològiques favorables, si no s'ha d'esperar a un altre dia.

El 2003 és el segon any que participem en el programa SOCC, amb un transecte que transcorre per l'interior del Parc del Foix. D'entre les categories establertes des de l'ICO es participa en la de "mostreig en ambients

mediterranis". El recorregut té el seu inici a cal Bladet i passa per cal Semison. El recorregut transcorre per diferents ambients naturals entre els quals hi ha la pineda, la brolla i els conreus. L'itinerari es realitza per partida doble, en cada una de les jornades hi participen dos ornitòlegs que van separats uns 50 o 100 metres i que prenen nota de les observacions per separat.

Aquest any 2003 les dates en què s'ha realitzat l'activitat són les següents:

- 1er cens SOOC hivernal – 10-1-2003
- 1er cens SOOC època de nidificació – 24-4-2003
- 2n cens SOOC època de nidificació – 22-5-2003
- 2n cens SOOC hivernal – 11-12-2003

Al final de la memòria, en els annexes, s'hi ha inclòs una còpia de les fitxes de recollida de dades dels diferents mostreigs del SOCC 2003 que s'han enviat a l'ICO.

* El programa PERNIS

Aquest ha estat el primer any que s'ha dut a terme aquest programa al nostre país. Es tracta d'un programa de seguiment de les migracions d'aus rapinyaires a la tardor. Des del Parc del Foix també s'hi ha volgut participar.

El programa pretén crear una xarxa de seguiment de la migració de rapinyaires a Catalunya. Es coordina des de l'ICO. L'objectiu és conèixer les característiques del pas postnupcial, determinar les rutes migratòries i les tendències poblacionals al llarg dels anys.

Es fan un total de 10 censos en sessions de 4 hores; de les 10 del matí a les 14 del migdia. Les sessions són quinzenals i preferiblement cal fer-les en dissabte (o en tot cas entre divendres i dilluns). Hi ha un calendari que l'organització distribueix a tots els participants dels diferents punts de la geografia catalana per tal de coincidir el màxim possible en les dates.

També hi ha un model de fitxa que cal omplir. En els annexes d'aquesta memòria hi ha les fitxes del present 2003 omplertes.

A banda de la participació en el programa PERNIS per part dels components del grup CÒBIT-recerca i estudi de natura al Penedès, també hi han participat diferents aficionats a la natura. Tot i que en un principi el programa l'ha de fer un ornitòleg sol, en la majoria dels casos hi ha hagut més d'una persona. Pensem que val la pena de brindar la possibilitat de fer-ho en sessions obertes, ja que així des del Parc del Foix es fomenta un cert caliu a l'entorn de l'estudi de la natura.

Els ocells del Parc del Foix al 2003

El total d'espècies que nosaltres tenim citades al llarg dels darrers 50 anys al Parc del Foix ha quedat en 217, aquesta xifra ha augmentat de 2 espècies més que el passat any 2002. Destaquem el control per primera vegada al Parc del Foix segons els nostres arxius de les següents aus.

- 1er. trimestre

- 2on. trimestre
Becplaner (*Platalea leucorodia*) 12-4-2003
- 3er. trimestre

- 4rt. trimestre
Merla de pit blanc (*Turdus torquatus*) 1-10-2003

Cal destacar que la citació d'aquestes aus per primera vegada al Parc del Foix correspon a exemplars migrants. En el cas del becplaner va ser un exemplar observat durant el pas primaveral. Fora del Parc de Foix aquesta au havia estat observada en comptades ocasions en zones d'aiguamolls de la costa penedesenca. La merla de pit blanc va ésser observada en diferents jornades de l'època migratòria de tardor. Anteriorment a les comarques penedesenques havia estat anotat com a migrant poc freqüent, especialment a la serralada Prelitoral i també al massís del Garraf.

Al llarg de cada trimestre s'han anat observant aus de diferents espècies, aquest 2003 el total anual ha arribat a 157 ocells diferents anotats. Durant cada un dels trimestres hi ha hagut observacions d'un bon nombre d'espècies, en

general se'n detecten més quan en un trimestre s'agafa un període migratori. Vegem com han quedat els totals d'espècies observades per trimestre.

1er. trimestre	91 espècies diferents
2on. trimestre	111 espècies diferents
3er. trimestre	107 espècies diferents
4rt. trimestre	109 espècies diferents

Tot seguit anem a fer un comentari de cada una de les espècies observades. La redacció del text es fa a partir de les dades obtingudes en les visites que hem dut a terme durant l'any 2003 al Parc del Foix. Amb tot, quan calgui s'utilitzaran dades recollides en anys anteriors per tal d'establir alguna comparació o per parlar de la variació que s'ha copsat en algunes espècies.

En algunes espècies s'hi inclouen petites taules sobre diferents aspectes com ara la fenologia, la nidificació, l'estimació de la tendència poblacional, etc... A l'hora d'omplir les taules s'han tingut en compte fonamentalment les dades recollides al llarg dels darrers deu anys. Així per exemple en analitzar la tendència de les poblacions al Parc del Foix es comparen les informacions actuals amb les dels darrers deu anys. Hi ha taules que únicament fan referència al 2003; per exemple la de les observacions al llarg dels trimestres i la de nidificació.

Hem recopilat unes quantes observacions dels guardes del Parc del Foix, de guardes forestals, o d'altres persones aficionades a la natura, les que hem cregut que podien tenir major interès apareixen en el text seguides entre parèntesi de les inicials de la persona col.laboradora. Les persones de qui hem obtingut informacions són: Pere Xavier Albornà, (PAR), Martí Cardona (MCM), Frederic Casas (FCF), Jordi Cruells (JCR), Carolina Fernandez (CFL), Montse Mercadé (MMS), Daniel Nin (DNE), Ricardo Ramos (RRS), Domingo Serrano (DSC), Manel Serrano (MSS), Roger Tarin (RTA) i Pedro Torres (PTE). Les observacions que no van seguides de cap d'aquestes inicials, cal atribuir-les a l'equip redactor de la memòria.

Cabusset (*Tachybaptus ruficollis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	

Bosc	
Zones humides	x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió	x	
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – Afavorida pel bon nivell de les aigües a l'embassament, aquesta espècie ha tornat a niar (recordem que el 2001 no ho va fer per falta d'aigua al pantà). Ha nidificat en l'època estival: El dia 1-7-2003 observem dues parelles que mostren actituds de zel. El 10-7-2003 (PTE) es troba una parella amb tres pollets. El dia 5-8-2003 veiem adults i joves. Curiosament també hi ha hagut una parella que s'ha reproduït molt tard, en plena tardor: El 16-11-2003 sentim molta estona unes veus insistents, finalment descobrim que una parella de cabussets està peixant a dos polls que no paren de reclamar menjar. Els polls són força menuts, no pot fer gaires dies que han sortit del niu.

Cabussó emplomallat (*Podiceps cristatus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant	x	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		

Observacions d'interès – Aquesta és una au que s'observa de forma molt esporàdica alguns hiverns. Les darreres observacions van ser dels anys 1995, 1996, 1998, 2000 i 2001. Aquest 2003 sols es va observar uns dies al mes de gener. Va ser anotat en les sortides dels dies 10-1-2003 i 12-1-2003. De fet ja s'havia vist uns dies abans; el 8-1-2003 (PTE, PAR) i encara es va anotar fins el 26-1-2003 (PAR).

Cabussó collnegre (*Podiceps nigricollis*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant	x	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Observacions d'interès – Tan sols s'ha anotat en una ocasió a aquesta espècie; el 5-11-2003 (PAR). Per altra banda hem de dir que tot i ser tan escàs, ja fa almenys cinc anys consecutius que el cabussó collnegre visita el Parc del Foix.

Corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant	x	
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Hivernant

última citació prenupcial – 17-4-2003
primera citació postnupcial – 14-7-2003 (PAR)

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	
Augmenta	x

Observacions d'interès – Com en altres hiverns al Parc del Foix s'hi apleguen molts corbs marins. N'hi ha molts que de dia resten al pantà, tot i que n'hi ha algun que es dispersa cap a altres zones humides properes (embocadura del riu Foix, platges de Cubelles, port de Vilanova i la Geltrú, als pèlags de les guixeres de Vilobí, etc.).

Alguns dies que es conten els exemplars del dormider: 173 (1-1-2003), 176 (12-1-2003), 182 (4-3-2003), 154 (14-3-2003), 16 (4-4-2003), 207 (29-11-2003).

Hem de destacar el recompte de 207 exemplars al mes de novembre.

El 31-1-2003 alguns individus ja tenen plomatge estival. D'aleshores ençà se'n van veient.

La fugida cap als territoris de cria es va iniciar a l'entorn del mes de març, de forma graonada van anar minvant, i a l'abril es van observar els darrers exemplars. Els exemplars juvenils són els darrers a marxar. El 29-3-2003 s'observen una seixantena d'exemplars, alguns volen molt alt, com si en el precís moment que els observem comencessin a migrar.

Durant els períodes de pas migratori es poden observar exemplars migrants des de qualsevol lloc del Parc del Foix, fins i tot des del puig de l'Àliga i el turó de les Tres Partions. Els dies 6-9-2003, 2-10-2003, 25-10-2003 i 1-11-2003 s'anoten petits grups de 3, 4, 5 i 9 exemplars respectivament en migració.

El 5-12-2003 un exemplar s'està menjant una anguila acabada de pescar.

Martinet menut (*Ixobrychus minutus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	?
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003			x	
anys anteriors			x	

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	?
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Observacions d'interès – El martinet menut s'ha vist molt poques vegades. Els dies 1-7-2003 i 1-8-2003 es veu un exemplar. També se'n veu un el 3-9-2003 (PTE, DNE). Aquestes observacions sumades a les dels anys anteriors ens confirmen la presència d'aquesta au en ple període reproductor a l'embassament. El seu comportament tan amagadís i discret fa difícil determinar la seva cria.

Martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie que es cita poques vegades, tant al pas prenupcial com al postnupcial. L'any 2003 ha estat vista força vegades. El 22-4-2003 es veu un exemplar amb plomatge juvenil. El 24-4-2003 es veuen dos exemplars; un amb plomatge d'adult i l'altre juvenil. El 2-5-2003 es veuen dos exemplars amb plomatge juvenil. El 8-5-2003 hi ha un exemplar amb plomatge juvenil. El 16-5-2003 es veu un exemplar amb plomatge d'adult. El dia 1-8-2003 veiem un exemplar amb plomatge juvenil. El 12-8-2003 es veuen dos exemplars; un amb plomatge d'adult i l'altre juvenil. El 23-8-2003 es veu un adult. El 28-8-2003 veiem un exemplar amb plomatge juvenil. També tenim notícia que es va veure els dies 1-4-2003 (PTE, MMS), 8-4-2003 (PTE, JCR), 29-4-2003 (PAR), 25-4-2003 (PTE, MMS, JCR, PAR, DSC), 27-4-2003 (PTE), 3 i 4-5-2003 (PTE, JCR, FCF), 13-6-2003 (PTE, RTA, DNE, PAR), 10-7-2003 (PTE), 21-7-2003 (PAR), 17-8-2003 (PTE), 26-8-2003 (PAR) i 5-9-2003 (PTE, JCR, RTA, PAR).

Martinet ros (*Ardeola ralloides*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1996, 1998, 2000 i 2002.

Esplugabous (*Bubulcus ibis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – Des que va desaparèixer dels dormidors de l'embassament cada vegada es fa més difícil de veure a l'esplugabous. Al pantà s'hi ha vist un exemplar el dia 14-10-2003 (PTE, CFL, DNE). També es va observar el 12-9-2003 (PAR). Sovint visita les terres de conreu, algun dia s'ha vist pels entorns de les Masuques, de Sant Marçal i de les Casetes de Puigmoltó, en zones properes al Parc del Foix però fora dels límits.

Martinet blanc (*Egretta garzetta*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – S'ha anat veient en poca quantitat i en menys ocasions que fa uns anys.

Agró blanc (*Egretta alba*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – El dia 9-10-2003 (PAR, PTE) s'observa un exemplar a la cua de l'embassament. Aquesta és una au que no s'observa gaires anys, les darreres observacions eren dels anys 1998 i 1999. Ambtot cal tenir present que és una espècie escassa però en expansió, i per tant en el futur potser es veurà més regularment.

Bernat pescaire (*Ardea cinerea*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		x
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Observacions d'interès – En general podem trobar entre deu i vint bernats pescaires al pantà, tot i que alguna època de l'any se supera la trentena. Sovint es concentren a la cua de l'embassament, però quan cerquen aliment es reparteixen arreu de les aigües estancades, també es dispersen pel riu Foix, la riera de Marmellar i a d'altres torrenteres dels voltants.

Almenys fa set anys que s'observa aquesta espècie a l'embassament durant tot l'any. Tot i això no s'ha pogut constatar la seva nidificació. A l'època de cria els exemplars que resten a l'embassament són immadurs i no es reproduïen. Fa una anys es va dur a terme el projecte "Ardea 2000" que va consistir en la col·locació de 9 plataformes que els haurien de facilitar la cria. Tot i que les han utilitzat repetidament com a punt de repòs, per ara encara no hem pogut constatar la reproducció dels bernats.

Aquest 2003 hem seguit observant actituds de zel i la presència d'exemplars a les plataformes: El 28-8-2003 un exemplar transporta una branca amb el bec, es dirigeix cap a la zona 1 on hi ha plataformes. El 14-9-2003 es conten 32 exemplars, alguns estan aturats a l'arbre de la zona 1. El 14-10-2003 hi ha 8 exemplars aturats als arbres de la zona 1. El 30-10-2003 hi ha 10 exemplars aturats als arbres de la zona 1. El 28-12-2003 hi ha tres exemplars aturats a un dels arbres de la zona 1, un bernat està dret sobre una plataforma.

Agró roig (*Ardea purpurea*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		

Migrant

primera citació prenupcial – 4-4-2003

última citació prenupcial – 26-5-2003 (PTE, JCR)

Observacions d'interès - Ha estat observat sobretot al pas migratori prenupcial els mesos d'abril i maig. Al pas postnupcial només es va veure a l'agost. Els exemplars vistos, en general es sedimenten un temps a l'embassament, ja que hi troben condicions favorables. El 2-5-2003 s'observen dos exemplars que semblen barallar-se, potser per qüestions de zel o de marcar qui és el dominant en un determinat espai de pesca.

Cigonya negra (*Ciconia nigra*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998, 2001 i 2002.

Cigonya blanca (*Ciconia ciconia*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x

- de pas	x
- divagant	

Octubre - desembre	
--------------------	--

Observacions d'interès – El 8-4-2003 (FCF) es veu un exemplar. El 21-8-2003 (RTA) una vintena sobrevolen l'ermita dels Muntanyans. El 28-8-2003 s'observa un exemplar. El 30-8-2003 (CFL, PTE) un estol d'uns 120 exemplars vola per sobre cal Semison.

Becplaner (*Platalea leucorodia*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – El 12-4-2003 observem a un exemplar que vola per remuntar alçada a sobre mateix de Castellet, quan ha assolit certa altitud marxa volant en direcció nord-est.

Ànec blanc (*Tadorna tadorna*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1987.

Ànec carolí (*Aix sponsa*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2002.

Ànec mandarí (*Aix galericulata*)

Observat el 2003

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Els darrers anys s'ha observat de forma relativament habitual aquesta espècie d'au que no és autòcona. A Europa hi ha poblacions d'ànec mandarí que tot i ser d'origen domèstic, han arribat a asilvestrar-se i s'han anat estenent. Aquest any sols s'ha observat una femella, tant nedant com volant.

Ànec xiulador (*Anas penelope*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1997, 1998, 1999, 2001 i 2002.

Ànec gris (*Anas strepera*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – Destaquem l'observació d'onze exemplars el 8-12-2003. També es va anar veient una parella durant el mes de gener i febrer.

Xarxet (*Anas crecca*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Hivernant última citació prenupcial – 28-3-2003
primera citació postnupcial – 16-10-2003 (PTE, DNE)

Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – El 10-1-2003 i el 13-2-2003 tots van aparellats. El 22-4-2003 i el 24-4-2003 es veu una femella amb 10 polls. El 4-6-2003 entre Casa Riera i el convent de Sant Domingo de Penyafort localitzem tres grups diferents de polls crescutets que van acompanyats de les respectives femelles. Ja al capvespre, al riu Foix prop del convent de Sant Domingo de Penyafort observem quinze adults en vol que semblen venir del pantà. El 5-6-2003 de bon matí aproximadament una quinzena d'ànecs marxen de l'embassament en direcció riu amunt. Al pantà hi veiem dues femelles amb els seus respectius grups de polls. El dia 1-7-2003 observem una femella amb 10 polls grandets. El dia 1-8-2003 veiem una femella amb 5 joves. El 5-1-2003 observem sis exemplars als tolls de la pedrera d'Uniland.

Ànec cuallarg (*Anas acuta*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1999 i 2001.

Xarrasclet (*Anas querquedula*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	

- de pas	x
- divagant	

Octubre - desembre	
--------------------	--

Observacions d'interès - El 14-3-2003 hi ha sis mascles i una femella que neden per la cua de l'embassament. Aquesta espècie s'observa de forma esporàdica en època de pas. Les darreres observacions eren dels anys 1999, 2000 i 2001.

Ànec cullerot (*Anas clypeata*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Hivernant última citació prenupcial – 17-3-2003 (PTE, MMS)
 primera citació postnupcial – 14-7-2003 (PAR)

Observacions d'interès – Fins a meitats del mes de març es van observar regularment. Cal destacar l'observació de 9 exemplars el 4-3-2003, que ja s'havien vist uns dies abans, el 28-2-2003 (PTE, MMS). A finals d'any s'ha tornat a veure, però molt menys; una parella el 14-7-2003 (PAR), una femella al setembre (PTE) i un mascle al desembre.

Xibec (*Netta rufina*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998, 1999 i 2002.

Morell cap-roig (*Aythya ferina*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Observacions d'interès – El 24-10-2003 (PTE, CFL, MMS) es van observar set exemplars prop de la Marina.

Morell xocolater (*Aythya nyroca*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1988.

Morell de plomall (*Aythya fuligula*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2002.

Morell d'ulls grocs (*Bucephala clangula*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1983.

Bec de serra mitjà (*Mergus serrator*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1966.

Aligot vesper (*Pernis apivorus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		

- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant

primera citació postnupcial – 3-9-2003 (PTE)

última citació postnupcial – 23-10-2003

Milà negre (*Milvus migrans*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Es va observar els dies 17-4-2003 (PTE, FCF) i 11-5-2003 (PTE, CFL). No hi ha hagut observacions al pas postnupcial.

Milà reial (*Milvus milvus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Aquest ocell migrant ha estat vist el 11-10-2003 des del puig de l'Àliga.

Voltor comú (*Gyps fulvus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Aquesta és la segona observació que tenim d'aquesta au al Parc del Foix, ja que sols s'havia vist el 1996. El 12-9-2003 des del puig de l'Àliga es veu un exemplar cap a les 12,37h. Està remuntant una tèrmica lentament entre el castell d'Olèrdola i el puig de l'Àliga. Després de tenir molta alçada vola cap al sud. Al Turó de les Tres Partions torna a remuntar. Vist fins a les 12,50h., moment en què es perd de vista de tanta altura que agafa.

Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003		x		
	anys anteriors		x		

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Migrant primera citació prenupcial – 4-3-2003
última citació postnupcial – 4-10-2003

Observacions d'interès - El 4-3-2003 una mica abans de la posta de sol, un exemplar es dirigeix al bosc on fa un parell d'anys va marcar territori. El 14-8-2003 (PTE) s'observa un exemplar amb becada que va cap a la Timba. El 4-9-2003 prop del puig de l'Àliga hi ha un exemplar en vol de caça que es va veient durant molta estona, a més també es veuen dos exemplars migrants. El 20-9-2003 prop del puig de l'Àliga hi ha un exemplar en vol de caça, també es veu un migrant.

El 10-2-2003 (PTE, JCR) es va observar un exemplar al fondo de la Torreta. Realment aquesta citació hivernal és força sorprenent ja que no es tenia coneixença que l'àliga marcenca es pogués veure tan aviat.

Arpella vulgar (*Circus aeruginosus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant primera citació prenupcial – 5-4-2003 (PTE)
última citació prenupcial – 17-4-2003
primera citació postnupcial – 29-8-2003 (PTE)
última citació postnupcial – 4-10-2003

Observacions d'interès - El 18-9-2003 veiem un exemplar que està caçant per les muntanyes a l'entorn de la Plana Morta i més tard un exemplar migrant. En els dies de seguiment del pas migratori de tardor es va observar des del puig de l'Àliga i del turó de les Tres Partions.

Arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Hivernant última citació prenupcial – 19-2-2003
primera citació postnupcial – 9-12-2003 (PTE)

Observacions d'interès – A l'hivern s'ha observat de tant en tant per les zones més muntanyoses del Parc del Foix. Durant l'època de pas migratori postnupcial es va veure el dia 5-10-2003. Al pas primaveral no es va citar.

Esparver cendrós (*Circus pygargus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès - Ha estat observat durant el període migratori postnupcial, el dia 8-9-2003.

Astor (*Accipiter gentilis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003		x		
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – El 22-5-2003 un exemplar porta un estornell a les potes, vola en direcció al bosc de l'embassament on sempre marca territori. El dia 1-11-2003 entre el turó de les Tres Partions i el puig de l'Àliga un astor persegueix a un tudó per caçar-lo. No ho aconsegueix, possiblement a causa que ens observa a nosaltres. S'han observat exemplars en vol migratori els dies 28-8-2003 i 20-9-2003.

Esparver vulgar (*Accipiter nisus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003		x		
anys anteriors		x		

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Migrant primera citació postnupcial – 16-8-2003
última citació postnupcial – 8-11-2003

Observacions d'interès – A l'hivern l'espàrver esdevé una au rapinyaire força comuna. També se sol observar regularment en les jornades d'observació de les migracions de tardor que es fan als cims del puig de l'Àliga i del turó de les Tres Partions.

Hi ha alguna parella que podria nidificar als boscos del Parc del Foix, amb tot, la densitat de parelles reproductores seria molt baixa. Aquest any s'ha vist en dates i actituds que ens evidencien la seva probable reproducció. El 30-5-2003 hi ha un exemplar que prova de caçar repetides vegades però que no se'n surt. El 12-8-2003 es veu un exemplar que marca territori enfront d'un falcó mostatxut als entorns de la cua de l'embassament.

El dia 1-1-2003 un exemplar en començar a fosquejar vola cap als dormiders de cuereta blanca i de repicatalons. Aquesta acció d'aprofitar l'hora que s'ajouquen els ocells menuts per anar a caçar ja havia estat observada en d'altres ocasions.

Aligot (*Buteo buteo*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003		x		
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	

Augmenta	
----------	--

Observacions d'interès - Els mesos de gener, febrer i març per una banda, i d'octubre, novembre i desembre per una altra banda, hi ha més aligots establerts a la zona com a hivernants, aleshores se'ls veu tant en àrees boscoses com en terres de conreu. El dia 11-10-2003 amb motiu de la celebració del dia internacional de les aus s'allibera un exemplar d'aquesta espècie al puig de l'Àliga procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. El 12-1-2003 s'observa un exemplar (hivernant) de fase clara.

Àliga daurada (*Aquila chrysaetos*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2000.

Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Observacions d'interès – Enguany al pas de tardor va ser molt més citada que en anys anteriors. Fins i tot es va arribar a observar un grup de quatre migrants el 2-10-2003.

El 10-5-2003 a prop del riu Foix per la zona del convent de Sant Domingo de Penyafort hi ha un xoriguer que s'exclama molt fins que aconsegueix de fer volar a un exemplar d'àliga calçada. També hi ha anat dues garses i dos xoriguers més. El primer xoriguer li feia uns picats per embestir-la. L'àliga duia una presa a les potes. Ha estat força estona intentant esquivar al xoriguer i mica a mica anava guanyant alçada. Al final ha marxat en direcció a llevant. Era una àliga calçada de fase fosca. Aquesta citació correspondria a un exemplar que es va sedimentar al Parc del Foix durant el pas prenupcial. Pocs dies després, el 25-5-2003 (PTE) es va anotar un exemplar a cal Cassanyes.

Àliga cuabarrada (*Hieraetus fasciatus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		x
10 a 100		
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		x
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Observacions d'interès - El 17-4-2003 veiem un exemplar al qual li penja una mica la pota. Evidentment deu ser el mateix que l'any passat ja li portava. De tota manera ja se li veu molt millor.

El 27-5-2003 en una sortida a can Ximet (al veí Parc Comarcal d'Olèrdola) observem la parella que vola directament encarada a les muntanyes on tenen el niu, una de les àligues porta una presa a les potes.

El 30-5-2003 observem amb telescopi un adult que alimenta a dos polls crescutets al niu.

Caldria vetllar per tal de mantenir la tranquil·litat a la zona dels nius de l'àliga cuabarrada. Així doncs, caldria evitar accions com la del dia 5-1-2003 en què sis vehicles tot terreny s'aturen una bona estona al camí sobre mateix del niu d'àligues, per iniciar una batuda del senglar.

Respecte del poll marcat el 2002 amb ràdio-transmissor se sap que va abandonar la zona a finals d'agost. Va anar en pocs dies fins a l'oest de Salamanca, després a Càceres, i finalment sabem que a primers del 2003 estava per la vall del Tajo, entre Toledo i Portugal.

Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – El 12-4-2003 de bon matí observem un exemplar que surt del bosc (on deu haver dormit), pesca un peix i marxa a menjar-lo cap a una torre elèctrica. A mig matí torna a anar a pescar. El 9-9-2003 es veu un exemplar migrant per sobre la font d'Horta, que el fort vent de mestral no deixa avançar. Possiblement és el mateix que de bon matí el dia 11-9-2003 està ajocat al tamariu mort de la cua de l'embassament. Els darrers anys l'àliga pescadora ha esdevingut una au que regularment es deixa veure diverses vegades en èpoques de pas pel Parc del Foix.

Xoriguer petit (*Falco naumanni*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2000.

Xoriguer (*Falco tinnunculus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Migrant

primera citació postnupcial – 8-9-2003

última citació postnupcial – 1-11-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – El 10-5-2003 es veu una parella prop del convent de Sant Domingo de Penyafort que marca territori amb bastanta agressivitat per fer fora a una àliga calçada. El 16-5-2003 un exemplar marca territori a les muntanyes del preparc, als entorns de les roques Boveres.

El dia 11-10-2003 amb motiu de la celebració del dia internacional de les aus s'alliberen dos exemplars d'aquesta espècie al Puig de l'Àliga procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa

Falcó cama-roig (*Falco vespertinus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998.

Esmerla (*Falco columbarius*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – En el pas migratori de tardor es va anotar els dies 20-10-2003 i 23-10-2003 (més un possible el 18-10-2003) des del turó de les Tres Partions en vol cap al sud-oest.

També s'ha vist un exemplar hivernant al fondo de Cova Pineda els dies 3-12-2003 i 9-12-2003 (PTE)

Falcó mostatxut (*Falco subbuteo*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003		x		
anys anteriors		x		

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Migrant

primera citació postnupcial – 6-9-2003

última citació postnupcial – 4-10-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	

Augmenta	
----------	--

Observacions d'interès – Aquest any ens ha semblat que hi podia haver dues parelles reproduïnt-se a diferents llocs del Parc del Foix; una a l'entorn de cal Semison i l'altra a l'entorn del convent de sant Domingo. El 22-5-2003 una parella resta aturada al capdamunt d'una torre elèctrica d'alta tensió durant moltíssima estona. El 8-7-2003 veiem dos exemplars, un dels quals acaba de caçar un ocell petit (oreneta o falciot), hi ha tot de garses que estan alarmades i que ens descobreixen la seva presència. El 12-8-2003 es veu un exemplar que marca territori enfront d'un esparver als entorns de la cua de l'embassament. El 14-9-2003 observem dos exemplars prop de l'embassament, semblen un adult i un jove, ja que un dóna menjar a l'altre.

Falcó de la Reina (*Falco eleonora*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2001 i 2002.

Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Observacions d'interès - És una au poc habitual al Parc del Foix. El 10-5-2003 s'observa un exemplar per la zona de la pedrera i maset del Rossell, marxa volant en direcció al puig de l'Àliga. Realment és força sorprenent la citació, ja que la data cau plenament en el període reproductor. Possiblement es tracta d'un exemplar que nia prop del Parc del Foix i que s'hi desplaça esporàdicament per caçar.

Perdiu (*Alectoris rufa*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - El 18-9-2003 s'observa un grup molt nombrós, d'una vintena d'exemplars.

Guatlla (*Coturnix coturnix*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1977.

Faisà (*Phasianus colchicus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1997 i 2000.

Rascló (*Rallus aquaticus*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003				
- sedentari	?	Gener - març				x
- estival		Abril - juny				
- hivernant	x	Juliol - setembre				x
- de pas	x	Octubre - desembre				x
- divagant						

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003				x
anys anteriors			?	

Hivernant última citació prenupcial – 13-3-2003
 primera citació postnupcial – 11-9-2003

Observacions d'interès – El rascló ha estat força habitual a les zones de canyissos, canyes i bogues de la cua de l'embassament. També s'ha detectat a la part central del pantà i al riu Foix. La regularitat de les seves observacions ha estat afavorida pel bon nivell que presentaven les aigües del pantà.

Polla pintada (*Porzana porzana*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003	
- sedentari		Gener - març	x
- estival		Abril - juny	
- hivernant		Juliol - setembre	
- de pas	x	Octubre - desembre	
- divagant			

Observacions d'interès – És una au migratòria molt discreta. El seu pas és molt primerenc. Feia alguns anys que no s'observava (les darreres observacions foren dels anys 1998 i 2000). Aquest any es va veure els dies 4-3-2003 i 7-3-2003.

Rascletó (*Porzana parva*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998.

Rasclet (*Porzana pusilla*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1978 i 1998.

Guatlla maresa (*Crex crex*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1967.

Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003	
- sedentari	x	Gener - març	x
- estival		Abril - juny	x

- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – El 13-3-2003 observem una parada nupcial. El 29-3-2003 s'anoten exemplars amb actituds de zel. El 5-7-2003 veiem alguns exemplars joves. El 8-7-2003 trobem un adult i un poll a la riera de Llitrà. El dia 5-8-2003 veiem un adult amb tres polls. El 12-8-2003 es veuen exemplars joves i polls nascuts de fa poc.

Fotja (*Fulica atra*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Aquest any s'han pogut reproduir un bon nombre de parelles d'aquesta espècie mercès al bon nivell de les aigües del pantà. El 13-3-2003 veiem que estan construint niu. El 4-4-2003 es localitza un niu. El 16-5-2003 una femella passeja amb tres polls. El mateix dia a un altre lloc un adult construeix niu. El 30-

5-2003 s'observen alguns polls prop dels adults. El 5-6-2003 observem tres adults diferents amb els seus respectius grups de polls. El 13-6-2003 un adult alimenta a un poll. El dia 1-7-2003 observem adults i joves. El 5-7-2003 veiem una femella amb dos polls i alguns exemplars joves. A banda de la població de fotges que s'ha reproduït a l'embassament, a la tardor i hivern augmenta la quantitat d'exemplars, ja que s'hi afegeixen hivernants.

Grua (*grus grus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998 i 1999.

Sisó (*Tetrax tetrax*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1972.

Cames llargues (*Himantopus himantopus*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003				
- sedentari		Gener - març				x
- estival		Abril - juny				x
- hivernant		Juliol - setembre				x
- de pas	x	Octubre - desembre				
- divagant						

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003					x
anys anteriors	x				

Migrant

primera citació prenupcial – 21-3-2003
última citació prenupcial – 8-4-2003 (PTE)
primera citació postnupcial – 7-6-2003 (PTE)
última citació postnupcial – 17-7-2003

Torlit (*Burhinus oedicnemus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Corriol petit (*Charadrius dubius*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003				
- sedentari		Gener - març				x
- estival	x	Abril - juny				x
- hivernant		Juliol - setembre				x
- de pas	x	Octubre - desembre				
- divagant						

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors	x				

Estimació de parelles nidificants		Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
1 a 10	x	Zones urbanes o nuclis habitats	
10 a 100		Conreus, ermots i marges	
Més de 100		Penya-segats i roquissars	
		Màquies i garrigues	
		Bosc	
		Zones humides	x

Estival

primera citació prenupcial – 15-3-2003 (PTE)

última citació postnupcial – 28-8-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – En anys com aquest, que hi ha un nivell d'aigua alt es fa difícil que s'hi quedin a niar, ja que no hi ha platgetes de còdols. De tota manera ens ha semblat que hi havia una parella a l'entorn de la cua de l'embassament. També n'hi ha hagut que han ocupat les planes semi-inundades d'una zona de la pedrera d'Uniland (el 10-5-2003 s'observa una parella i el 15-5-2003 un exemplar marca territori). I encara se n'han vist a l'entorn de les Masuques (fora del Parc del Foix, però molt a prop) en una extensió on hi ha moviments de terres.

Corriol gros (*Charadrius hiaticula*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2001.

Fredulega (*Vanellus vanellus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – Aquesta au hivernant sols s'ha observat un parell de vegades. El 1-2-2003 (PTE) un exemplar prop de mas Pujó. El 26-12-2003 es va veure un grup d'una seixantena de fredulegues que es desplaçaven en vol per terres de conreu.

Territ menut (*Calidris minuta*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998, 1999, 2000 i 2001.

Territ de Temminck (*Calidris Temminckii*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998.

Territ beclarg (*Calidris ferruginea*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2001.

Territ variant (*Calidris alpina*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1999 i 2001.

Becadell sord (*Lymnocyptes minimus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998.

Becadell comú (*Gallinago gallinago*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	

- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Hi ha hagut diverses observacions aquest any 2003, totes durant el primer trimestre, entre els dies 18-2-2003 i 14-3-2003. Ha estat vist tant a la cua de l'embassament com a diferents llocs del riu Foix.

Becada (*Scolopax rusticola*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Observacions d'interès – Tan sols es va observar un parell de vegades en tot l'any. Un exemplar el 18-2-2003 al capvespre, a prop del riu Foix als entorns de Casa Riera. I un altre el 19-11-2003 (PTE) al camí del pujol Romagosa a la Plana Morta.

Tètol cuanegre (*Limosa limosa*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1973 i 1985.

Tètol cuabarrat (*Limosa lapponica*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Gamba roja pintada (*Tringa erythropus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		

Observacions d'interès – Aquesta au de pas és força excepcional. La darrera observació havia estat de l'any 1998. Aquest 2003 es va poder observar un exemplar el dia 9-4-2003 (PAR, DSC), sens dubte un migrant sedimentat.

Gamba roja vulgar (*Tringa totanus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		

Observacions d'interès – Aquesta és una au de pas que no s'observa cada any (les darreres es van veure el 1999 i el 2001). Enguany es va anotar els dies 29-4-2003, 21-7-2003 i 1-8-2003 (PAR)

Gamba verda (*Tringa nebularia*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998, 1999 i 2001.

Xivita (*Tringa ochropus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – En el pas prenupcial es va obtenir un registre el 22-4-2003. També va ser anotada entre els dies 1-4-2003 i 5-5-2003 (PTE) i el 29-4-2003 (PAR). En el pas postnupcial es va veure entre el 5-7-2003 i el 5-8-2003. Enguany no s'han observat exemplars hivernants.

Valona (*Tringa glareola*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Aquest és un ocell que es pot observar durant els períodes migratoris. Es van observar dos exemplars el dia 22-4-2003, durant el pas prenupcial. També un exemplar el 14-7-2003 (PAR), durant el pas postnupcial.

Xivitona (*Actitis hypoleucos*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant
primera citació prenupcial – 10-3-2003 (PAR)
última citació prenupcial – 10-5-2003 (PTE, CFL)
primera citació postnupcial – 20-7-2003 (PTE)
última citació postnupcial – 23-10-2003

Observacions d'interès – Durant els dies de pas primaveral se'n van veure unes quantes. En el pas postnupcial van ser una mica més habituals. Amb tot enguany ha estat un any fluix pel que fa a citacions d'aquesta espècie.

Gavina menuda (*Larus minutus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1999.

Gavina vulgar (*Larus ridibundus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – La gavina vulgar s'observa de forma molt irregular. Les darreres observacions havien estat dels anys 1997, 1999 i 2001. Aquest any 2003 es va anotar en una ocasió, el 10-10-2003 (PTE, CFL).

Gavià fosc (*Larus fuscus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2001.

Gavià argentat (*Larus cachinnans*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1999, 2000 i 2001.

Xatrac gros (*Sterna caspia*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2002.

Fumarell carablanc (*Chlidonias hybridus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2000, 2001 i 2002.

Fumarell negre (*Chlidonias niger*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – El fumarell negre s'observa de forma molt irregular. Les darreres observacions havien estat dels anys 1980 i 2001. Aquest any 2003 es va anotar en dues ocasions, el 19-7-2003 (PTE, MMS) i el 5-9-2003 (PTE).

Colom roquer (*Columba livia*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Xixella (*Columba oenas*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		x
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		x
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		x
Estable		
Augmenta		

Observacions d'interès – Cada vegada es fa més difícil d'observar aquesta au. Hi segueix havent alguna parella que nia al Parc del Foix, però ha anat minvant. El 12-4-2003 un exemplar surt del niu.

Tudó (*Columba palumbus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		x
- hivernant		x
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		x
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Bosc		x
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie sedentària i nidificant, força estesa arreu del Parc del Foix. El 13-3-2003 anotem vols de zel. El 4-4-2003 un exemplar s'alça d'un niu on estava covant. Hi ha bastants dies que s'anoten comportaments de zel, per exemple els dies 12-4-2003, 15-5-2003, 4-6-2003 i 5-6-2003. Quan s'han acabat de reproduir se solen agrupar en estols.

A la tardor des dels cims més alts del Parc del Foix alguna vegada s'anoten en pas migatori, viatgen en grups que poden ser bastant nombrosos. El 26-10-2003 es van observar 130 exemplars migrants.

En els dies de caça es veuen grupets de tudons als boscos dels entorns del pantà. Si no se'ls molesta aquí escapen dels caçadors.

El dia 1-11-2003 entre el turó de les Tres Partions i el puig de l'Àliga un astor persegueix a un tudó per caçar-lo. No ho aconsegueix, possiblement a causa que ens observa a nosaltres.

Tórtora turca (*Streptopelia decaocto*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		x
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitats		x
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Boscos		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		
Augmenta		x

Observacions d'interès - A la zona de Santa Margarida i els Monjos, molt a prop del riu Foix, des de fa uns quants anys hi tenen una bona població. També hem localitzat una parella que s'ha establert en uns pins a la vora de Castellet, és el primer any que ha niat en aquest nucli urbà. El 4-6-2003 una parella manifesta actituds de zel per la zona de Sant Domingo de Penyafort.

Tórtora (*Streptopelia turtur*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		x
- hivernant		
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 12-4-2003
última citació postnupcial – 19-9-2003 (PTE, JCR)

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2001.

Lloro de la Patagònia (*Cyanoliseus patagonus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2001.

Cotorra de pit gris (*Myiopsitta monachus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998 i 2000.

Cucut reial (*Clamator glandarius*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003			x	
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Observacions d'interès – Ja fa uns quants anys que el cucut reial està desapareixent de les nostres contrades. Sembla que estigui greument amenaçat d'extinció. El cucut reial va ser observat el dia 15-5-2003 a prop del maset del Rossell.

Cucut (*Cuculus canorus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003		x		
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	x
Zones humides	x

Estival

primera citació prenupcial – 31-3-2003 (PAR)

última citació postnupcial – 8-7-2003

Òliba (*Tyto alba*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998, 1999 i 2000.

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003				x
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Xot (*Otus scops*)

Observat el 2003

Fenologia

Observacions al llarg dels trimestres 2003
--

- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003			x	
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Observacions d'interès – El xot tan sols es va anotar el 2-5-2003. Aquesta au nocturna sembla que hagi minvat força. Els seus hàbits nocturns fan que passi més desapercebuda encara.

Duc (*Bubo bubo*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - El Parc del Foix presenta uns ambients naturals força adients per aquesta espècie. Ja fa anys que es coneix l'emplaçament d'una parella (de la qual s'han trobat diferents nius vells), però sembla ser que

n'hi podria haver alguna més. El 4-3-2003 canta per la banda del corral de Muntanya. El 12-8-2003 trobem una ploma de duc prop del riu Foix als entorns del convent de Sant Domingo de Penyafort.

Mussol (*Athene noctua*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Gamarús (*Strix aluco*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari	x	
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003				
Gener - març	x			
Abril - juny				
Juliol - setembre				
Octubre - desembre				

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003	x				
anys anteriors	x				

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10	x	
10 a 100		
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars	x	
Màquies i garrigues		
Bosc	x	
Zones humides		

Observacions d'interès - Se segueix localitzant en el mateix territori on en anys passats s'hi va trobar una parella.

Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival	x	
- hivernant		
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003			
Gener - març			
Abril - juny		x	
Juliol - setembre		x	
Octubre - desembre		x	

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003	x				
anys anteriors	x				

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 16-5-2003
última citació postnupcial – 1-10-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Observacions d'interès – Tot i ser una au que passa molt desapercebuda, l'enganyapastors és força abundant a la major part de zones forestals del Parc del Foix. Cal destacar l'observació del dia 1-10-2003, ja que té força interès com a darrera observació de l'espècie.

Siboc (*Caprimulgus ruficollis*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival	x	
- hivernant		
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003				x	
anys anteriors	x				

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10	x	
10 a 100		
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges	x	
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
--	--	--

Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Ballester (*Apus melba*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003			x	
anys anteriors			x	

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estival

primera citació prenupcial – 29-3-2003

última citació postnupcial – 30-10-2003

Observacions d'interès – El ballester per ara no s'ha confirmat com a espècie nidificant al Parc del Foix. Les observacions que es fan en ple període reproductor se suposa que són d'exemplars establerts en colònies de cria properes, com ara a Vilafranca del Penedès. És una espècie que fa desplaçaments llargs durant el dia, i per això es pot veure regularment a molts punts tant del pantà com de les muntanyes properes.

El 2-5-2003 es veuen diversos exemplars que volen aparellats.

Aquest any es va fer una sortida a les roques Boveres (on hi havia certes possibilitats que hi niés) en plena època de cria. S'hi va anar abans de l'hora de la posta de sol i fins una bona estona després (moment en què solen entrar als nius). No es va poder obtenir cap resultat positiu que evidenciés la reproducció del ballester a aquestes penyes.

Des dels cims més alts del Parc del Foix a finals d'estiu s'observen en estols que cacen els insectes que volen alt. Uns dies més tard s'hi observen migrant.

Recollim una interessant informació d'un exemplar vist en ple hivern, 26-1-2003 (RRS). A algunes zones d'aiguamolls costers ja s'havien obtingut registres hivernals de ballester, amb tot és una cosa excepcional.

Falciot negre (*Apus apus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 12-4-2003
última citació postnupcial – 20-9-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - El 16-5-2003 al capvespre una quinzena d'exemplars entren als nius que tenen situats a les parets de les roques Boveres. El 4-6-2003 algun exemplar entra al niu, al convent de Sant Domingo de Penyaafort.

Recollim una interessant informació d'un exemplar vist en ple hivern, el dia 11-1-2003 (PTE, FCF).

Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Aquest any es va citar tres vegades; el 2-8-2003, el 30-8-2003 i el 6-9-2003, sempre a les muntanyes del prepark, en algunes ocasions s'hi van veure força estona, realitzaven vols de caça.

Blauet (*Alcedo atthis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Hivernant última citació prenupcial – 17-3-2003 (PTE, MMS)
primera citació postnupcial – 20-6-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – A l'hivern (11-9-2003 i altres dies) a vegades es veuen disputes entre diferents exemplars, són disputes per marcar els seus territoris de pesca.

Abellerol (*Merops apiaster*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estival
primera citació prenupcial – 9-4-2003 (PAR, DSC)
última citació postnupcial – 18-9-2003 (PAR)

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Observacions d'interès – Hi segueix havent un nombre no molt nombrós de parelles reproductores. El dia 1-7-2003 observem un adult que porta becada.
A la primavera i a la tardor s'observen estols migrants.

Gaig blau (Coracias garrulus)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2000 i 2002.

Puput (Upupa epops)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	x
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – El 15-5-2003 es veuen quatre exemplars joves sortits fa poc del niu. El 16-8-2003 des del puig de l'Àliga veiem un exemplar que sembla migrar.

Colltort (*Jynx torquilla*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002.

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003	
- sedentari		Gener - març	
- estival	x	Abril - juny	
- hivernant		Juliol - setembre	
- de pas	x	Octubre - desembre	
- divagant			

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003				x
anys anteriors		x		

Estimació de parelles nidificants		Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
1 a 10	x	Zones urbanes o nuclis habitatats	
10 a 100		Conreus, ermots i marges	
Més de 100		Penya-segats i roquissars	
		Màquies i garrigues	
		Bosc	x
		Zones humides	

Picot verd (*Picus viridis*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003	
- sedentari	x	Gener - març	x
- estival		Abril - juny	x
- hivernant		Juliol - setembre	x
- de pas		Octubre - desembre	x
- divagant			

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
1 a 10		Zones urbanes o nuclis habitatats	
10 a 100	x	Conreus, ermots i marges	x
Més de 100		Penya-segats i roquissars	
		Màquies i garrigues	
		Bosc	x
		Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	

Augmenta	
----------	--

Terrerola vulgar (*Calandella brachydactyla*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2002.

Cogullada vulgar (*Galerida cristata*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		x
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges		x
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		x
Estable		
Augmenta		

Observacions d'interès – S'ha continuat observant molt poques vegades i de forma molt localitzada per les terres de cultiu.

Cogullada fosca (*Galerida theklae*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		x
10 a 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		

Més de 100	
------------	--

Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix

Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Aquest any s'ha observat en moltes més ocasions aquesta espècie, fins a un màxim de 4 exemplars. Aquest màxim de 4 exemplars es va observar diverses vegades, una de les quals per la data possiblement fos un grup familiar, mentre que en altres ocasions podrien ser dues parelles diferents.

Cotoliu (*Lullula arborea*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix

Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - A les muntanyes del preparc s'hi reproduïxen unes quantes parelles, molt poques. El 10-5-2003 es van localitzar almenys tres punts ocupats per aquesta espècie.

La cotoliu és present durant tot l'any al Parc del Foix. Fora de l'època de nidificació és més fàcil de trobar-ne de sedimentades en terres de cultiu.

A la tardor se'n van observar algunes de migrants des dels cims del puig de l'Àliga i el turó de les Tres Partions.

Alosa (*Alauda arvensis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Hivernant

última citació prenupcial – 18-2-2003

primera citació postnupcial – 11-10-2003

Observacions d'interès - Aquest any 2003 no s'ha citat massa vegades, sembla que han baixat pocs hivernants.

Oreneta de ribera (*Riparia riparia*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès - Tan sols s'observen exemplars en migració que es poden sedimentar un temps a l'embassament. Aquest any 2003 no s'ha citat massa vegades. En alguna ocasió s'han vist migrants des de la zona del puig de l'Àliga.

Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	x
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003				x
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Observacions d'interès - A l'hivern a vegades se'n concentren una bona colla a l'entorn del riu Foix per la zona dels Monjos (21-1-2003, 26-12-2003, 30-12-2003). Enguany tampoc s'ha detectat com a espècie reproductora.

Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	x
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 4-3-2003
última citació postnupcial – 30-10-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Observacions d'interès – Hi ha bastantes parelles que nien repartides arreu del Parc del Foix; en alguns nuclis urbans o en masies aïllades. El 2-5-2003 a Lourdes hi ha diversos nius ocupats. El 4-6-2003 observem polls volanders. El 13-6-2003 i el dia 1-7-2003 entre d'altres dates s'observen joves. El 8-7-2003 trobem nius ocupats a Espitlles.

Passada l'època de cria a la cua de l'embassament se n'hi concentra un bon nombre, allà hi abunden els insectes dels quals s'alimenten. Més tard, en iniciar-se les migracions s'hi segueixen aplegant, aleshores també són molt habituals en vol migratori a qualsevol lloc del Parc del Foix.

Oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003		x		
	anys anteriors	x			

Observacions d'interès – L'any 2001 es va constatar per primera vegada la reproducció de l'oreneta cua-rogenca al Parc del Foix, ja que es va veure un grup de polls volanders als quals se'ls donava becada. Aquest any 2003 s'ha repetit la nidificació. El 27-6-2003 per la zona de la font de Sant Llorenç es va trobar una parella que marcava territori i que mostrava actituds de zel. Per altra banda el 6-4-2003 es va trobar un niu vell prop de Lourdes. Tot i que el solen reutilitzar diversos anys, aquest 2003 no s'hi va veure moviment a l'entorn del niu.

Oreneta cuablanca (*Delichon urbica*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x

- de pas	x
- divagant	

Octubre - desembre	x
--------------------	---

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 14-3-2003
última citació postnupcial – 25-10-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Observacions d'interès – A la tardor hi ha dies que s'observa en molta quantitat com a migrant, per exemple el dia 1-10-2003 se'n van veure unes 2000, solen formar estols bastant compactes.

Trobat (*Anthus campestris*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003			x	
anys anteriors		x		

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 10-5-2003
última citació postnupcial – 24-9-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Piula dels arbres (*Anthus trivialis*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Migrant

primera citació postnupcial – 23-8-2003

última citació postnupcial – 18-10-2003

Titella (*Anthus pratensis*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant	x	
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Hivernant

última citació prenupcial – 4-4-2003

primera citació postnupcial – 11-10-2003

Observacions d'interès – Al mes d'octubre (11-10-2003, 18-10-2003, 20-10-2003, etc.) es van detectar exemplars migrants des de les muntanyes més altes del Parc del Foix.

Grasset de muntanya (*Anthus spinoletta*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998 (possibles).

Grasset de costa (*Anthus petrosus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998.

Cuereta groga (*Motacilla flava*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Observacions d'interès - Va ser observada alguns dies durant el pas migratori postnupcial (13-9-2003 al 25-10-2003).

Cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant	x	
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
	1 a 10	x
	10 a 100	
	Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Hivernant última citació prenupcial – 4-3-2003
primera citació postnupcial – 20-9-2003

Observacions d'interès – Aquest any la cuereta torrentera s'ha reproduït al Parc del Foix. No es té constància que ho faci cada any, sobretot ho pot fer els anys que baixa força aigua pels rius i torrents. El 26-4-2003 (PTE) es veu un exemplar amb becada a la riera de la Bruixa. El 8-7-2003 trobem un grup d'exemplars joves al riu Foix, als entorns del cementiri dels Monjos.

Al setembre i octubre es va anotar el pas d'alguns exemplars migrants des dels cims del puig de l'Àliga i del Turó de les Tres Partions (28-9-2003, 2-10-2003).

Cuereta blanca (*Motacilla alba*)

Observat el 2003

Fenologia		
	- sedentari	x
	- estival	
	- hivernant	x
	- de pas	x
	- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
	Gener - març	x
	Abril - juny	x
	Juliol - setembre	x
	Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
	1 a 10	
	10 a 100	x
	Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	x
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
	Disminueix, espècie en regressió	
	Estable	x
	Augmenta	

Observacions d'interès – Com en anys anteriors hi ha unes quantes parelles que s'han reproduït a diferents zones del Parc del Foix. El 29-3-2003 anodem un exemplar que marca territori. El 12-4-2003 un exemplar manifesta actituds de zel; fa una parada nupcial. El 22-4-2003 una parella ronda prop del niu. El 2-5-2003 es troba un niu. El 16-5-2003 una parella mostra actituds de zel. Els dies 4-6-2003, 5-6-2003 i 13-6-2003 observem grups de joves volanders a diferents llocs.

A l'octubre (23-10-2003 i 25-10-2003) es van citar exemplars en pas migratori des dels cims més alts del Parc del Foix.

Els mesos més freds de l'any es nota un increment del nombre de cueretes blanques. A les hores de sol es distribueixen per les zones agrícoles, pel pantà i pels entorns del riu. A mitja tarda s'agrupen a les joques. El dia 1-1-2003 en contem aproximadament unes 350 als dormiders propers a la paret de la cua. El 4-3-2003 es contem aproximadament 40 exemplars als dormiders. El 14-3-2003 es contem aproximadament 10 exemplars als dormiders. El 4-11-2003 es contem aproximadament 80 exemplars als dormiders.

Cargolet (*Troglodytes troglodytes*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	x

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie molt habitual i força ben repartida arreu del Parc del Foix. Li agrada establir-se a les raconades més frondoses i embardissades. El 21-1-2003 localitzem tres nius vells per la zona del mas Albarnar. El 22-4-2003 un exemplar surt d'un niu on covava, hi té ous. El 16-5-2003 es localitza un niu amb polls.

Pardal de bardissa (*Prunella modularis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Hivernant última citació prenupcial – 28-3-2003
 primera citació postnupcial – 11-10-2003

Pit-roig (*Erithacus rubecula*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x

- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	
Augmenta	x

Observacions d'interès – Aquesta espècie lentament va augmentant la seva població reproductora i la seva distribució. Cada vegada trobem el pit-roig nidificant a més llocs del Parc del Foix, tot i que per ara no es pugui considerar massa abundant. El 22-4-2003 trobem un niu amb tres ous, d'on ha fugit uns moments l'adult que covava. El 28-8-2003 veiem un exemplar amb plomatge juvenil.

Rossinyol (*Luscinia megarhynchos*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	x
Zones humides	x

Estival
primera citació prenupcial – 12-4-2003
última citació postnupcial – 28-9-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – D'aquest any cal destacar la darrera citació postnupcial, ja que és una data força extrema i per tant de molt d'interès.

Cotxa blava (*Luscinia svecica*)

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	?
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie que no s'observa cada any (els darrers anys que s'havia observat eren el 1998, 1999 i 2000). Té uns costums força discrets i a més s'estableix en ambients naturals de difícil accés, com és a l'interior de les masses de canyars i canyissars. Ha estat observat els dies 11-9-2003 i 14-10-2003.

Cotxa fumada (*Phoenicurus ochruros*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003				x
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Hivernant última citació prenupcial – 14-3-2003
 primera citació postnupcial – 11-10-2003

Observacions d'interès – És una espècie que en època de cria passa molt desapercibuda, a més de ser molt escassa. Els anys 2000 i 2001 es va comprovar la seva nidificació als límits del Parc del Foix i possibilitats a un altre lloc. Aquest any 2003 no s'ha detectat.

El 13-3-2003 a una balma hi trobem plomes d'un exemplar depredat per un carnívor.

Els dies 11-10-2003, 20-10-2003 i altres s'observen exemplars i grups de migrants en pas o bé sedimentats.

Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant

primera citació prenupcial – 13-4-2003 (PTE)
última citació prenupcial – 25-4-2003 (PTE)
primera citació postnupcial – 23-8-2003 (PTE)
última citació postnupcial – 11-10-2003

Bitxac rogenic (*Saxicola rubetra*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – El bitxac rogenic és una au migrant. Enguany sols es va observar un mascle el 24-4-2003.

Bitxac comú (*Saxicola torquata*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – L'any passat ja es va observar en quantitats menors a les dels darrers anys a causa dels forts freds del desembre del 2001. Aquest 2003 encara no ha recuperat les seves poblacions i segueix havent-hi poques parelles.

El 4-6-2003 observem un grup de joves volanders. El 6-9-2003 als entorns del puig de l'Àliga hi ha un grup familiar amb adults i joves

Còbit gris (*Oenanthe oenanthe*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x

- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant

primera citació prenupcial – 26-4-2003 (PTE)

última citació prenupcial – 11-5-2003 (PTE)

primera citació postnupcial – 10-9-2003

última citació postnupcial – 4-10-2003

Còbit (*Oenanthe hispanica*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003		x		
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	
Augmenta	

Observacions d'interès – Enguany aquest 2003 s'ha observat molt poc, fins i tot sembla haver desaparegut de determinades zones on hi solia haver alguna parella reproductora.

Còbit roquer (*Oenanthe leucura*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2002.

Merla roquera (*Monticola saxatilis*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2001.

Merla blava (*Monticola solitarius*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – A l'espai natural del Parc del Foix hi ha diverses parelles escampades sobretot per diferents racons rocallosos de les muntanyes o en edificis abandonats o ruïnosa. El 16-5-2003 un adult porta becada i canta repetidament, a més marca territori per la zona de les roques Boveres. El 5-6-2003 trobem un grup de joves que fa molt pocs dies deuen haver sortit del niu. El 6-7-2003 s'observa un jove.

Merla de pit blanc (*Turdus torquatus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie migrant. Aquest 2003 ha estat vista per primera vegada (segons els nostres arxius) al Parc del Foix. S'ha observat els dies 1-10-2003, 11-10-2003 i 25-10-2003 a l'entorn del turó de les Tres Partions. Sempre s'hi han vist exemplars migrants sedimentats.

Merla (*Turdus merula*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	x

Zones humides	x
---------------	---

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix

Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – La merla és una espècie molt habitual arreu, se sol anotar en la majoria de sortides. Hi ha parelles nidificants establertes a la major part del Parc del Foix. El 8-6-2003 trobem un niu amb polls. El 13-6-2003 veiem un poll volander fora del niu. El 20-6-2003 observem joves.

Aquest ha estat el primer any que hem anotat el pas d'alguns exemplars migrants des dels cims més alts del Parc del Foix. El dia 25-10-2003 passen fins a una vintena de migrants.

Griva cerdana (*Turdus pilaris*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 2000, 2001 i 2002.

Tord (*Turdus philomelos*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix

Disminueix, espècie en regressió	
Estable	
Augmenta	x

Observacions d'interès – Aquesta espècie a l'hivern és força habitual arreu del Parc del Foix. A alguns racons més frondosos hi sol ser abundant. Un cop s'inicia el període reproductor la majoria d'exemplars migren cap al nord. Sols resten unes quantes parelles nidificants al Parc del Foix. Durant el festeig se les localitza fàcilment a primera hora del matí pel seu cant. Al bosquet que hi ha al punt on el torrent de Font d'Horta desguassa a l'embassament enguany hi havia tres parelles establertes, el mascle d'una de les quals en cantar de matinada imitava la veu de l'abellarol, cosa que no feien els mascles de les altres dues parelles. El 30-5-2003 s'observen alguns polls sortits recentment del niu.

Tord ala-roig (*Turdus iliacus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		

- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Hivernant primera citació postnupcial – 8-11-2003

Observacions d'interès – Els primers mesos de l'any no es va observar gens. En canvi a partir del novembre ha estat força habitual a diversos llocs, sobretot als entorns de l'embassament i dels boscos de ribera del riu Foix.

Griva (*Turdus viscivorus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Boscos	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – A l'hivern, ja comencen a cantar (10-1-2003). Tot i que no ha començat el període reproductor alguns mascles assagen els primers cants previs a l'època de zel. Hi ha unes quantes parelles sedentàries que es reproduïxen a aquest espai natural. El 4-6-2003 observem un poll volander.

A la tardor hi ha una entrada d'exemplars migrants, alguns dels quals després es quedaran a hivernar al Parc del Foix. El dia 11-10-2003 s'anoten migrants des del turó de les Tres Partions.

La griva pot viure repartida per diferents ambients naturals dels que trobem al Parc del Foix, de tota manera es presenta amb una densitat força baixa. En general la podem situar als bosquets de ribera i a les pinedes poc extenses.

Rossinyol bord (*Cettia cetti*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Aquesta espècie és sedentària. Nia a diferents racons del pantà i dels rius i rierols que hi ha al Parc del Foix. El 4-6-2003 observem polls volanders en dos llocs diferents del riu Foix entre Casa Riera i el convent de Sant Domingo de Penyaafort. El 26-7-2003 veiem joves al pantà.

Trist (*Cisticola juncidis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	?
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	x
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Aquest any s'han tornat a localitzar exemplars fora de l'època de nidificació a alguns punts apartats de l'embassament. S'ha citat el trist tots els trimestres de l'any, la qual cosa darrerament no era gens habitual.

A l'època de nidificació també s'hi han localitzat unes quantes parelles més a l'entorn de conreus i ermots. Així per exemple el 13-6-2003 se situen quatre territoris diferents de cria als entorns de Clariana. També es manté alguna parella per la zona de la cua de l'embassament que cria als canyar i canyissars.

Hem de destacar l'observació d'un exemplar sedimentat al coll que hi ha entre el puig de l'Àliga i el turó de les Tres Partions el dia 12-9-2003. Possiblement es deuria tractar d'un migrant o d'un exemplar en dispersió.

Boscaler comú (*Locustella luscinioides*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1999, 2000 i 2001.

Boscarla d'aigua (*Acrocephalus paludicola*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998.

Boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998.

Boscarla menjamosquits (*Acrocephalus palustris*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1999.

Boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant

primera citació postnupcial – 12-8-2003

última citació postnupcial – 23-10-2003

Observacions d'interès – Durant el pas migratori primaveral tan sols es va anotar el 2-5-2003. En canvi al pas postnupcial ha estat molt més freqüent, hi ha hagut dies que era molt abundant (23-8-2003, 11-9-2003 etc.).

Balquer (*Acrocephalus arundinaceus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003			x	
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	x

Observacions d'interès – Durant el pas migratori primaveral tan sols es va anotar el 22-4-2003. Ha estat l'única citació de l'any i per tant suposem que enguany no ha niat a l'embassament.

Bosqueta pàl·lida (*Hippolais pallida*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1973.

Bosqueta vulgar (*Hippolais polyglotta*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	x

Estival

primera citació prenupcial – 2-5-2003

última citació postnupcial – 12-8-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Tallareta cuallarga (*Sylvia undata*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x

Augmenta	
----------	--

Tallarol de garriga (*Sylvia cantillans*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant

primera citació prenupcial – 29-3-2003

última citació prenupcial – 15-5-2003

primera citació postnupcial – 23-8-2003

última citació postnupcial – 2-10-2003

Observacions d'interès – Aquest any s'han pogut recollir registres prou amplis en ambdós passos migratoris.

Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – El tallarol capnegre és una de les aus més abundants i millor repartides al Parc del Foix. Hi ha un bon nombre de parelles nidificants. Al llarg de molts dies d'estiu s'observen polls volanders acabats de sortir del niu (per exemple el 20-6-2003).

Tallarol emmascarat (*Sylvia hortensis*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Tallareta vulgar (*Sylvia communis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – La tallareta vulgar aquí tan sols s'anota durant els passos migratoris. Alguns anys és més abundant que d'altres en aquestes èpoques. Sovint resten sedimentades entre els arbusts d'alguns sectors de les muntanyes del parc. Aquest any sols es va citar el 23-8-2003.

Tallarol gros (*Sylvia borin*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	?
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Migrant

primera citació postnupcial – 23-8-2003

última citació postnupcial – 20-9-2003

Tallarol de casquet (*Sylvia atricapilla*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	
Conreus, erms i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	x

Observacions d'interès – Aquesta espècie durant els darrers anys va anar augmentant la seva població nidificant al Parc del Foix, però ara sembla que s'hagi estabilitzat una mica. Ocupa diferents indrets boscosos, sempre i quan siguin suficientment frescos, sobretot s'estableix a algunes obagues frondoses i als boscos de ribera. El dia 5-8-2003 veiem un exemplar jove.

Es pot veure al llarg de tot l'any, si bé la seva presència és detectada més aviat per les veus i cants que emet, que no pas per les vegades que es deixa observar. Durant els períodes de pas, i de forma més pronunciada a la tardor, són

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix

nidificants		
1 a 10		x
10 a 100		
Més de 100		

Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		
Augmenta		x

Observacions d'interès – Els dies d'hivern que comença a fer bon temps i fins a l'arribada de la primavera molts exemplars hivernants canten força. Hi ha unes poques parelles que nien al Parc del Foix. El passat any 2002 es va poder constatar per primera vegada la seva reproducció a aquest espai natural. Enguany al mateix lloc també s'hi ha vist una parella que mostrava clares evidències territorials (2-5-2003).

Mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		

Migrant
primera citació prenupcial – 12-4-2003
última citació prenupcial – 24-4-2003
primera citació postnupcial – 23-8-2003
última citació postnupcial – 28-9-2003

Reietó (*Regulus regulus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		x
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Observacions d'interès – El reietó és una espècie hivernant més aviat escassa. S'ha observat algunes vegades a partir del 8-11-2003.

Bruel (*Regulus ignicapillus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		x
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – El 4-6-2003 observem un exemplar jove que fa poc deu haver abandonat el niu.

Papamosques gris (*Muscicapa striata*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 22-4-2003
última citació postnupcial – 2-10-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Aquest any s'han recollit unes dates extremes força interessants, tant per la primera arribada primaveral, com per la darrera citació de tardor.

Com en anys anteriors s'ha constatat la reproducció a diferents àrees de bosc de ribera de les mateixes vores del pantà o del riu Foix. El 13-6-2003 un adult porta becada. El 12-8-2003 es veu un exemplar adult que acompanya a un poll volander.

Mastegatxes (*Ficedula hypoleuca*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Migrant

primera citació prenupcial – 13-4-2003 (PTE)
última citació prenupcial – 2-5-2003
primera citació postnupcial – 18-8-2003
última citació postnupcial – 1-10-2003 (PTE)

Mallerenga cuallarga (*Aegithalos caudatus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - La major part de l'any van en estols mixtes, junt amb d'altres espècies de malle rengues, amb bruels, mosqueters i raspinells.

Durant els mesos aptes per a la reproducció se les veu aparellades. El 12-4-2003 una parella construeix niu. El 2-5-2003 veiem un grup familiar, en què els adults estan peixant als polls volanders. El 10-5-2003 es veuen exemplars joves acabats de sortir del niu. El 16-5-2003 observem exemplars joves fora el niu. El 4-6-2003 observem un grup de joves volanders. El 5-6-2003 trobem dos grups de juvenils, un de 22 i l'altre de 9 exemplars. El 13-6-2003 veiem joves. El dia 1-7-2003 observem joves. El 8-7-2003 trobem exemplars joves.

Mallerenga emplomallada (*Parus cristatus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

- divagant	
------------	--

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - Aquesta és una espècie força estesa per les zones forestals del Parc del Foix. El 10-5-2003 s'observa un grup de joves volanders.

Mallerenga petita (*Parus ater*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – L'any passat es va confirmar la cria segura d'aquesta espècie al Parc del Foix, feia anys que se la considerava probable. Enguany s'ha anat anotant al llarg de tots els trimestres. És una espècie escassa.

Mallerenga blava (*Parus caeruleus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		x
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitatats		x
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Boscors		x
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Observacions d'interès – Aquesta mallerenga sobretot s'observa als entorns del pantà i també als boscos de ribera dels diferents rius, rierols i torreneres del Parc del Foix. El 2-5-2003 trobem un exemplar que entra al niu. El 16-5-2003 veiem polls volanders que fa poc han abandonat el niu. El 22-5-2003 una parella entra al niu seguidament aportant becada. El 30-5-2003 s'observen alguns polls sortits recentment del niu. El dia 1-7-2003 observem adults i joves.

Mallerenga carbonera (*Parus major*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003	x			
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		
Més de 100		x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitatats		
Conreus, ermots i marges		x
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		x
Boscors		x
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Observacions d'interès – El 10-5-2003 es veuen exemplars joves acabats de sortir del niu. El 16-5-2003 un adult porta becada i entra a un niu que té en un forat de la paret a les roques Boveres. El 30-5-2003 s'observen alguns polls sortits recentment del niu. El 4-6-2003 observem polls volanders. El 13-6-2003 veiem joves. El dia 1-7-2003 observem adults i joves. El 8-7-2003 trobem exemplars joves.

El 18-2-2003 quan ja fosqueja veiem dos exemplars dormint a l'interior de dos nius diferents d'abellerol.

Raspinell (*Certhia brachydactyla*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		
Més de 100	x	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – Aquest ocell és força habitual arreu del Parc del Foix. A l'hivern se sol agrupar en estols mixtes amb d'altres moixons insectívors de bosc. El 4-6-2003 veiem polls volanders.

Teixidor (*Remiz pendulinus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant	x	
- de pas	x	
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Hivernant última citació prenupcial – 12-1-2003
 primera citació postnupcial – 30-10-2003

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie hivernant escassa i molt localitzada. Quasi sempre es situa al mateix lloc; entre la vegetació de canyissars negats d'aigua que hi ha a la cua de l'embassament.

Oriol (*oriolus oriolus*)

Observat el 2003

Fenologia

Observacions al llarg dels trimestres 2003
--

- sedentari	
- estival	x
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 2-5-2003
última citació postnupcial – 28-8-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – S'ha anat observant amb regularitat durant els mesos estivals. A la tardor, un cop ja són fora del país, ha quedat al descobert un niu de l'any que tenien situat en un àlber de la cua de l'embassament.

Botxí (*Lanius excubitor*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió	x	
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – Aquest any 2003 s'ha observat molt poques vegades. A molts indrets de Catalunya presenta una tendència clarament regressiva; sembla ser que va a menys i desapareix de molts llocs. Al Parc del Foix, fins a l'any passat ens semblava que es mantenia força estable. Les poques citacions d'enguany ens fan pensar que potser també està començant a minvar. El 22-5-2003 (PTE, MSS) es veu un exemplar amb becada al fondo de la Bovera.

Capsigrany (*Lanius senator*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003				
- sedentari		Gener - març				
- estival	x	Abril - juny			x	
- hivernant		Juliol - setembre			x	
- de pas	x	Octubre - desembre				
- divagant						

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
1 a 10		Zones urbanes o nuclis habitatats	
10 a 100	x	Conreus, ermots i marges	x
Més de 100		Penya-segats i roquissars	
		Màquies i garrigues	x
		Bosc	
		Zones humides	

Estival primera citació prenupcial – 17-4-2003
última citació postnupcial – 5-7-2003

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – Hi ha algunes parelles nidificants repartides per diferents llocs del Parc del Foix. El 24-4-2003 es veu una parella amb actituds de zel. El 47-2003 (PTE, RTA) es veu una parella amb quatre polls volanders.

Gaig (*Garrulus glandarius*)

Observat el 2003

Fenologia		Observacions al llarg dels trimestres 2003				
- sedentari	x	Gener - març			x	
- estival		Abril - juny			x	
- hivernant		Juliol - setembre			x	
- de pas		Octubre - desembre			x	
- divagant						

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
		Zones urbanes o nuclis habitatats	

1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Observacions d'interès – El 22-5-2003 s'observen exemplars joves sortits del niu recentment.

Garsa (*Pica pica*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari	x	
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març	x	
Abril - juny	x	
Juliol - setembre	x	
Octubre - desembre	x	

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003	x				
anys anteriors	x				

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100	x	
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat	x	
Conreus, ermots i marges	x	
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable	x	
Augmenta		

Gralla (*Corvus monedula*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1999, 2000 i 2001.

Fenologia		
- sedentari	x	
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003					x
anys anteriors	x				

Estimació de parelles		
-----------------------	--	--

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
--	--	--

nidificants		
1 a 10		x
10 a 100		
Més de 100		

Zones urbanes o nuclis habitats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	x
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		x
Estable		
Augmenta		

Observacions d'interès – Aquest és el segon any consecutiu que no hem vist cap vegada a la gralla. Al mateix límit del Parc del Foix, en una pedrera, sembla ser que era la darrera localitat de les comarques que envolten el pantà (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) on encara hi havia alguna parella de gralla que s'hi reproduïa, almenys fins al passat 2001. Malgrat tot hem de dir que sí que s'ha detectat esporàdicament la seva presència a pocs quilòmetres del Pantà de Foix.

Corb (*Corvus corax*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		x

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003					x
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		x
10 a 100		
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitats		
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		x
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		x
Estable		
Augmenta		

Observacions d'interès – Al Parc del Foix els darrers anys el corb sembla haver desaparegut com a nidificant. Aquest any s'ha anat veient unes quantes vegades a diferents llocs, tant a prop de l'embassament com des de les muntanyes més altes.

Estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		x
- de pas		x

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

- divagant	
------------	--

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Com en anys anteriors n'hi ha una població sedentària que nia a diferents llocs de l'espai natural del Parc del Foix. A la tardor hi ha una notable entrada d'exemplars provinents del nord que es queden a hivernar. El 25-10-2003 s'observa un grupet de migrants des del turó de les Tres Partions.

Estornell negre (*Sturnus unicolor*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	x
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Tot i que sovint es barregen amb l'altra espècie d'estornell, i fins i tot i poden arribar a hibridar, l'estornell negre se sol mostrar més lligat als punts on nia. El 22-5-2003 observem exemplars joves que fa poc han abandonat el niu, i també adults que entren als nius amb becada.

Pardal (*Passer domesticus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		
Més de 100		x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		x
Conreus, ermots i marges		x
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Observacions d'interès – El 2-5-2003 observem alguns exemplars que construeixen niu. El 10-5-2003 ja es veu algun niu amb polls.

Pardal xarrec (*Passer montanus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
2003		x			
anys anteriors		x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		x
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		x
Conreus, ermots i marges		x
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Pardal roquer (*Petronia petronia*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		
- de pas		
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Nidificant				
		segur	probable	possible
2003		x		
anys anteriors		x		

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		
10 a 100		x
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitat		
Conreus, ermots i marges		
Penya-segats i roquissars		x
Màquies i garrigues		
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		
Estable		x
Augmenta		

Pinsà (*Fringilla coelebs*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		
- estival		
- hivernant		x
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

Hivernant última citació prenupcial – 21-3-2003
 primera citació postnupcial – 24-9-2003

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie típicament hivernant, en general molt abundant. Durant el dia es concentren a l'entorn dels cultius i ermots. Al vespre entren a ajocar-se als boscos. A la tardor es produeixen les arribades dels exemplars hivernants. Des del puig de l'Àliga i del turó de les Tres Partions hi ha dies que s'observa un pas molt marcat (per exemple el 20-10-2003 uns 400 exemplars, el 1-11-2003 uns 150 exemplars, etc.).

Pinsà mec (*Fringilla montifringilla*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1998 (exemplar possible).

Gafarró (*Serinus serinus*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		x
- hivernant		x
- de pas		x

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		x
Abril - juny		x
Juliol - setembre		x
Octubre - desembre		x

- divagant	
------------	--

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	x
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Boscors	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Una mica abans de la primavera canten molt, i seguidament realitzen vols de zel. El 4-3-2003, 13-3-2003 i 28-3-2003 entre d'altres dies s'anoten exemplars en vols de zel. El 8-5-2003, 30-5-2003 i 27-6-2003 s'observen alguns polls sortits recentment del niu. Els dies 20-6-2003, 1-7-2003 i 23-8-2003 observem joves volanders. Poden realitzar una segona cria, el 4-6-2003 se situa un niu on estan covant. Un cop han finalitzat la reproducció passen més desapercebuts.

A la tardor s'anoten alguns exemplars que travessen les muntanyes del Parc del Foix en vols migratoris, per exemple el dia 1-11-2003 s'anoten una vintena de migrants.

Verdum (*Carduelis chloris*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	x
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Boscors	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - El 12-4-2003 s'observa una parella que manifesta actituds de zel. I una altra que construeix niu.

Cadenera (*Carduelis carduelis*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	
Més de 100	x

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	x
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Bosc	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès - Moltes parelles nien a diferents punts del Parc del Foix. Els joves sortits del niu de primer se'ls veu junt amb els adults i després es poden agrupar en estols més grans. El 4-6-2003 observem polls volanders i una parella que construeix niu. El 5-6-2003 veiem un grup de polls que fa poc han sortit del niu. Els dies 1-7-2003, 6-7-2003, 17-7-2003, 12-8-2003 i 23-8-2003 observem adults i joves. Poden fer segones postes o nius de reposició fins força tard, tal i com ho demostra l'observació del 6-7-2003 en què una parella construeix niu.

Lluer (*Carduelis spinus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Hivernant última citació prenupcial – 22-2-2003 (PTE, RRS)
 primera citació postnupcial – 11-12-2003

Observacions d'interès – A l'hivern hi ha anys que se'n veuen bastants i d'altres anys en què se'n veuen pocs. A principis d'any, en l'hivern 2002-2003 se'n van anotar bastants dies. En canvi a finals d'any, en l'hivern 2003-2004 no ha estat tant habitual.

Hi havia anys que s'observava en petits grupets que passaven migrant pels cims més alts del Parc del Foix, aquesta tardor no es va citar. Tan sols ens va semblar que en passava algun, però la citació no va ésser prou segura. En tot cas és clar que ha estat un hivern més fluix.

Passerell (*Carduelis cannabina*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – Hi ha un cert nombre de parelles que es reproduïxen per les zones muntanyoses on hi ha un predomini arbustiu. El 10-5-2003 es veuen exemplars joves acabats de sortir del niu, un adult es seguit per dos polls volanders que li reclamen aliment. Pocs dies després, el 15-5-2003, hi ha quatre exemplars que marquen territori.

Durant els mesos de tardor i hivern fomen estols junt amb d'altres fringíl·lids, en aquestes èpoques de l'any sobretot s'observen a l'entorn de les zones de conreu i als erms.

A la tardor es va detectar un pas o arribada d'exemplars hivernants des dels cims més alts del Parc del Foix. El 20-10-2003 s'anota un centenar de migrants i el dia 1-11-2003 una quarantena.

Trencapinyes (*Loxia curvirostra*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	
- de pas	
- divagant	x

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Enguany hi ha hagut molt poca presència d'aquesta au al Parc del Foix. Tan sols s'ha citat un dia (el 4-3-2003 es veuen cinc exemplars). Aquesta espècie és molt irregular i la seva presència a casa nostra va lligada a com ha anat la fructificació dels pins a d'altres zones.

Pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*)

No observat el 2003. Darreres observacions anys – 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Durbec (*Coccothraustes coccothraustes*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	

- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – El durbec és una espècie hivernant bastant escassa. No s'anota cada hivern. La seva observació, depèn força de les condicions (temps i aliment, sobretot) que troben en zones més nòrdiques. Es va observar els dies 18-12-2003 i 28-12-2003 a l'entorn dels boscos de ribera de la cua de l'embassament i del riu Foix.

Verderola (*Emberiza citrinella*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Observacions d'interès – La verderola és una espècie hivernant d'aparició molt irregular o esporàdica al Parc del Foix. S'ha observat molt pocs anys. El 28-12-2003 es van observar de primer dos exemplars i més tard un (que podria ser el mateix) en una àrea de conreus a prop del riu Foix.

Gratapalles (*Emberiza cirulus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	x
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	x
Juliol - setembre	x
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003	x			
anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	
10 a 100	x
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitat	
Conreus, ermots i marges	x
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	
Boscos	x
Zones humides	

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix	
Disminueix, espècie en regressió	
Estable	x
Augmenta	

Observacions d'interès – El 22-5-2003 i el 6-7-2003 observem exemplars joves que fa poc han abandonat el niu. Els dies 12-8-2003 i 23-8-2003 també s'anoten exemplars juvenils una mica més crescutets.

Sit negre (*Emberiza cia*)

Observat el 2003

Fenologia

Observacions al llarg dels trimestres 2003
--

- sedentari	?
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Nidificant				
	segur	probable	possible	no detectat
2003				x
anys anteriors		x		

Estimació de parelles nidificants	
1 a 10	x
10 a 100	
Més de 100	

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix	
Zones urbanes o nuclis habitatats	
Conreus, ermots i marges	
Penya-segats i roquissars	
Màquies i garrigues	x
Bosc	
Zones humides	

Observacions d'interès – Aquest any s'han observat pocs exemplars hivernants.

Hortolà (*Emberiza hortulana*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	?
- hivernant	
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	
Abril - juny	x
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	

Observacions d'interès – Aquesta és una espècie que feia molts anys que no s'anotava a les terres del Parc del Foix. Es tracta d'una au que arreu del país ha minvat molt. En general costa bastant de localitzar, a no ser que canti (però canta pocs dies i preferentment de matinada), és una espècie molt discreta.

La citació del 10-5-2003 és molt interessant. En passar per la zona dels camps de Bellestar, de lluny es va sentir el cant inconfusible de l'hortolà en una zona muntanyosa cap a la banda de la plana Barquera. Aquesta és una zona poc freqüentada ja que ni tan sols hi ha cap camí que passi per la plana. L'ambient natural de l'indret és favorable per a la nidificació de l'espècie. La data en què es va anotar entra perfectament en el període reproductor de l'espècie. Per tot plegat hem de pensar que caldrà fer un seguiment en anys pròxims per tal d'aclarir si hi ha alguna parella d'hortolà establerta com a nidificant, o si tan sols s'anota com a migrant.

Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*)

Observat el 2003

Fenologia	
- sedentari	
- estival	
- hivernant	x
- de pas	x
- divagant	

Observacions al llarg dels trimestres 2003	
Gener - març	x
Abril - juny	
Juliol - setembre	
Octubre - desembre	x

Hivernant última citació prenupcial – 14-3-2003
 primera citació postnupcial – 23-10-2003

Observacions d'interès – Els repicatalons a l'hivern tenen diversos dormidors situats en els canyars i canyissars de la cua de l'embassament. El dia 1-1-2003 en contem aproximadament uns 200 als dormidors propers de la cua. El 4-3-2003 es conten aproximadament 60 exemplars als dormidors. El 4-11-2003 es conten aproximadament 50 exemplars als dormidors. El 28-12-2003 de bon matí surten uns 200 exemplars dels dormidors.

De dia es poden observar a les zones de cultiu, cap a mitja tarda, una o dues hores abans de la posta del sol comencen a entrar a les joques.

Cruixidell (*Miliaria calandra*)

Observat el 2003

Fenologia		
- sedentari		x
- estival		
- hivernant		x
- de pas		x
- divagant		

Observacions al llarg dels trimestres 2003		
Gener - març		
Abril - juny		x
Juliol - setembre		
Octubre - desembre		x

Nidificant					
		segur	probable	possible	no detectat
	2003		x		
	anys anteriors	x			

Estimació de parelles nidificants		
1 a 10		x
10 a 100		
Més de 100		

Hàbitats preferents de cria al Parc del Foix		
Zones urbanes o nuclis habitatats		
Conreus, ermots i marges		x
Penya-segats i roquissars		
Màquies i garrigues		x
Bosc		
Zones humides		

Estimació de la tendència de la seva població al Parc del Foix		
Disminueix, espècie en regressió		x
Estable		
Augmenta		

Observacions d'interès – Aquest any 2003 s'ha tornat a trobar el cruixidell en plena època reproductora. El 26-4-2003 (PTE) es va veure un exemplar cantant a la pedrera d'Uniland. El 15-5-2003 un mascle canta a prop del Maset del Rossell. Recordem que l'any 2000 també es va anotar per la zona del Corral de Muntanya. Aquesta espècie havia estat molt abundant fa dues o tres dècades.

A l'hivern uns quants cruixidells vénen a la cua de l'embassament a ajocar-s'hi. S'hi van detectar els dies 29-11-2003 i 18-12-2003.

	1+1+2+03	5+1+2+03	6+1+2+03	10+1+2+03	12+1+2+03	21+1+2+03	22+1+2+03	31+1+2+03	7+2+2+03	13+2+2+03	16+2+2+03	18+2+2+03	19+2+2+03	21+2+2+03	27+2+2+03	4+3+2+03	7+3+2+03	13+3+2+03	14+3+2+03	15+3+2+03	21+3+2+03	28+3+2+03	29+3+2+03	1er.	1+4+2+03
Gal·liformes																									
Perdiu - Alectoris rufa																									
Guatlla - Coturnix coturnix																									
Faisà - Phasianus colchicus																									
Gruiformes																									
Rascló - Rallus acuticus																									
Polla pintada - Porzana porzana																									
Rasclet - Porzana parva																									
Rasclet - Porzana pusilla																									
Guatlla maresa - Crex crex																									
Polla d'aigua - Gallinula chloropus																									
Foja - Fulica atra																									
Grua - Grus grus																									
Sisó - Tetrax tetrax																									
Caradriformes																									
Cameslargues - Himantopus himantopus																									
Torit - Burhinus oedicnemus																									
Coriol petit - Charadrius dubius																									
Coriol gros - Charadrius hiaticula																									
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																									
Fredulega - Vanellus vanellus																									
Territ menut - Calidris minutus																									
Territ de temminck - Calidris temminckii																									
Territ beclarg - Calidris ferruginea																									
Territ variant - Calidris alpina																									
Becadell sord - Lymnocyptes minimus																									
Becadell comú - Gallinago gallinago																									
Becada - Scolopax rusticola																									
Tètol cuanegre - Limosa limosa																									
Tètol cuabarrat - Limosa lapponica																									
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																									
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																									
Gamba verda - Tringa nebularia																									
Xivita - Tringa ochropus																									
Valona - Tringa glareola																									
Xivitona - Actitis hypoleucos																									
Gavina menuda - Larus minutus																									
Gavina vulgar - Larus ridibundus																									
Gavià fosc - Larus fuscus																									
Gavià argentat - Larus cachinnans																									
Xatrac gros - Sterna caspia																									
Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus																									
Fumarell negre - Chlidonias niger																									
Columbiformes																									
Colom roquer - Columba livia																									
Xixella - Columba oenas																									
Tuó - Columba palumbus																									
Tòrtora turca - Streptopelia decaocto																									
Tòrtora - Streptopelia turtur																									
Psittacidae																									
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																									
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																									
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																									
Cuculiformes																									
Cucut reial - Clamator glandarius																									
Cucut - Cuculus canorus																									
Estrigiformes																									
Oliba - Tyto alba																									
Xot - Otus scops																									
Duc - Bubo bubo																									
Mussol - Athene noctua																									
Gamarús - Strix aluco																									
Caprimulgiformes																									
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus																									
Siboc - Caprimulgus ruficollis																									
Apodiformes																									
Ballester - Apus melba																									
Falcot negre - Apus apus																									

data	1+1+2003	5+1+2003	6+1+2003	10+1+2003	12+1+2003	21+1+2003	22+1+2003	31+1+2003	7+2+2003	13+2+2003	16+2+2003	18+2+2003	19+2+2003	21+2+2003	27+2+2003	4+3+2003	7+3+2003	13+3+2003	14+3+2003	15+3+2003	21+3+2003	28+3+2003	29+3+2003	1er.	1+4+2003
Falciot pàl·lid - Apus pallidus																									
Coraciiformes																									
Blauet - Alcedo atthis	v+v+1		v+1	v+v+1	x5		1	1	x3	v+1	1+2	2v	2	x3	1	x5	v+1								X
Abellerol - Merops apiaster																									
Gaig blau - Coracias garrulus																									
Puput - Upupa epops			1											1c		1+1									
Piciformes																									
Collort - Jynx torquilla																									
Picot verd - Picus viridis						1v			1																1
Passeriformes:																									
Alaudidae																									
Terrerola vulgar - Calandrella brachydactyla																									
Cogullada vulgar - Galerida cristata	v										v+1			v								1			
Cogullada fosca - Galerida theklae																									
Cotoliu - Lullula arborea	1			1v	4				2		5		5												
Alosa - Alauda arvensis												3													
Hirundinidae																									
Oreneta de ribera - Riparia riparia																									
Roquerol - Ptyonoprogne rupestris					3	30+/-						2+2			6										X
Oreneta vulgar - Hirundo rustica																1	3		10+/-		algunes	1	algunes		algunes
Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica																									
Oreneta cuablanca - Delichon urbica																			14		algunes		algunes		algunes
Motacillidae																									
Trobat - Anthus campestris																									
Plula dels arbres - Anthus trivialis																									
Titella - Anthus pratensis	v+v+3	v	v	x6	x12	vx3	v+v		v+1v	x4	x10	x7		x8	v	v+1+2	v	1	1+1		2				x4
Grasset de muntanya - Anthus spinoletta																									
Grasset de costa - Anthus petrosus																									
Cuereta groga - Motacilla flava																									
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea	1	1		v+v+1	1	1	1			1	1v+1	x3		1		1									
Cuereta blanca - Motacilla alba	350+/-	1	1	x4	x7	1+1	4	1+1	1+1	2+1	x6	x6	1+2	1+1		2+1+40+/-	2		2+10+/-	1			1+1		
Troglodytidae																									
Cargotet - Troglodytes troglodytes	v+v	v+v	c+c	x12	x4	3nius vells	v+v	v	c+c+1	c+1	c+c		v	c+c	cx3	c+c	c	x3	c+c+1		cx3	c	c		cx6
Prunellidae																									
Pardal de bardissa - Prunella modularis	v	v		vx5	x5	v	v	v	v+1	v+v	v+1	2		v+1	v			1				v			
Turdidae																									
Pit-roig - Erithacus rubecula	vx4	x6	v	x24	x15	x4	v	x3	x8	cx1	v+1+1	x5	1	vx5	x4	c+v+v	x5	x3	x3		cx5				cx3
Rossinyol - Luscinia megarhynchos																									
Cotxa blava - Luscinia svecica																									
Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros	1+1+1	1+1		1	x5	1+2	1	x2	1+1		1+1+2	1+1	1	x4		1+1	1	restes dep.	1+1						
Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus																									
Bitxac rogenç - Saxicola rubetra																									
Bitxac comú - Saxicola torquata		1+2	1						1+2	v	1	1	1	1			1v	c	v+1c						
Còbit gris - Oenanthe oenanthe																									
Còbit - Oenanthe hispanica																									
Còbit negre - Oenanthe leucura																									
Merla roquera - Monticola saxatilis																									
Merla blava - Monticola solitarius												1		1				p+c					1m		
Merla de pit blanc - Turdus torquatus																									
Merla - Turdus merula	x4	v+v+1	1+1	x19	x25	x6	x4	x3	x4	x6	x8	x5	1+1+2	v+1+1+2	x4	x25+cx4	x4	x4	x8	1	x15	vx2+c	v		cx10
Griva cerdana - Turdus pilaris																									
Tord - Turdus philomelos	x6	v		x15	x30	x20	x10		x20	x6	x6	x15	1+1	x6		v+c+c	v+c+c	x2+c	c+c		cx4	v+c	c+c		1v
Tord ala-roig - Turdus iliacus																									
Griva - Turdus viscivorus	1v	1		c+2+2	2v				1	2	2+c	1		c+2	2		c						1		
Sylviidae																									
Rossinyol bord - Cettia cetti	x6	v+c	c+c	x4	x9		c	c	x4	cx4	cx4	cx8	c+c	cx6	cx2	cx5	cx3	cx3	cx4	c		cx6	c+c		cx6
Trist - Cisticola juncidis												1													
Boscaler comú - Locustella luscinioides																									
Boscarla d'aigua - Acrocephalus paludicola																									
Boscarla dels joncs - Acrocephalus schoenobaenus																									
Boscarla menjamosquits - Acrocephalus palustris																									
Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpaceus																									
Balquer - Acrocephalus arundinaceus																									
Bosqueta pàl·lida - Hippolais pallida																									
Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta																									
Tallareta cuallarga - Sylvia undata		3v+1+1+1																							
Tallarol de garriga - Sylvia cantillans																								v	
Tallarol capnegre - Sylvia melanocephala	v+v	x8	v+v	x33	x8	vx4	x4	x3	x4	x5	vx6	v+v+1		vx4	v	vx6	x6	x4+c	vx6		vx4	vx2	vx6		vx8

data	1+1+2003	5+1+2003	6+1+2003	10+1+2003	12+1+2003	21+1+2003	22+1+2003	31+1+2003	7+2+2003	13+2+2003	16+2+2003	18+2+2003	19+2+2003	21+2+2003	27+2+2003	4+3+2003	7+3+2003	13+3+2003	14+3+2003	15+3+2003	21+3+2003	28+3+2003	29+3+2003	1er.	1+4+2003
Tallarol enmascarat - Sylvia hortensis																									
Tallareta vulgar - Sylvia communis																									
Tallarol gros - Sylvia borin																									
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	v+v	v			x6	x50	1					v+v		v	v	v	v		2			1f	c+c		c
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli																									1
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																									
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	v	v+1			x8	x6	x6	2	x2	v	2	2+1+2	x80+/-	1	x3	1	c	v+c				v	vx2		1v
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus																									
Reietó - Regulus regulus																									
Bruel - Regulus ignicapillus		v			v+2	1						c					c+1c		c				c		
Muscicapidae																									
Papamosques gris - Muscicapa striata																									
Mastegatatzes - Ficedula hypoleuca																									
Paridae																									
Mallerga cuallarga - Aegithalos caudatus	v	v+v			x13	vs+vs+6	v+10+/-			4+vs+vs	vs+vs	1+2	v+p+1		1+1	vs	2v+8+/-+2	v+v+2	vs+v	v	2	v+v		v	v
Mallerga emplomallada - Parus cristatus	v	v+1	v		x7	vx4	v	10+/-		v+v	1		v		v+1	vs	1	v	x2			v			v
Mallerga petita - Parus ater					c					c															
Mallerga blava - Parus caeruleus	v				x3	3v+1	v+v			2v	1	v+1		v	vs	c+c+v	v+2	v	v			v			
Mallerga carbonera - Parus major		1			x6	v+v+c	v+v	c	2	1	v+c	c+c	v+c+2		v+1	x3+c	1+1	1	x3+c	c+c		v+c	v	c+c+1	c+c+v
Certhiidae																									
Raspinell - Certhia brachydactyla	v				x7	vx4	v+1	v	x3	cx4	v+v	v+v	v+v		v+v	v	c+c	c+1	x3+c	c+c		c+c+c	v+c	c+c	v+v
Remizidae																									
Teixidor - Remiz pendulinus					vs	2v																			X
Oriolidae																									
Oriol - Oriolus oriolus																									
Laniidae																									
Botxi - Lanius excubitor																									
Capsigrany - Lanius senator																									
Corvidae																									
Galg - Garrulus glandarius		v			v		v+1		vs	v+v+1						1			vs						2v
Garsa - Pica pica		2	1		1	1	3	1		2		2	1+1+2	1	2					2			1		v+2
Gralla - Corvus monedula																									
Corb - Corvus corax																1	v								X
Sturnidae																									
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris					x30	alguns				alguns		alguns		alguns		alguns		alguns							
Estornell negre - Sturnus unicolor					x10	alguns				alguns				alguns		alguns			alguns						alguns
Passeridae																									
Pardal - Passer domesticus	alguns				x54	alguns		alguns		alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	vs	alguns	alguns	vs	alguns		alguns				
Pardal xarrec - Passer montanus	1v				3	v				v		8	8		2		1	4	vs	2					1
Pardal roquer - Petronia petronia														2											
Fringillidae																									
Pinsà - Fringilla coelebs	alguns	1+2	v		x67	150+/-	alguns	alguns		alguns	alguns	x50+/-	alguns	alguns	8+/-	alguns	algun	6+/-+v	10+/-	1	1				
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																									
Gafarró - Serinus serinus	v+c	c+6	c+c		x41	x12		c	x5	v+v	40+/-	40+/-	30+/-+20+/-	30+/-			c+c+1zei	c	cx3+v+zei	cx20	c	v+v	cx2+zei	cx10	cx30+/-
Verdum - Carduelis chloris	v				v	v+1c	v	v		8+2	v+c	v	3+2			x5	cx4	c	cx2+v	v+cx6		v+c	v	v+2	v+c+c+4
Cadernera - Carduelis carduelis	v+2				x7	x8	v+v	v		30+/-+v	v+2	1+2	20+/-	v+12	2	vs	x8	c	10+/-+c	v+30+/-+10+/-	2	v+v+c	c	v+10+/-	x10+/-
Lluer - Carduelis spinus	1	1+3			2	v+1	3					v	1+20+/-												X
Passerell - Carduelis cannabina	1+24						vs+vs			2v			v+12		v	vs	2		vs+c	1+10					v
Trencapinyes - Loxia curvirostra																	5								
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																									
Durbec - Coccothraustes coccothraustes																									
Embericidae																									
Verderola - Emberiza citrinella																									
Gratapalles - Emberiza cirius	2				vs+1		c				c			c+c			c	cx2	c		c+c		c		c
Sit negre - Emberiza cia					1v					v				6											
Hortolà - Emberiza hortulana																									
Repicalatons - Emberiza schoeniclus	200+/-				v+v	v+1								v		60+/-	10+/-	vs	1						
Cruixidell - Miliana calandra																									
Espècies no identificades																									
falcónid sp.																									
rapinyaire sp.																									
TOTAL	43	31	25	53	49	31	34	20	46	36	40	45	26	49	34	47	40	36	39	15	31	22	34		32

data	4+4+2003	6+4+2003	12+4+2003	12+4+2003	14+4+2003	17+4+2003	17+4+2003	22+4+2003	24+4+2003	2+5+2003	8+5+2003	10+5+2003	15+5+2003	16+5+2003	16+5+2003	22+5+2003	30+5+2003	30+5+2003	4+6+2003	5+6+2003	8+6+2003	13+6+2003	20+6+2003	27+6+2003	2n.
Galiformes																									
Perdiu - Alectoris rufa												p+p			c										
Guatlla - Coturnix coturnix																									
Faisà - Phasianus colchicus																									
Grufiformes																									
Rascló - Rallus acuaticus																									
Polla pintada - Porzana porzana																									
Rascletó - Porzana parva																									
Rasclet - Porzana pusilla																									
Guatlla maresa - Crex crex																									
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	20+/-		10+/-		x3	5		6	10	15+/-	1	v+v		v+v		6	10+/-		1	x7		x8	x3+2js		
Fotja - Fulica atra	10+/- + niu		10+/-			1+2		2	6	6				p+3polls+niu		4	2+polls			1+polls x3		2+ poll	1		
Grua - Grus grus																									
Sisó - Tetrax tetrax																									
Caradriformes																									
Camesllargues - Himantopus himantopus																									X
Torlit - Burhinus oedicnemus																									
Corriol petit - Charadrius dubius									v			2	p+10						1			3+1			X
Corriol gros - Charadrius hiaticula																									
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																									
Fredulega - Vanellus vanellus																									
Territ menut - Calidris minutus																									
Territ de temminck - Calidris temminckii																									
Territ bec llarg - Calidris ferruginea																									
Territ variant - Calidris alpina																									
Becadell sord - Limnocyptes minimus																									
Becadell comú - Gallinago gallinago																									
Becada - Scolopax rusticola																									
Tétol cuanegra - Limosa limosa																									
Tétol cuabarrat - Limosa lapponica																									
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																									X
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																									X
Gamba verda - Tringa nebularia																									
Xivita - Tringa ochropus								1																	X
Valona - Tringa glareola								2																	
Xivitona - Actitis hypoleucos	1		1+2+2					1	1	1+1															X
Gavina menuda - Larus minutus																									
Gavina vulgar - Larus ridibundus																									
Gavià fosc - Larus fuscus																									
Gavià argentat - Larus cachinnans																									
Xatrac gros - Sterna caspia																									
Fumarell carabanc - Chlidonias hybridus																									
Fumarell negre - Chlidonias niger																									
Columbiformes																									
Colom roquer - Columba livia			5							2				2	9		3	20+/-				3+20+/-	3		
Xixella - Columba oenas				1 niu								1													
Tudó - Columba palumbus	c+3+niu	c	c+2+4+1zel	2+1	cx2		c+3	2+4	x16	c+2+1		x4	2+1zel	2	1	x11	1	1	1+2+p zel	c+2+1 zel	c+c	1+1	x5+c	c+1	
Tórtora turca - Streptopelia decaocto												1+2							3+p zel	2c		1c			
Tórtora - Streptopelia turtur			1				1c+c		c	c+1c		c+1c	c	c	c	c	c+1	c	1				c+1	1	X
Psittacidae																									
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																									
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																									
Cotorra de pil gris - Myiopsitta monachus																									
Cuculiformes																									
Cucut reial - Clamator glandarius													1c												
Cucut - Cuculus canorus				c			c		c+2	c+c		c			c+c	c		c		c					
Estrigiformes																									
Óliba - Tyto alba																									
Xot - Otus scops										c															
Duc - Bubo bubo																									
Mussol - Athene noctua										c					1			1							X
Gamarús - Strix aluco																									
Caprimulgiformes																									
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus															c+c										
Siboc - Caprimulgus ruficollis															c										
Apodiformes																									
Ballester - Apus melba		5+/-		c+2						2+4		1+1					1								X
Falcionet negre - Apus apus			5+100+/-	20+/- + 10+/-	1	alguns		alguns	alguns	alguns	vs	alguns	alguns	alguns	15+/- nius	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	40+/- + nius	20+/-	

data	4+4+2003	6+4+2003	12+4+2003	12+4+2003	14+4+2003	17+4+2003	17+4+2003	22+4+2003	24+4+2003	2+5+2003	8+5+2003	10+5+2003	15+5+2003	16+5+2003	16+5+2003	22+5+2003	30+5+2003	30+5+2003	4+6+2003	5+6+2003	8+6+2003	13+6+2003	20+6+2003	27+6+2003	2n.
Tallarol enmascarat - Sylvia hortensis																									
Tallareta vulgar - Sylvia communis																									
Tallarol gros - Sylvia borin																									
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	c		c+1+2		v	v+v		c	cx4	1m+1m+c	c	c		c+c		cx4			cx5	cx6	c	cx3	x12	cx2	
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli	c		c+c						cx5	c		c				x9			c+1			x10		x3	
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																									
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita			1c							1t															
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus			c+c						c																
Reietó - Regulus regulus																									
Bruel - Regulus ignicapillus	cx6	c	c			c		c+c	cx3	cx4+1	c			c		cx4	c		c+1j	c	c			x8	vx2
Muscicapidae																									
Papamosques gris - Muscicapa striata								1		1						1+1			v+1	v	v	1 bec	1	vs	
Mastegatatxes - Ficedula hypoleuca									1m	1m															
Paridae																									
Mallergenca cuallarga - Aegithalos caudatus	vx6		v+p+p mat			v	v+v	1+2	x6	v+js bec+2		vs+vs+js	v	js+vs		x8			6js+vs	v+22js+9js	vs	v+js+js	12+vs	vs+j	
Mallergenca emplomallada - Parus cristatus	v	vs	2v		vs		v+1	v	x4	v+v	vs	vs+vs+js	v			x9		v	v	v	vs	v	vsx2		
Mallergenca petita - Parus ater																							c		
Mallergenca blava - Parus caeruleus	v		x4		v			v	v	1+1+niu		v		polls		p niu+1	polls		v+v+2	v+v	vs	v	v+js		
Mallergenca carbonera - Parus major	cx4+2	c	c+2+2	c	c	c+c	c+1		x7	c+1	c+js	c+2+polls	c+c	c	1 niu	x3	polls		js+c+2	1+1	js+js	c+js	v+js	x2	
Certhiidae																									
Raspinell - Certhia brachydactyla	x4		cx4		cx2	v	v+c	v+v	x7	x4		v+c	1c	c		x7			cx4+1	cx4	v	x6	x6	v	
Remizidae																									
Teixidor - Remiz pendulinus																									
Oriolidae																									
Oriol - Oriolus oriolus										c		v	c	c		c+c	v		cx4	c+2		c+c	c	c	
Laniidae																									
Botxl - Lanius excubitor																									
Capsigrany - Lanius senator							1v		p zel	1		v			1	1+1+p					1		1+1		1
Corvidae																									
Gaig - Garrulus glandarius	v		1v	1	vs	1		1	x4	v+1		1		1		js+1+1	1		x4	1+1		v+1	v+vs	x3	
Garsa - Pica pica			v									3	1						x7	1					
Gralla - Corvus monedula																									
Corb - Corvus corax			1v																						
Sturnidae																									
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris	alguns		alguns						alguns							alguns									
Estornell negre - Sturnus unicolor	alguns		alguns						alguns			alguns				bec+js		alguns	alguns	alguns		alguns			
Passeridae																									
Pardal - Passer domesticus	alguns		alguns			alguns		alguns	alguns	alguns		alguns		alguns		alguns	alguns		alguns	alguns		alguns	m+vs		
Pardal xarrec - Passer montanus			v+2						2	1		2				x3			2+v	v+2+2		1			
Pardal roquer - Petronia petronia												v													
Fringillidae																									
Pinsà - Fringilla coelebs																									
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																									
Gafarró - Serinus serinus	x6	vs+c	x30+/-	cx6	v	x10	cx6	cx6	x43	x10	vs+js	x15	x6	c	c	x38	c+polls	v+c	cx30	cx20	c	x10	x25+js	x4+polls	
Verdum - Carduelis chloris	x4		x15 (zel.mat)		c	2	2	1	x13	1+2		x4			c	v+1	x11	c+c	v	x20	x8	vs	x4	x6	x2
Cadernera - Carduelis carduelis	v+2	vs	v+2+2		v	vx4		x4	x13	v+2+2	v	v	v	v+2	v	x17	v	v+4	js+niu	c+js		x10	x8	c+v	
Lluer - Carduelis spinus																									
Passerell - Carduelis cannabina			2v	x6			x20		2			x6+js	v+4t+3+c+c		x6			2v+v	2					v	
Trencapinyes - Loxia curvirostra																									
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																									
Durbec - Coccothraustes coccothraustes																									
Embericidae																									
Verderola - Emberiza citrinella																									
Gratapalles - Emberiza cirius			c+1+p			1		c	c+c	c+c		c+c	c+p	c		x9 (js+bec)		c	cx5	c+1c		c	x2	c	
Sit negre - Emberiza cia																									
Hortolà - Emberiza hortulana												c													
Repicalatons - Emberiza schoeniclus																									
Cruixidell - Milvina calandra													c												
Especies no identificades																									
falcónid sp.																									
rapinyaire sp.																									
TOTAL	36	12	50	17	21	28	21	38	46	53	15	51	27	36	24	48	31	19	46	48	19	41	38	29	

data	1+7+2003	5+7+2003	6+7+2003	8+7+2003	17+7+2003	19+7+2003	26+7+2003	1+8+2003	2+8+2003	5+8+2003	12+8+2003	12+8+2003	16+8+2003	23+8+2003	28+8+2003	30+8+2003	4+9+2003	6+9+2003	8+9+2003	9+9+2003	10+9+2003	11+9+2003	12+9+2003	13+9+2003	14+9+2003
Galiliformes																									
Perdiu - Alectoris rufa																		5							
Guatlla - Coturnix coturnix																									
Faisà - Phasianus colchicus																									
Gruiformes																									
Rascló - Rallus acuaticus																						v+v			v+v
Polla pintada - Porzana porzana																									
Rascletó - Porzana parva																									
Rasclet - Porzana pusilla																									
Guatlla maresa - Crex crex																									
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	x10+/-	20+/- (js)		2(1 poll)	x16+js		x3+js	x6		x8+polls	x20 (polls)				x2+js	2+1+2					x20				20+/-
Fotja - Fulica atra	x8	10+/- (js)			x4+js		3	1+2+2		5	2				3	2					2+2				2
Grua - Grus grus																									
Sisó - Tetrao tetrao																									
Caradriformes																									
Camesllargues - Himantopus himantopus					1																				
Torlit - Burhinus oedicnemus																									
Corriol petit - Charadrius dubius					v+1		4	1+1+2		1	1v					6									
Corriol gros - Charadrius hiaticula																									
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																									
Fredulega - Vanellus vanellus																									
Territ menut - Calidris minutus																									
Territ de temminck - Calidris temminckii																									
Territ bec llarg - Calidris ferruginea																									
Territ variant - Calidris alpina																									
Becadell sord - Limnocyttus minimus																									
Becadell comú - Gallinago gallinago																									
Becada - Scolopax rusticola																									
Tétol cuanegre - Limosa limosa																									
Tétol cuabarrat - Limosa lapponica																									
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																									
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																									
Gamba verda - Tringa nebularia																									
Xivita - Tringa ochropus		2					2	3v		1															
Valona - Tringa glareola																									
Xivitona - Actitis hypoleucos							2	3		2	1+2				v	1									
Gavina menuda - Larus minutus																									
Gavina vulgar - Larus ridibundus																									
Gavià fosc - Larus fuscus																									
Gavià argentat - Larus cachinnans																									
Xatrac gros - Sterna caspia																									
Fumarell carabanc - Chlidonias hybridus																									
Fumarell negre - Chlidonias niger																									
Columbiformes																									
Colom roquer - Columba livia	1				x40+/-					2		2			20+/-	5			7						7
Xixella - Columba oenas																									
Tudó - Columba palumbus	2+2+1	c+2+2	c	1+2+2	x6+xel		c+10+/-	c+c+6	1	1+4+8	c+15+8	4			x20	2+2+4					10+/-				4+2
Tórtora turca - Streptopelia decaocto	c	c		20+/-	c						c	1													1
Tórtora - Streptopelia turtur	2+1		1				2				1+2				1										
Psittacidae																									
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																									
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																									
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																									
Cuculiformes																									
Cucut reial - Clamator glandarius																									
Cucut - Cuculus canorus				1																					
Estrigiformes																									
Óliba - Tyto alba																									
Xot - Otus scops																									
Duc - Bubo bubo												una ploma													
Mussol - Athene noctua																									
Gamarús - Strix aluco																									
Caprimulgiformes																									
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus												c+1													
Siboc - Caprimulgus ruficollis																									
Apodiformes																									
Ballester - Apus melba		2		20+/-		1			4							x6		10+/-	50+/-		100+/-		60+/-	c+50+/-	
Falcot negre - Apus apus	alguns	alguns		alguns	10+/-	1	1		alguns				alguns			84		10+/-		1	alguns				

data	1+7+2003	5+7+2003	6+7+2003	8+7+2003	17+7+2003	19+7+2003	26+7+2003	1+8+2003	2+8+2003	5+8+2003	12+8+2003	12+8+2003	16+8+2003	23+8+2003	28+8+2003	30+8+2003	4+9+2003	6+9+2003	8+9+2003	9+9+2003	10+9+2003	11+9+2003	12+9+2003	13+9+2003	14+9+2003	
Falciot pàl·lid - Apus pallidus									1							1		3								
Coraciiformes																										
Blauet - Alcedo atthis		1			x4		1	v+v+1		v+1	v+1+1	1		1	v+1							vx2			v+1	
Abellerol - Merops apiaster	1+1 bec	v	vs	4v	vs+1			v	v	3+6	3v+v	v	v+v	10	v+6	20+/-		25+20	vs	13	4+3	vs	v+v	30+36+20		
Gaig blau - Coracias garrulus																										
Puput - Upupa epops								1		1			1	1												
Piciformes																										
Collort - Jynx torquilla																										
Picot verd - Picus viridis				cx4								c		v	c											
Passeriformes:																										
Alaudidae																										
Terrerola vulgar - Calandrella brachydactyla																										
Cogullada vulgar - Galerida cristata				1c+1										1											2	
Cogullada fosca - Galerida theklae													1													
Cotoliu - Lullula arborea																										
Alosa - Alauda arvensis																										
Hirundinidae																										
Oreneta de ribera - Riparia riparia																									2	
Roquerol - Pyronoprogne rupestris																							2			
Oreneta vulgar - Hirundo rustica	js	algunes	3	nius	x23+js	2	10+/-	alguns	algunes	algunes	algunes	algunes	algunes	100+/-	algunes	1+c	algunes	algunes		1	algunes	20+/- migr	algunes	algunes	algunes	
Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica																										
Oreneta cuablanca - Delichon urbica	algunes	algunes	vs	algunes		2	20+/-	alguns	algunes	algunes	algunes	algunes	algunes	2	algunes	2	algunes	algunes		4	algunes		algunes	algunes	algunes	
Motacillidae																										
Trobat - Anthus campestris																										
Piula dels arbres - Anthus trivialis														x2										x5 migr	v	
Titella - Anthus pratensis																										
Grasset de muntanya - Anthus spinoletta																										
Grasset de costa - Anthus petrosus																										
Cuereta groga - Motacilla flava																								1 migr		
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea				3js																						
Cuereta blanca - Motacilla alba	2+1	2+1		1	vs+3		x3	x5		x6	x5	3		5	x4						2				1	
Troglodytidae																										
Cargolet - Troglodytes troglodytes	cx3		cx5	cx6	x2		cx2	c				v+c	v		x8	v+c					vcx5			c	c	
Prunellidae																										
Pardal de bardissa - Prunella modularis																										
Turdidae																										
Pit-roig - Erithacus rubecula	v	v		v+v				v																		
Rossinyol - Luscinia megarhynchos	alguns		v	alguns	vx2		v	alguns		alguns	alguns	alguns		x5	v+v+js				v			x5		v+v	c	
Cotxa blava - Luscinia svecica																										
Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros																										
Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus																							1	2		
Bitxac rogenç - Saxicola rubetra																										
Bitxac comú - Saxicola torquata				v				v		1	v		2	x3	1			4js					v	v	v	
Còbit gris - Oenanthe oenanthe																					1		1+1			
Còbit - Oenanthe hispanica																										
Còbit negre - Oenanthe leucura																										
Merla roquera - Monticola saxatilis																										
Merla blava - Monticola solitarius			1j		1							1v										2				
Merla de pit blanc - Turdus torquatus																										
Merla - Turdus merula	x10	c	cx5	x4	x3			x6				x6		x15	x5							x5			v+1+1	
Griva cerdana - Turdus pilaris																										
Tord - Turdus philomelos	c			c+1c											1											
Tord ala-roig - Turdus iliacus																										
Griva - Turdus viscivorus	v+1	v		1+3										8	v											
Sylvidae																										
Rossinyol bord - Cettia cetti	c+c	c	c	x4	c+v		cx2+j	x3		x8	x8	c		x5	x4							cx8+/-			x8	
Trist - Cisticola juncidis		c												v								c	1		c	
Boscaler comú - Locustella luscinioides																										
Boscarla d'aigua - Acrocephalus paludicola																										
Boscarla dels joncs - Acrocephalus schoenobaenus																										
Boscarla menjamosquits - Acrocephalus palustris																										
Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpaceus																										
Balquer - Acrocephalus arundinaceus																									x10+/-	
Bosqueta pàl·lida - Hippolais pallida																										
Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta			v	v	v					1+1	1															
Tallareta cuallarga - Sylvia undata									v			v			v+1	v+v					v		v	v+v		
Tallarol de garriga - Sylvia cantillans																x10								1		
Tallarol capnegre - Sylvia melanocephala	vx8		v	x8	vx5	v	v	vx4	v+v	x4	x8		vx5	x30	x6	vx5	v+v	x6	vx2	v+v	v+v	x10	x10+/-	x8	x10	

data	1+7+2003	5+7+2003	6+7+2003	8+7+2003	17+7+2003	19+7+2003	26+7+2003	1+8+2003	2+8+2003	5+8+2003	12+8+2003	12+8+2003	16+8+2003	23+8+2003	28+8+2003	30+8+2003	4+9+2003	6+9+2003	8+9+2003	9+9+2003	10+9+2003	11+9+2003	12+9+2003	13+9+2003	14+9+2003	
Tallarol enmascarat - Sylvia hortensis															1											
Tallareta vulgar - Sylvia communis															1											
Tallarol gros - Sylvia borin															1	1+1							x8			1+1
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	c+c	c	c	cx10	cx2		x3	c		1j	c+v	v			x15	x6						x6+/-				v+2+2
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli	c+c	c+c		c							c				1							1				
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																										
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita																										
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus															x30	1+1							1	1	1+2	
Reietó - Regulus regulus																										
Bruel - Regulus ignicapillus	c	c			v		v				v+v				vs+vs	v						v		v	v+v	
Muscicapidae																										
Papamosques gris - Muscicapra striata											2(1 poll)				x10										1	
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca											1+1				x5	1						1	1+2	1	1+1	
Paridae																										
Mallereenga cuallarga - Aegithalos caudatus	js+js			vs+js	vs		vs	v		vs+vs	v+v+2				vs+vs	10+/-			8			10+/-			v+2	
Mallereenga emplomallada - Parus cristatus	v	v		v+1	v		vs	v+1			v				vs							x5		v	v+v	
Mallereenga petita - Parus ater		c			c																					
Mallereenga blava - Parus caeruleus	v+js				v			v+2			v+v				v	v+2						x5			1+1	
Mallereenga carbonera - Parus major	js			js+vx3	x2		js	v	v	v	v+1				x8	v+1						x8		v+c	v+v	
Certhiidae																										
Raspinell - Certhia brachydactyla	vx4	v	v	vx4	v+2		vx3	v+1		c+c	vx4	v			x12	x3						x5			v+v	
Remizidae																										
Teixidor - Remiz pendulinus																										
Oriolidae																										
Oriol - Oriolus oriolus	c+2			x4	x2		1m+1f	v				c+1	1		x4	1										
Lanidae																										
Botxl - Lanius excubitor																										
Capsigrany - Lanius senator	1	1																								
Corvidae																										
Gaig - Garrulus glandarius	1			1v			1	v			v				x6	v+2+2	1					vs+vs			1	
Garsa - Pica pica			v	v+2+2					1		v	v	v	v	vx2+2	v		1			v	1	v	3	2	
Gralla - Corvus monedula																										
Corb - Corvus corax																			2							
Sturnidae																										
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris	alguns							alguns		alguns					alguns	alguns									alguns	
Estornell negre - Sturnus unicolor				alguns				alguns							alguns	alguns						1mc+				
Passeridae																										
Pardal - Passer domesticus	1	alguns	x2	alguns	x10		x20	alguns		alguns	alguns	alguns			20+/-	alguns						50+/-			alguns	
Pardal xarrec - Passer montanus			vs		vs					1+1	v				v+5	1+3						6+/-			10+/-	
Pardal roquer - Petronia petronia																										
Fringillidae																										
Pinsà - Fringilla coelebs																										
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																										
Gafarró - Serinus serinus	v+js	c+2	v	x10	cx5			1		3	v+2+2	1	v		vs+js	v+4									v+1	
Verdum - Carduelis chloris	v+v	c	v	x5	cx2		v+c		1		x8	v			x15	v+v						x10			v+1	
Cadernera - Carduelis carduelis	js+js	c	vs+c+js+cn	x7	vs+js	2	vs	v	1	v+v	x10(js)	5			40+/-+js	x6						x10+/-	1+2+2	v	v+6	
Lluer - Carduelis spinus																										
Passerell - Carduelis cannabina	1v	v	2									v			1	v							v			
Trencapinyes - Loxia curvirostra																										
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																										
Durbec - Coccothraustes coccothraustes																										
Embericidae																										
Verderola - Emberiza citrinella																										
Gratapalles - Emberiza cirius			c+js	c+1	v		c				c+1j				x12+js										c	
Sit negre - Emberiza cia																										
Hortolà - Emberiza hortulana																										
Repicatalons - Emberiza schoeniclus																										
Cruixidell - Milvina calandra																										
Espècies no identificades																										
falcóid sp.																		1 migr		2 migr				x2 migr		
rapinyaire sp.																		1 migr		x2 migr	1 migr			x7 migr		
TOTAL	42	33	22	43	36	6	32	39	13	31	52	23	13	59	50	11	6	19	8	14	13	41	19	26	50	

data	15+9+2003	16+9+2003	18+9+2003	20+9+2003	20+9+2003	24+9+2003	27+9+2003	28+9+2003	3er.	1+10+2003	2+10+2003	4+10+2003	5+10+2003	11+10+2003	11+10+2003	14+10+2003	18+10+2003	20+10+2003	23+10+2003	25+10+2003	30+10+2003	1+11+2003	4+11+2003	8+11+2003	11+11+2003	
Galliformes																										
Perdiu - Alectoris rufa			20+/- +10								7	c														
Guatlla - Coturnix coturnix																										
Faisà - Phasianus colchicus																										
Gruliformes																										
Rascló - Rallus acuaticus				vx2					X							v+v			v+v		vx3			vx4		
Polla pintada - Porzana porzana																										
Rascletó - Porzana parva																										
Rasclet - Porzana pusilla																										
Guatlla maresa - Crex crex																										
Polla d'aigua - Gallinula chloropus				vx10												30+/-			20+/-		20+/-		10+/-			1
Fotja - Fulica atra				1+1												20+/-			10+/-		30+/-		10+/-			
Grua - Grus grus																										
Sisó - Tetrax tetrax																										
Caradriformes																										
Carnesllargues - Himantopus himantopus																										
Torlit - Burhinus oedicnemus																										
Corriol petit - Charadrius dubius									X																	
Corriol gros - Charadrius hiaticula																										
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																										
Fredulega - Vanellus vanellus																										
Territ menut - Calidris minutus																										
Territ de temminck - Calidris temminckii																										
Territ becllarg - Calidris ferruginea																										
Territ variant - Calidris alpina																										
Becadell sord - Lymnocyptes minimus																										
Becadell comú - Gallinago gallinago																										
Becada - Scolopax rusticola																										
Tètol cuanegre - Limosa limosa																										
Tètol cuabarrat - Limosa lapponica																										
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																										
Gamba roja vulgar - Tringa totanus									X																	
Gamba verda - Tringa nebularia																										
Xivita - Tringa ochropus									X																	
Valona - Tringa glareola									X																	
Xivitona - Actitis hypoleucos									X										2v							
Gavina menuda - Larus minutus																										
Gavina vulgar - Larus ridibundus																										
Gavià fosc - Larus fuscus																										
Gavià argentat - Larus cachinnans																										
Xatrac gros - Sterna caspia																										
Fumarell carablanç - Chlidonias hybridus																										
Fumarell negre - Chlidonias niger									X																	
Columbiformes																										
Colom roquer - Columba livia					5			7				8			7				1		2	6		x3	1+2	350+/-
Xixella - Columba oenas																										
Tudó - Columba palumbus		13	2+3	4	10+26		17			1	9	3+2		1	5+28		7+2	2	x35 migr	10+3	x130 migr	40 migr+3	6 migr+4	3+7+2	3+18	
Tórtora turca - Streptopelia decaocto																										200+/-
Tórtora - Streptopelia turtur									X																	
Psittacidae																										
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																										
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																										
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																										
Cuculiformes																										
Cucut reial - Clamator glandarius																										
Cucut - Cuculus canorus																										
Estrigiformes																										
Óliba - Tyto alba																										
Xot - Otus scops																										
Duc - Bubo bubo																										
Mussol - Athene noctua																										
Gamarús - Strix aluco																										
Caprimulgiformes																										
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus										3																
Siboc - Caprimulgus ruficollis																										
Apodiformes																										
Ballester - Apus melba			30+/-		5+30+/-	50+/-		50+/- + 200+/-	X	50+/--migr	24+180+60	10+/-		27 migr							1					
Falciot negre - Apus apus					2																					

data	15+9+2003	16+9+2003	18+9+2003	20+9+2003	20+9+2003	24+9+2003	27+9+2003	28+9+2003	3er.	1+10+2003	2+10+2003	4+10+2003	5+10+2003	11+10+2003	11+10+2003	14+10+2003	18+10+2003	20+10+2003	23+10+2003	25+10+2003	30+10+2003	1+11+2003	4+11+2003	8+11+2003	11+11+2003	
Falciot pàl·lid - Apus pallidus																										
Coraciiformes																										
Blauet - Alcedo atthis				v												v+1			2			v+v		1		
Abellerol - Merops apiaster			v						X																	
Gaig blau - Coracias garrulus																										
Puput - Upupa epops																1										
Piciformes																										
Collort - Jynx torquilla																										
Picot verd - Picus viridis					c																				c	
Passeriformes:																										
Alaudidae																										
Terrerola vulgar - Calandrella brachydactyla																										
Cogullada vulgar - Galerida cristata																								v+1		
Cogullada fosca - Galerida theklae	1	1v	4						X	1v	2c+1	2v	1v	4v			v	2v		1	v	2	1	3+4	3+3 migr	1
Cotollu - Lullula arborea																	2v		1	v			3+4	3+3 migr	1	
Alosa - Alauda arvensis														v+v			v	6 migr			v+1	3v				
Hirundinidae																										
Oreneta de ribera - Riparia riparia						1 migr																				
Roquerol - Ptyonoprogne rupestris														x9 migr				x5			1+1	x10 migr	3+1 migr			
Oreneta vulgar - Hirundo rustica	3+10+/-	algunes	400+/-	30+/-	algunes	x150 migr		x500 migr		200+/- migr	100+/-	algunes		x20 migr		alguna			2			x10+/-				
Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica																										
Oreneta cuablanca - Delichon urbica	2+2+3	algunes	160+/-	20+/-	algunes	x300 migr		x500 migr		2000+/- migr	100+/-	algunes	30+/-	2 migr							4 migr					
Motacillidae																										
Trobat - Anthus campestris						1			X										1v							
Pula dels arbres - Anthus trivialis			x8		v			v				2														
Titella - Anthus pratensis														x10 migr			v	4+18+6 migr	50 +/- migr	v	x30 migr	v+v	x20 migr	x10	x8	v
Grasset de muntanya - Anthus spinoletta																										
Grasset de costa - Anthus petrosus																										
Cuereta groga - Motacilla flava						vs															1 migr					
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea				1+1				2+1 migr				v+v (migr)					v			v		v		v+1		1
Cuereta blanca - Motacilla alba			v	2+2				v									x10			1+5 migr	3+1 migr	1+2		1+80+/-		v
Troglodytidae																										
Cargolet - Troglodytes troglodytes			x5					c+c										cx4			v			x4	v	c
Prunellidae																										
Pardal de bardissa - Prunella modularis																										
															</											

data	15+9+2003	16+9+2003	18+9+2003	20+9+2003	20+9+2003	24+9+2003	27+9+2003	28+9+2003	3er.	1+10+2003	2+10+2003	4+10+2003	5+10+2003	11+10+2003	11+10+2003	14+10+2003	18+10+2003	20+10+2003	23+10+2003	25+10+2003	30+10+2003	1+11+2003	4+11+2003	8+11+2003	11+11+2003	
Tallarol emmascarat - Sylvia hortensis																										
Tallareta vulgar - Sylvia communis																										
Tallarol gros - Sylvia borin				2																						
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla				x6	vx8						2+2	1+3			2		x80+/-	v	vx20	x12	v+v	x30+/-	v	x20+/-	x4	x10
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli																										
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																										
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita												1+1			v+1		x6			v+1	1	x6		1		v
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus							1		1																	
Reietó - Regulus regulus																									1+1	
Bruel - Regulus ignicapillus				v+v								1	1v		v+1		v				v	v			v+v	v+v
Muscicapidae																										
Papamosques gris - Muscicapa striata												1														
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca									X																	
Paridae																										
Mallerenga cuallarga - Aegithalos caudatus			v	v+10+10		vs		vx3				v+v	v				v+2		vs		vs	v+6	v	v+6	v	x6
Mallerenga emplomallada - Parus cristatus				v+1								v	v				1				v				2	v
Mallerenga petita - Parus ater									X						1+c											
Mallerenga blava - Parus caeruleus						vs											v+v							v		
Mallerenga carbonera - Parus major				x5	v	v		v+v			vs	c	c	c	v+c		c	v	v			v		v	v	v
Certhiidae																										
Raspinell - Certhia brachydactyla				x5	v												c+c			v+v				v+v	1	v
Remizidae																										
Teixidor - Remiz pendulinus																										
Oriolidae																										
Oriol - Oriolus oriolus																										
Laniidae																										
Botxl - Lanius excubitor				v		v		v				1v+v										v				
Capsigrany - Lanius senator									X																	
Corvidae																										
Gaig - Garrulus glandarius					x4							v	v	2	v+1+1				v+1		1v		1	2	v	
Garsa - Pica pica	8+/-	4		3		v						v	v									1	3	1+2	v	2
Gralla - Corvus monedula																										
Corb - Corvus corax			2v																	1						
Sturnidae																										
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris				30+/-	30+/-						7+1						alguns		20+/-		alguns		1		4 migr	alguns
Estornell negre - Sturnus unicolor					2+																			alguns		
Passeridae																										
Pardal - Passer domesticus				alguns	alguns	15+/-											alguns				alguns		alguns		alguns	
Pardal xarrec - Passer montanus						v											2			2		4		v+2		
Pardal roquer - Petronia petronia												1														
Fringillidae																										
Pinsà - Fringilla coelebs							2 migr	2+6 migr				3+4+2+5+2	2	v	x80 migr		vs	x50 migr	400+/- migr	alguns	x80 migr	alguns	x150 migr	alguns	x80+/-	alguns
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																										
Gafarró - Serinus serinus				1+2	4							v+v					1	1+1	10+/-	v		v+v	x20 migr	2+10	x4	v
Verdum - Carduelis chloris					v	vx5												c+2+2		v		x5		v	v	
Cadernera - Carduelis carduelis			v		v	vs												v+2				v+2	v	x20+/-	2	
Lluer - Carduelis spinus																										
Passerell - Carduelis cannabina					v			v+4			v				v+2				100 +/- migr		v+v	v+v	x40 migr	1	v+3	
Trencapinyes - Loxia curvirostra																										
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																										
Durbec - Coccothraustes coccothraustes																										
Embericidae																										
Verderola - Emberiza citrinella																										
Gratapalles - Emberiza cirius				x4	c													c						2+6		
Sit negre - Emberiza cia																										
Hortolà - Emberiza hortulana																										
Repicalalons - Emberiza schoeniclus																										
Cruixidell - Milvina calandra																				v+1		v+v		v+v+50+/-		
Espècies no identificades																										
falcónid sp.							1												1 migr							
rapinyaire sp.						1	1		1		3 migr			1 migr	1 migr						x2 migr	x3 migr		x5 migr		1 migr
TOTAL	6	15	37	32	19	19	4	30		23	32	34	14	37	7	45	13	26	43	32	47	26	45	28	29	

data	16+11+2003	20+11+2003	22+11+2003	29+11+2003	5+12+2003	8+12+2003	11+12+2003	18+12+2003	26+12+2003	28+12+2003	30+12+2003	4rt.
Falciot pàl lid - Apus pallidus												
Coraciiformes												
Blauet - Alcedo atthis	v+1	1		v+1	v+2+1		x4	v+1		v+1+1	v+v+1	
Abellerol - Merops apiaster												
Gaig blau - Coracias garrulus												
Puput - Upupa epops												
Piciformes												
Collort - Jynx torquilla												
Picot verd - Picus viridis												
Passeriformes:												
Alaudidae												
Terrerola vulgar - Calandrella brachydactyla												
Cogullada vulgar - Galerida cristata	v								3			
Cogullada fosca - Galerida theklae												
Cotoliu - Lullula arborea								2+3+8				
Alosa - Alauda arvensis								18				
Hirundinidae												
Oreneta de ribera - Riparia riparia												
Roquerol - Ptyonoprogne rupestris									20+/-		50+/-	X
Oreneta vulgar - Hirundo rustica												
Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica												
Oreneta cuablanca - Delichon urbica												
Motacillidae												
Trobat - Anthus campestris												
Plula dels arbres - Anthus trivialis												
Titella - Anthus pratensis	2+1	v	v+1	v+v	v+v		x4	x20		v+v		
Grasset de muntanya - Anthus spinoletta												
Grasset de costa - Anthus petrosus												
Cuereta groga - Motacilla flava												
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea	v+1			v	v		1	x3				
Cuereta blanca - Motacilla alba	2+1+2	2+1		v+20+/-	x5		x5	2+1+1	1+1	1+1	v+2+2	
Troglodytidae												
Cargolet - Troglodytes troglodytes	v+v	vx3		v	v+v		x13	x8	v	v+v	v	
Prunellidae												
Pardal de bardissa - Prunella modularis	vx4		x4	v+v	x6	v	x5	x6	v	v+2	v	
Turdidae												
Pit-roig - Erithacus rubecula	x30	x25	x15	vx5	x10	v	x57	x20	x4	x4	x20	
Rossinyol - Luscinia megarhynchos												
Cotxa blava - Luscinia svecica												
Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros	1+1	2		1+1	1		x6	x7	1+1	1+4	1	
Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus												X
Bitxac rogenç - Saxicola rubetra												
Bitxac comú - Saxicola torquata							v+1	v+1		1+1		
Còbit gris - Oenanthe oenanthe												
Còbit - Oenanthe hispanica												
Còbit negre - Oenanthe leucura												
Merla roquera - Monticola saxatilis												
Merla blava - Monticola solitarius												
Merla de pit blanc - Turdus torquatus												
Merla - Turdus merula	x10	v+v	vx2		x4	v	x22	x8	x3	x6	1+1	
Griva cerdana - Turdus pilaris												
Tord - Turdus philomelos	x8	x12		1	x10	v	x10	x20	x6	x10	v+v	
Tord ala-roig - Turdus iliacus		v+4v				v+v	v	v+v		v+v	vs	
Griva - Turdus viscivorus	1				3		1	x20		1+2+2		
Sylviidae												
Rossinyol bord - Cettia cetti	x7	x6		c+c	x4	c	x8	x8		cx4	c+v	
Trist - Cisticola juncidis												
Boscaler comú - Locustella luscinioides												
Boscarla d'aigua - Acrocephalus paludicola												
Boscarla dels joncs - Acrocephalus shoenobaenus												
Boscarla menjamosquits - Acrocephalus palustris												
Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpaceus												
Balquer - Acrocephalus arundinaceus												
Bosqueta pàl lida - Hippolais pallida												
Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta												
Tallareta cuallarga - Sylvia undata			vx5									
Tallairol de garriga - Sylvia cantillans												
Tallairol capnegre - Sylvia melanocephala	x4	x4	vx10	v	x10	v	x42	x10	v+v	v+v	v+v	

data	16+11+2003	20+11+2003	22+11+2003	29+11+2003	5+12+2003	8+12+2003	11+12+2003	18+12+2003	26+12+2003	28+12+2003	30+12+2003	4rt.
Tallairol emmascarat - Sylvia hortensis												
Tallareta vulgar - Sylvia communis												
Tallairol gros - Sylvia borin												
Tallairol de casquet - Sylvia atricapilla	x30	x15		v+c	v+v	v	x9	x10	vx4	v		
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli												
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix												
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	v+v		x5	v	1		x6	x8	v+v	2	1	
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus												
Reietó - Regulus regulus							1	1+1				
Bruel - Regulus ignicapillus	v	1					x4	1+1				
Muscicapidae												
Papamosques gris - Muscicapa striata												
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca												X
Paridae												
Mallerenga cuallarga - Aegithalos caudatus	v+v	10+/-		v	v	v	x6	v+6+8	vs	v+8+6	v+v	
Mallerenga emplomallada - Parus cristatus					1		x11	v		v		
Mallerenga petita - Parus ater							c					
Mallerenga blava - Parus caeruleus	1+v	1					x4	x6		v+1		
Mallerenga carbonera - Parus major	v			v	v	v	x7	x4	v	v		
Certhiidae												
Raspinell - Certhia brachydactyla	v				v+v		x12	x6		v		
Remizidae												
Teixidor - Remiz pendulinus		vs					3					
Oriolidae												
Oriol - Oriolus oriolus												
Laniidae												
Botxi - Lanius excubitor			v									
Capsigrany - Lanius senator												
Corvidae												
Galg - Garrulus glandarius							x7	1+4		v		
Garsa - Pica pica	v+2			4	v		v	2+8+4	1+1	1		
Gralla - Corvus monedula												
Corb - Corvus corax			2									X
Sturnidae												
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris	alguns	alguns		alguns			10	alguns		alguns		
Estornell negre - Sturnus unicolor							22	alguns		alguns		
Passeridae												
Pardal - Passer domesticus		alguns		alguns	alguns	alguns	6	alguns		alguns		
Pardal xarrec - Passer montanus	8+/-	1+6			v		3	x4				
Pardal roquer - Petronia petronia												
Fringillidae												
Pinsà - Fringilla coelebs	alguns	alguns	30+/- migr	alguns	alguns	alguns	x89	alguns	alguns	alguns	alguns	
Pinsà mec - Fringilla montifringilla												
Gafarró - Serinus serinus	x10	cx4		v	x4	c	x44	x10+30+/-	v+v	c+c+10	2+2	
Verdum - Carduelis chloris	v+20+/-	v+v		8	v		x10	x15		c+4	1+v	
Cadernera - Carduelis carduelis	5+2	5		v+30+/-	10+/-	v	x14+20	x60	4+v	4+12		
Lluer - Carduelis spinus							2			1		
Passerell - Carduelis cannabina							4	v+1		v+4		
Trencapinyes - Loxia curvirostra												
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula												
Durbec - Coccothraustes coccothraustes								1		1+5		
Embericidae												
Verderola - Emberiza citrinella								2				
Gratapalles - Emberiza cirius	1			1+c			x3	x6				
Sit negre - Emberiza cia								1+2				
Hortolà - Emberiza hortulana												
Repicatalons - Emberiza schoeniclus	x10	2		v			v+v	5		200+/-		
Cruixidell - Milvina calandra				2				c				
Espècies no identificades												
falcóid sp.												
rapinyaire sp.			1									
TOTAL	43	34	14	34	37	22	53	57	23	48	27	