

PARC DEL FOIX

MEMÒRIA ORNITOLÒGICA DEL 2009

Recull de dades i textos a càrrec
de Cisco Guasch, Humbert Salvadó i Xavier Bayer.



sumari

Sortides realitzades durant l'any
Nivell de les aigües a l'embassament
Meteorologia
Acció de l'home sobre el medi
Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix
El programa PERNIS i les migracions postnupcials
Censos d'ocells aquàtics
El programa SOCC
Resum de la campanya d'anellament 2009
Altres activitats
Els ocells del Parc del Foix el 2009
Annex 1 - Observacions d'altres vertebrats

En l'elaboració de la memòria ornitològica del 2009 han participat en alguna sortida i/o han aportat dades les següents persones:

Joan Guash González (JGGF)
Manel Bonilla López (MBLA)
Martí Cardona Melgarejo (MCMF)
Marc Olivé Vázquez (MOVA)
Marc Peris Miras (MPMB)
Josep Guasch Marlès (JGMX)
Rafa Jiménez Rodríguez (RJRA)
Ricard Pintado Almirall (RPAA)
Tomàs Pulido Enrique (TPEX)
Xavier Parra Cuenca (XPCA)

A les quals els agraïm la seva col·laboració.

Entre parèntesi indiquem el codi utilitzat en el text per a cada persona.

Les observacions d'anys anteriors que es citen, apareixen al text seguides entre parèntesi de les inicials de la persona que en el seu moment ens va facilitar les dades: Antonio Somalo Alique (ASA), Daniel Imbernón Vígara (DIVA), Eduardo Fernandez Martín (EFM), Pere Xavier Albornà Rovira (PARA), Pere Mestre Raventós (PMRA), Pedro Torres Expósito (PTEA), Sergi Sales Asensio (SSAA) i Vittorio Pedrochi Rius (VPRA).

Les dades i observacions que no van seguides de cap codi d'inicials, cal atribuir-les a l'equip redactor de la memòria.

* Sortides realitzades durant l'any


Durant aquest any 2009 s'ha fet un total de 123 sortides al Parc del Foix que han suposat un total de 304 hores i 15 minuts. En aquestes 123 sortides s'han recollit un total de 3.868 registres.

A més de les sortides específiques per recollir informació de camp s'han realitzat diferents actuacions per tal de completar la màxima informació sobre les aus del Parc del Foix. Per sisè any s'han realitzat sessions d'anellament; en total s'hi ha participat en 15 jornades. També s'han recollit dades que han estat cedides per diferents col·laboradors (forestals, ornitòlegs, aficionats...). En total, a més dels 3.868 registres d'ocells, se n'han recollit 144 dels col·laboradors i dels anellaments. Així doncs, el total ha estat de 4.012 registres.

1er. trimestre	26 sortides	55 h. 55 min.	gener	8 sortides
			febrer	9 sortides
			març	9 sortides
2on. trimestre	19 sortides	53 h. 40 min.	abril	9 sortides
			maig	5 sortides
			juny	5 sortides
3er. trimestre	44 sortides	109 h. 15 min.	juliol	6 sortides
			agost	12 sortides
			setembre	26 sortides
4rt. trimestre	34 sortides	85 h. 25 min.	octubre	15 sortides
			novembre	10 sortides
			desembre	9 sortides
TOTAL 2009	123 sortides	304 h. 15 min.		

* Nivell de les aigües a l'embassament

El nivell de les aigües de l'embassament s'ha bellugat dins d'uns paràmetres de certa normalitat. La primera meitat de l'any es va mantenir ple i amb l'arribada de l'estiu va començar a baixar una mica. Entre juny i setembre va anar baixant progressivament fins arribar a un metre per sota del nivell màxim. Les pluges de setembre vam fer que es recuperés lleugerament. Entrat l'octubre es va omplir completament i pràcticament s'ha mantingut ple fins a final d'any.



* Meteorologia

El 2009 ha estat un any plujós, però no massa, han caigut un total de 484 litres . El mes de octubre és quan va ploure més. Gener, març, abril, setembre i desembre també han aportat certes pluges. A nivell de temperatures, en general els valors s'han mantingut dins dels paràmetres que calia esperar.

Plugues	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	set.	oct.	nov.	des.
Litres/m ²	56,9	16,1	42,1	78,7	6,5	6,6	18,3	1,1	63,3	122,6	3,9	67,9

Temperatures	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	set.	oct.	nov.	des.
Mitjana °C	7,40	9,06	10,55	13,46	18,9	22,11	24,43	25,17	20,9	17,45	12,96	8,36

* Acció de l'home sobre el medi

Des de la posta en marxa del Parc del Foix s'han produït moltes millores des d'una òptica de conservació i protecció de la natura. També s'ha treballat molt per tal d'informar i conscienciar al públic que visita l'espai natural.

Com en anys anteriors hem seguit anotant accions irregulars que caldria evitar: gossos abandonats, gent pescant en zones d'accés restringit, abocament de deixalles al bosc, quads circulant en zones d'accés tancat (5-2-09) ... a més el 12-2-2009 veiem un cotxe en què el conductor intenta suïcidar-se.

També hem anotat que alguns dissabtes i altres dies hi ha activitats de vol que poden perjudicar l'àliga cuabarrada. En concret el pas de parapents a motor per la zona del niu de l'àliga.



Possiblement a causa que a l'embassament no s'hi caça, els senglars hi han trobat un refugi.



Al riu Foix, prop de l'embassament, s'hi alliberen animals sense cap mena de control.

* Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix

Com en els darrers anys s'ha organitzat un programa d'activitats relacionades amb les migracions d'aus. Per una banda s'ha seguit per dotzè any amb la "Campanya de seguiment de migracions d'aus rapinyaires al Penedès". A més s'han organitzat altres activitats a l'entorn de les migracions d'ocells al Parc del Foix i a l'entorn de la natura. Es va programar un alliberament de rapinyaires al puig de l'Àliga i 4 sessions d'observació de les migracions des del turó de les Tres Partions.

El programa d'activitats ha estat el següent:

12-9-09 – *Observació migracions* - entre 10 i 14 h. al Turó de les Tres Partions.

19-9-09 – *Observació migracions* - entre 10 i 14 h. al Turó de les Tres Partions.

19-9-09 – *Alliberament de rapinyaires* - les 17'30 h. al Puig de l'Àliga.

26-9-09 – *Observació migracions* - entre 10 i 14 h. al Turó de les Tres Partions.


3-10-09 – *Observació migracions* - entre 10 i 14 h. al Turó de les Tres Partions.

Com en anys anteriors la jornada d'alliberament d'aus rapinyaires va ser un èxit de públic. L'assistència va ser molt nombrosa, des de mainada fins a gent gran. Es va alliberar un xoriguer procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. La resta d'activitats van comptar amb menor assistència. Entre el públic assistent al conjunt d'aquestes activitats hi va haver sobretot gent de les comarques del Penedès (Baix Penedès, Alt Penedès i Garraf) i també del Barcelonès, el Vallès i el Baix Llobregat.

* El programa PERNIS i les migracions postnupcials

Per setè any consecutiu s'ha dut a terme aquest programa al nostre país. Es tracta d'un programa de seguiment de les migracions d'aus rapinyaires a la tardor. Des del Parc del Foix també s'hi ha participat. El programa pretén crear una xarxa de seguiment de la migració de rapinyaires a Catalunya. Es coordina des de l'ICO. L'objectiu és conèixer les característiques del pas postnupcial, determinar les rutes migratòries i les tendències poblacionals al llarg dels anys. Es fan un total de 10 censos en sessions de 4 hores; de les 10 del matí a les 14 del migdia. Les sessions són setmanals i preferiblement cal fer-les en dissabte (o en tot cas entre divendres i dilluns).

En els quadres següents hi ha un resum de les observacions realitzades en el programa Pernis i també s'hi resumeixen les recollides en altres dates. En total han estat 265 els ocells rapinyaires i planadors migrants que s'han vist el 2009.



RESUM 2009	lloc	data	hores	espècies	exempl.
PERNIS 1	Turó de les Tres Partions	15 / 8	4:00	5	11
PERNIS 2	Turó de les Tres Partions	22 / 8	4:00	3	3
PERNIS 3	Turó de les Tres Partions	29 / 8	4:00	4	10
	Turó de les Tres Partions	1 / 9	3:40	1	1
PERNIS 4	Turó de les Tres Partions	4 / 9	5:45	5	23
	Turó de les Tres Partions	8 / 9	2:00	1	1
	Turó de les Tres Partions	11 / 9	1:25	2	2
PERNIS 5	Turó de les Tres Partions	12 / 9	4:00	5	40
	Turó de les Tres Partions	16 / 9	2:20	3	3
PERNIS 6	Turó de les Tres Partions	19 / 9	4:00	7	12
ALL. RAP.	Puig de l'Àliga	19 / 9	1:30	0	0
	Turó de les Tres Partions	21 / 9	1:20	0	0
	Turó de les Tres Partions	24 / 9	2:05	8	48
PERNIS 7	Turó de les Tres Partions	26 / 9	4:00	5	21
	Turó de les Tres Partions	27 / 9	1:00	3	4
	Turó de les Tres Partions	29 / 9	2:00	4	13
	Turó de les Tres Partions	30 / 9	1:40	2	3
PERNIS 8	Turó de les Tres Partions	3 / 10	4:10	6	12
	Turó de les Tres Partions	6 / 10	2:00	2	2
PERNIS 9	Turó de les Tres Partions	10 / 10	4:00	5	11
PERNIS 10	Turó de les Tres Partions	18 / 10	4:00	4	5
PERNIS amp.	Turó de les Tres Partions	24 / 10	4:00	3	9
	Altres observacions puntuals	vàries	-	5	31
TOTALS		21 dies	65:25	20 (diferents)	265

* Censos d'ocells aquàtics

Els resultats obtinguts durant el seguiment de les aus aquàtiques durant el període de tardor del 2007 fins a desembre de 2008 van ser molt satisfactoris. Es va implementar una metodologia que dóna més rigor als treballs estadístics, i ens ofereix d'una manera senzilla el potencial de l'embassament com a punt de nidificació, hivernada i migració dels ocells aquàtics. Durant l'any 2009 ens hem proposat continuar el treball iniciat per tal de donar més robustesa als primers resultats ja obtinguts el 2007 i 2008. Aquests censos amb el pas dels anys ens poden permetre de contrastar unes dades i resultats de gran interès sobre l'evolució de l'espai natural. De manera comparativa ens donen una nova eina per la gestió del Parc.

La metodologia es va fixar el 2007. Des d'aleshores realitzem uns censos quinzenals d'ocells aquàtics de l'embassament. Al llarg de tot l'any 2009 s'han seguit realitzant aquests censos. En total doncs, han estat 24 censos, un per a cada quinzena de l'any 2009. En aquests censos se segueix una metodologia molt estricta, en la qual s'han establert vuit estacions (en punts fixes i en petits recorreguts) que permeten controlar la pràctica totalitat de l'embassament. S'ha elaborat una fitxa de recollida de dades per als censos, s'han fixat uns horaris i per a cadascuna de les estacions hi ha establert un temps d'observació de 12 minuts.

De les aus indicadores previstes en la fitxa patró s'han recollit observacions d'un total de 23 espècies. En concret les següents: *Anas platyrhynchos*, *Tachybaptus ruficollis*, *Phalacrocorax carbo*, *Egretta garzetta*, *Ardea cinerea*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Charadrius dubius*, *Tringa ochropus*, *Actitis hypoleucos*, *Larus ridibundus*, *Alcedo atthis*, *Motacilla cinerea*, *Motacilla alba*, *Cettia cetti*, *Cisticola juncidis*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Phylloscopus collybita*, *Remiz pendulinus* i *Emberiza schoeniclus*.

A més, durant alguns dels mostreigs també s'han observat 15 espècies d'ocells aquàtics de presència poc habitual o més escassa. Aquest és el cas de *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Podiceps cristatus* i *Porphyrio porphyrio*, que també s'observaren el 2008, a més aquest any s'observa a *Chlidonias niger* entre d'altres espècies.

La següent taula mostra els resultats de les espècies indicadores i ocasionals d'ambients aquàtics de cada estació en les 24 visites que s'han realitzat seguint la metodologia establerta.

2009	Estació 1	Estació 2	Estació 3	Estació 4	Estació 5	Estació 6	Estació 7	Estació 8	Total Pantà
	Aguait	Paret	Canyissar	Caseta	Marina	Presa	F. Alzina	Gual	
	nº ind.								
	valors mitjans								
<i>Anas platyrhynchos</i>	10,63	5,96	1,33	1,71	14,04	5,46	0,88	0,50	40,500
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	0,83	0,25	0,17	0,96	1,71	0,88	0,96	0,04	5,792
<i>Phalacrocorax carbo</i>	4,79	196,42	0,25	9,92	7,04	1,38	0,17	0,04	220,000
<i>Egretta garzetta</i>	0,67	0,88	0,00	0,71	0,71	0,21	0,29	1,50	4,958
<i>Ardea cinerea</i>	2,42	4,00	0,54	5,83	4,42	2,08	0,54	0,38	20,208
<i>Circus aeruginosus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Pandion haliaetus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<i>Rallus aquaticus</i>	0,79	0,04	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,333
<i>Gallinula chloropus</i>	7,58	3,00	2,21	1,63	3,17	1,33	2,13	1,13	22,167
<i>Fulica atra</i>	2,50	0,96	0,08	1,00	3,29	1,42	0,04	0,04	9,333
<i>Charadrius dubius</i>	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,333
<i>Tringa ochropus</i>	0,04	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,375
<i>Actitis hypoleucos</i>	0,54	0,17	0,00	0,42	0,08	0,21	0,00	0,04	1,458
<i>Larus ridibundus</i>	0,50	2,25	0,00	1,88	1,38	2,71	0,00	0,00	8,708
<i>Alcedo atthis</i>	0,38	0,83	0,08	0,42	0,83	0,25	0,54	0,21	3,542
<i>Motacilla cinerea</i>	0,04	0,04	0,00	0,00	0,08	0,08	0,04	0,25	0,542
<i>Motacilla alba</i>	1,04	1,50	0,50	0,75	1,83	2,58	0,63	1,42	10,250
<i>Luscinia svecica</i>	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083
<i>Cettia cetti</i>	5,17	5,33	5,17	2,46	3,13	1,67	2,04	3,21	28,167
<i>Cisticola juncidis</i>	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,417
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	0,38	0,21	1,17	0,00	0,13	0,00	0,33	0,46	2,667
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	0,29	0,33	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,750
<i>Phylloscopus collybita</i>	0,42	1,00	0,67	0,33	0,88	0,58	1,67	1,54	7,083
<i>Remiz pendulinus</i>	0,71	0,25	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,167
<i>Emberiza schoeniclus</i>	0,13	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,208
espècies ocasionals									
<i>Anas clypeata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,083
<i>Anas crecca</i>	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083
<i>Ardea purpurea</i>	0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,125
<i>Ardeola ralloides</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,042
<i>Bubulcus ibis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,042
<i>Chlidonias niger</i>	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,042
<i>Gallinago gallinago</i>	0,08	0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,208
<i>Himantopus himantopus</i>	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,167
<i>Ixobrychus minutus</i>	0,08	0,13	0,04	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,375
<i>Larus melanocephalus</i>	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,042
<i>Lymnocyrtes minimus</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,083
<i>Motacilla flava</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,083
<i>Nycticorax nycticorax</i>	0,29	0,21	0,00	0,17	0,08	0,00	0,04	0,46	1,250
<i>Podiceps cristatus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,042
<i>Porphyrio porphyrio</i>	0,08	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,250

Aquests resultats ens mostren que les estacions de la cua de l'embassament tenen un alt interès, ja que hi ha espècies que tan sols s'observen en aquesta zona, com per exemple *Porphyrio porphyrio*, *Gallinago gallinago*, *Lymnocyrtus minimus*, *Cisticola juncidis*, i *Remiz pendulinus*.

Per altra banda cal fer esment de l'espècie que apareix amb major quantitat, i es tracta de l'hivernant *Phalacrocorax carbo*. Mentre que com el 2008 entre les espècies que s'observen en un major nombre d'estacions i de manera més uniforme hi ha *Gallinula chloropus*, *Motacilla alba* i *Cettia cetti*, que són les primeres espècies que colonitzen els ambients aquàtics a les comarques que hi ha als entorns de l'embassament del Foix. També s'observen a totes les estacions però amb menys regularitat *Anas*


platyrhynchos, *Tachybaptus ruficollis*, *Ardea cinerea*, *Fulica atra* i *Alcedo atthis*. Per una altra banda *Nycticorax nycticorax* s'observa de manera força regular, motiu pel qual es podria incloure dins les espècies indicadores. Una altra espècie que mereix ser mencionada és *Egretta garzetta*, que podem dir que s'observa en gairebé totes les estacions, però ni el 2008 ni el 2009 s'observa a l'estació 3. En canvi, sí que s'allotja a prop quan observem aquesta estació des d'un altre punt de l'embassament. Així doncs, que alertat per la nostra presència o bé roman amagat o bé fuig de manera sigil·losa. La taula següent mostra els càlculs de manera conjunta per a cada estació de l'abundància i la riquesa d'espècies en el període gener-desembre 2009. Finalment de manera global per a cada estació s'ha considerat el nombre d'individus de les aus aquàtiques promig, el nombre d'espècies i l'índex de diversitat de Shannon.

2009	Estació 1	Estació 2	Estació 3	Estació 4	Estació 5	Estació 6	Estació 7	Estació 8	Total
	Aguait	Paret	Canyissar	Caseta	Marina	Presa	F. Alzina	Gual	Pantà
	41,1	224,7	13,2	28,3	43,0	21,0	10,3	11,3	393,0
Nº d'individus promig	41,1	224,7	13,2	28,3	43,0	21,0	10,3	11,3	393,0
Nº ind màxim	90,0	1419,0	28,0	66,0	134,0	49,0	19,0	35,0	1632,0
Nº ind mínim	15,0	13,0	4,0	11,0	19,0	5,0	4,0	1,0	106,0
Nº d'espècies total	29,0	28,0	19,0	16,0	21,0	16,0	15,0	17,0	38,0
Nº d'espècies promig	9,6	8,6	4,6	6,9	8,5	6,7	5,2	4,4	15,0
Nº d'espècies màxim	12	13	10	11	11	10	7	7	18
Nº d'espècies mínim	6	5	2	3	5	3	3	1	12
Index diversitat Shannon H									
Valor promig	2,3	1,7	1,7	2,0	2,1	2,0	1,9	1,7	2,3
Desviació standard	0,40	0,99	0,65	0,52	0,52	0,52	0,41	0,62	0,74
Valor màxim	2,9	2,8	2,8	2,6	2,8	2,8	2,6	2,5	3,2
Valor mínim	1,4	0,1	0,3	0,7	0,8	0,5	1,3	0,1	0,7


Els resultats són molt semblants als del període desembre 2007- novembre 2008. El nombre total de 38 espècies aquàtiques creiem que és rellevant ja que l'embassament del Foix és l'única zona humida important de les comarques del Penedès. Concretament a la primera estació, situada a l'aguait és on s'hi ha observat fins a 29 espècies. Els resultats mostren que aquesta estació està ben localitzada, essent el punt de major interès per a les espècies aquàtiques ja que és l'única estació on s'hi ha observat totes les espècies indicadores proposades. A l'aguait els valors del número d'espècies promig i de l'índex de diversitat assoleixen valors més alts que no pas en altres estacions.

En relació al número d'individus promig, el resultat de 393 és molt i significativament superior al període anterior on el promig ja considerat alt era de 334,2 individus per cens total. Com en el període anterior cal considerar un cert biaix a causa de l'elevat nombre de *Phalacrocorax carbo* que hivernen a l'embassament, que aquest fou superior a inicis d'any (gener-març 2009), però és clarament inferior a l'inci de l'hivern 2009-2010. Aquest patró és similar al del període desembre 2007-novembre 2008. De manera que els hivernants no s'hi estableixen fins ben entrat l'hivern.


Les figures següents ens mostren les dinàmiques al llarg del període d'estudi. Hi podem veure com l'evolució és afectada per un fort component estacional. Per tant el paper de l'embassament assoleix una major rellevància a les èpoques de pas i en especial durant l'hivern. Així doncs, a l'època de reproducció de les aus és quan s'assoleixen els valors més baixos d'individus. El nombre d'espècies és lleugerament més regular i elevat que el període anterior, s'obtenen dos màxims situats en ple període de pas abril i setembre, que juntament amb l'índex de diversitat que ens mostra uns màxims a les èpoques de pas prenupcial i postnupcial. Tot plegat ens confirma un cop més l'interès de l'embassament per les aus migratòries aquàtiques.



Evolució de l'abundància de les aus aquàtiques



Evolució del nombre d'espècies d'aus aquàtiques



Evolució de l'índex de diversitat de les aus aquàtiques

*** El programa SOCC**

El SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya) és un programa de seguiment d'avifauna de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). Aquest programa compta amb el suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del SOCC és conèixer les tendències temporals que es produeixen en l'abundància dels ocells comuns a Catalunya, factor essencial per poder determinar l'estat de conservació de les diferents espècies d'ocells i dels seus hàbitats. Es tracta d'un programa de seguiment continu, que requereix un esforç reduït (quatre matins per any) però mantingut any rera any.

El SOCC es basa en el transecte com a mètode per obtenir índexs d'abundància de les diferents espècies d'ocells. Arreu de Catalunya se segueixen unes pautes comunes per tal que les dades es puguin comparar al llarg dels anys. Els transectes han de mesurar aproximadament uns 3 quilòmetres, i han d'estar dividits en 6 seccions de longituds similars. S'han de realitzar al matí, entre la sortida del sol i les quatre hores següents, cada vegada que es fa l'itinerari s'hi ha d'invertir entre dues i dues hores i mitja. Els 4 censos que es fan cada any han de programar-se de la següent manera: dos censos hivernals; un al gener i un al desembre, i dos censos en època de nidificació; el primer entre el 15 d'abril i el 15 de maig, i el segon entre el 15 de maig i el 15 de juny. A l'hora de fer els censos cal que hi hagi unes determinades condicions meteorològiques favorables, si no s'ha d'esperar a un altre dia.

Aquest és el vuitè any que participem en el programa SOCC, amb un transecte que transcorre per l'interior del Parc del Foix. D'entre les categories establertes des de l'ICO es participa en la de "mostreig en ambients mediterranis". El recorregut té el seu inici a cal Bladet i passa per cal Semison. Transcorre per diferents ambients naturals entre els quals hi ha la pineda, la brolla i els conreus. L'itinerari es realitza per partida doble, hi participen dos ornitòlegs. El 2009 les dates en què s'ha realitzat l'activitat són:

- 1er cens SOCC època hivernal – 12-1-2009 i 26-1-2009
- 1er cens SOCC època de nidificació – 21-4-2009 - 27-4-2009
- 2n cens SOCC època de nidificació – 19-5-2009 - 3-6-2009
- 2n cens SOCC època hivernal – 18-12-2009 - 27-12-2009

* Resum de la campanya d'anellament 2009 - amb dades de Manel Bonilla i Marc Olivé (ICO)

Aquest any s'han seguit realitzant tasques d'anellament científic d'ocells. De la mateixa manera que l'any passat s'ha actuat a dos punts diferents; als canyissars de la cua de l'embassament i a la riera de Marmellar. S'han fet un total 571 captures; 527 primeres captures, 43 controls (recaptures d'ocells anellats al pantà) i una recuperació. En total han estat 25 les espècies capturades i alliberades.

ESPÈCIE	M.O. 5-4	M.B. 24-4	M.B. 25-4	M.B. 5-9	M.B. 6-9	M.O. 6-9	M.O. 7-9	M.O. 11-9	M.O. 21-9	M.O. 24-9	M.O. 27-9	M.O. 28-9	M.O. 4-10	M.O. 5-10	M.B. 10-10	TOTAL
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>						1				1						2
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>				12	10	5	8	6	4	2	1	5		1	1	55
<i>Aegithalos caudatus</i>		2			2		6							12		22
<i>Carduelis carduelis</i>						2										2
<i>Carduelis chloris</i>										1						1
<i>Cettia cetti</i>	2	1	1	6	6	6	9	5	6	3	3	6	1	5	5	65
<i>Certhia brachydactyla</i>			1	1												2
<i>Erithacus rubecula</i>		1	1		1	1					1		2	3	3	13
<i>Ficedula hypoleuca</i>			3	2	3		1									9
<i>Hirundo rustica</i>					1			105	77	10			1			194
<i>Luscinia megarhynchos</i>		1	1	1	1											4
<i>Luscinia svecica</i>							1									1
<i>Parus caeruleus</i>				1		1						1				3
<i>Parus major</i>	2	1	2				2								1	8
<i>Passer domesticus</i>												1				1
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>					1											1
<i>Phylloscopus collybita</i>	2												1	2		5
<i>Phylloscopus trochilus</i>		1	1	2	1	4		1			1					11
<i>Riparia riparia</i>									2							2
<i>Serinus serinus</i>	1		2													3
<i>Sylvia atricapilla</i>	1		1	2		2	3	1	3	11	7	13	9	13	5	71
<i>Sylvia borin</i>				4	7	2	5		1					1		20
<i>Sylvia melanocephala</i>		4	1	3	1		1							1		11
<i>Turdus merula</i>	2		4	1	7							4	1	1		20
<i>Turdus philomelos</i>			1													1
TOTAL	10	11	19	35	41	24	36	118	93	28	13	30	15	39	15	527
RECUPERACIONS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CONTROLS	1	2	4	0	2	1	4	5	2	1	2	3	5	8	3	43
BAIXES (NO ANELLADES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPTURES TOTALS	11	13	23	35	43	25	40	124	95	29	15	33	20	47	18	571

En el mapa següent hi podem veure els recorreguts de les recuperacions realitzades al llarg dels darrers anys i la taula ens aporta les dades. S'hi han actualitzat les informacions rebudes corresponents a dades d'anys anteriors.



RECUPERACIONS ESTRANGERES									
N	Anella	Espècie	Data	Dies	Lloc d'anellament/recuperació	Coordenades	Km	Direcció	Remitent
1	1EK10606	<i>Emberiza schoeniclus</i>	13/09/2003 04/03/2004	173	Hötjäm, Grängesberg, Kopparberg, SUÈCIA Pantà del Foix, Castellet i la Gornal	60°03'N-14°58'E 41°16'N-1°38'E	2279	210° SO	RIKSMUSEUM STOCKHOLM
2	ZB44576	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	28/08/2005		Pantà del Foix, Castellet i la Gornal	41°16'N-1°38'E			HIDDENSEE GERMANIA
3	3942972	<i>Remiz pendulinus</i>	08/10/2005 21/11/2005	44	Grand-Large, Decines-Charpieu, Rhône, FRANÇA Pantà del Foix, Castellet i la Gornal	45°46'N-4°57'E 41°16'N-1°38'E	567	209° SW	MUSEUM PARIS
4	BA174459	<i>Emberiza schoeniclus</i>	30/10/2005 07/12/2005	38	Kolansko Blato, Northern Croatian Coast, CROÀCIA Pantà del Foix, Castellet i la Gornal	44°30'N-14°58'E 41°16'N-1°38'E	1142	256° O	ORNIT. INST. ZAGREB YU
5	CZ03329	<i>Emberiza schoeniclus</i>	07/10/2005 15/12/2005	69	Lustenau, Vorarlberg, ÀUSTRIA Pantà del Foix, Castellet i la Gornal	47°26'N-9°39'E 41°16'N-1°38'E	935	226° OSO	RADOLFZELL GERMANIA
6	LA77134	<i>Emberiza schoeniclus</i>	03/11/2006 28/01/2007	86	C.M.Te. Capriolo, Bra, Cuneo, ITÀLIA Pantà del Foix, Castellet i la Gornal	44°40'N-7°50'E 41°16'N-1°38'E	630	235° OSO	INFS OZZANO BO ITALY
7	10425532	<i>Hirundo rustica</i>	11/09/2009		Pantà del Foix, Castellet i la Gornal	41°16'N-1°38'E			MUS.SC.NAT 1000 BRUSSELS
RECUPERACIONS A L'ESTRANGER									
N	Anella	Espècie	Data	Dies	Lloc d'anellament/recuperació	Coordenades	Km	Direcció	Remitent
1	L936424	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	10/09/2004 06/08/2005	330	Pantà de Foix, Castellet i la Gornal Vrhnika, ESLOVÈNIA	41°16'N-1°38'E 45°58'N-14°18'E	1143	59° ENE	MIN.MED.AMB. ICONA MADRID
2	N205984	<i>Emberiza schoeniclus</i>	15/03/2005 19/10/2005	218	Pantà de Foix, Castellet i la Gornal Canton Magistris, Verbania, Area Alpina, ITÀLIA	41°16'N-1°38'E 45°56'N-8°30'E	757	44° NE	MIN.MED.AMB. ICONA MADRID
3	N367099	<i>Emberiza schoeniclus</i>	30/12/2005 07/03/2007	432	Pantà de Foix, Castellet i la Gornal Lemainville, Meurthe-et-Moselle, FRANÇA	41°16'N-1°38'E 48°30'N-6°11'E	880	22° NNE	MIN.MED.AMB. ICONA MADRID
4	N311212	<i>Sylvia borin</i>	01/09/2005 06/05/2007	612	Pantà de Foix, Castellet i la Gornal Capannelle, Bergamo, ITÀLIA	41°16'N-1°38'E 45°38'N-9°42'E	811	51° ENE	MIN.MED.AMB. ICONA MADRID
5	N265700	<i>Emberiza schoeniclus</i>	07/12/2005 04/11/2008	1063	Pantà de Foix, Castellet i la Gornal Allaman, Vaud, SUÏSSA	41°16'N-1°38'E 46°28'N-6°23'E	693	32° NE	MIN.MED.AMB. ICONA MADRID
6	N204805	<i>Emberiza schoeniclus</i>	05/12/2004 31/07/2009	1699	Pantà de Foix, Castellet i la Gornal Dobroměřice, Ústecký, REPÚBLICA TXECA	41°16'N-1°38'E 50°22'N-13°47'E	1378	39° NE	MIN.MED.AMB. ICONA MADRID
RECUPERACIONS CATALUNYA / PAÍS VALENCIÀ									
N	Anella	Espècie	Data	Dies	Lloc d'anellament/recuperació	Coordenades	Km	Direcció	Remitent
1	755342	<i>Hirundo rustica</i>	14/09/2003 26/08/2005	712	Riu Vinalopó, Aspe, PAÍS VALENCIÀ Pantà de Foix, Castellet i la Gornal	38°19'N-0°47'O 41°16'N-1°38'E	387	31° NE	MIN.AGRIC. ICONA-MADRID
2	N367083	<i>Emberiza schoeniclus</i>	30/12/2005 11/11/2006	316	Pantà del Foix, Castellet i la Gornal Estany d'Ivars, Ivars d'Urgell	41°16'N-1°38'E 41°41'N-0°58'E	72	310°N O	MIN.MED.AMB. ICONA MADRID
3	N367165	<i>Emberiza schoeniclus</i>	12/01/2006 29/12/2006	351	Pantà de Foix, Castellet i la Gornal Ca l'Arana, el Prat de Llobregat	41°16'N-1°38'E 41°18'N-2°08'E	42		MIN.MED.AMB. ICONA MADRID

* Altres activitats

1- A principis d'any, (l'hivern 2008-2009) es va participar en la recollida de dades per a l'atles dels ocells hivernants de Catalunya a les quadrícules UTM 10x10 CF86 i CF87. Així doncs totes les dades recollides durant aquest hivern al Parc del Foix seran usades per a l'elaboració de l'esmentat atlas.

2- S'ha enllestit un treball sobre la fauna vertebrada del Parc del Foix a petició de la fundació "Catalunya i territori". En aquests moments s'està preparant el treball per a la seva publicació.

3- S'ha participat en l'elaboració de dos reportatges de natura. El primer tracta sobre el "corb marí gros" i ha estat enregistrat en bona part al mateix embassament del Foix durant els primers mesos del 2009. El segon reportatge és sobre "Anellament científic d'aus" i ha estat enregistrat l'abril d'aquest 2009 a la zona de la riera de Marmellar i la Timba. Una còpia dels dos reportatges ha estat entregada al Parc del Foix per si es vol posar al web de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

4- Alguns dels reportatges de natura i fauna realitzats els anys anteriors han estat projectats per Televisió de Catalunya a través del CANAL 33. En concret s'hi han pogut veure els següents reportatges: "El Molí del Foix", "La plana Morta", "El programa Pernis" i "El Parc del Foix". Per altra banda des de la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona se segueixen podent veure els reportatges: "El Molí del Foix", "La plana Morta", "El Parc del Foix", "L'aguait del Parc del Foix", "El programa Pernis" i "Alliberament de rapinyaires".

* Els ocells del Parc del Foix el 2009

Aquest any s'han arribat a observar un total de 160 espècies d'ocells diferents. Per altra banda el total acumulat d'espècies que tenim recollides al llarg dels darrers 50-60 anys al Parc del Foix ha quedat en 245. Destaquem el control per primera vegada al Parc del Foix segons els nostres arxius de les següents aus.

1er. Trimestre

2on. Trimestre

Mosquiter ibèric (*Philloscopus ibericus*)

3er. Trimestre

4rt. Trimestre

Àliga cridanera (*Aquila clanga*)

Aquest any hi ha hagut l'observació de dues noves espècies per al Parc del Foix. En primer lloc hem de destacar l'observació del **mosquiter ibèric** (*Philloscopus ibericus*), es tracta d'una espècie descrita recentment i que resulta força difícil d'identificar. Tan sols el cant o algunes mesures morfològiques permeten diferenciar-lo d'altres espècies de mosqueters. Finalment l'**àliga cridanera** (*Aquila clanga*) és una veritable raresa, tant a nivell del Parc del Foix com a nivell de Catalunya. L'observació del mes d'octubre es va realitzar des del Turó de les Tres Partions.

Entre les citacions més interessants ens cal destacar l'observació d'una **guatlla** (*Coturnix coturnix*) durant el pas postnupcial. Feia molts anys que no s'observava al Parc aquesta au que ha estat clarament perjudicada pels canvis que s'han produït en l'agricultura a la comarca. La **grua** (*Grus grus*) ha estat una altra de les aus citades que cal destacar del 2009. És una espècie migradora que no es cita gaire sovint. Se'n va observar un estol de 26 exemplars en pas prop de la Casa Alta. La **polla blava** (*Porphyrio porphyrio*), que fins fa ben poc era una au que no estava citada al Parc, s'ha vist de forma força regular al llarg de diferents mesos de l'any, tal i com ja va passar el 2008. Una altra au de la qual es disposa de molt pocs registres és el **becadell sord** (*Lymnocyptes minimus*), es va tornar a veure a la cua de l'embassament.

A nivell d'ocells reproductors hem d'esmentar els possibles intents de cria de dues aus que fa uns anys que han deixat de criar al Parc del Foix i que aquest 2009 ho han tornat a provar. Ens referim al **roquerol** (*Ptyonoprogne rupestris*) i al **corb** (*Corvus corax*). Caldrà seguir-los l'any vinent per confirmar la seva recuperació com a nidificants.

Durant les jornades dedicades a l'observació del pas migratori postnupcial es van realitzar observacions interessants. Malgrat que el pas de rapinyaires aquest 2009 ha estat molt fluix, s'han vist algunes

espècies escasses com són el **milà negre** (*Milvus migrans*), el **milà reial** (*Milvus milvus*), l'**esparver cendrós** (*Circus pygargus*), el **falcó cama-roig** (*Falco vespertinus*) i el **falcó de la reina** (*Falco eleonora*).

Altres espècies que ens han proporcionat citacions rellevants per la seva raresa, o per l'excelsitud de les dates en què s'han observat són: el **territ menut** (*Calidris minuta*), la **gavina capnegra** (*Larus melanocephalus*), la **merla de pit blanc** (*Turdus torquatus*), la **cotxa blava** (*Luscinia svecica*) i el **boscaler pintat gros** (*Locustella naevia*).

A l'hora d'omplir les taules sobre fenologia, migració, tendències poblacionals, etc... s'han tingut en compte fonamentalment les dades recollides al llarg dels darrers quinze anys (en el cas que les dades de referència fossin anteriors s'ha fet constar). A la fenologia de les espècies exòtiques s'hi ha posat l'abreviatura "exo" en l'apartat de divagant, atès que per ara no es poden considerar de cap altre apartat.



Guatlla aturada a un camí, estava mullada a causa de la pluja (foto esquerra). Martinet menut (foto dreta)

NOMBRE D'OBSERVACIONS I PERCENTATGES DURANT EL 2009						
	Total observacions	Percentatge d'observacions				
		respecte sortides efectuades en cada període				
		any 2009	gener a març	abril a juny	juliol a setembre	octubre a desembre
Xarxet - Anas crecca	5	4,1%	0,0%	0,0%	6,8%	5,9%
Ànec collverd - Anas platyrhynchos	74	60,2%	84,6%	78,9%	52,3%	41,2%
Ànec cullerot - Anas clypeata	4	3,3%	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Perdiu roja - Alectoris rufa	9	7,3%	7,7%	0,0%	9,1%	8,8%
Guatlla - Coturnix coturnix	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Cabusset - Tachybaptus ruficollis	46	37,4%	57,7%	36,8%	22,7%	41,2%
Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus	2	1,6%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo	51	41,5%	73,1%	36,8%	18,2%	50,0%
Martinet menut - Ixobrychus minutus	7	5,7%	0,0%	21,1%	6,8%	0,0%
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax	24	19,5%	7,7%	68,4%	18,2%	2,9%
Martinet ros - Ardeola ralloides	2	1,6%	0,0%	10,5%	0,0%	0,0%
Esplugabous - Bubulcus ibis	1	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Martinet blanc - Egretta garzetta	50	40,7%	57,7%	31,6%	45,5%	26,5%
Agró blanc - Casmerodius albus	3	2,4%	0,0%	0,0%	6,8%	0,0%
Bernat pescaire - Ardea cinerea	72	58,5%	76,9%	84,2%	50,0%	41,2%
Agró roig - Ardea purpurea	3	2,4%	0,0%	15,8%	0,0%	0,0%
Aligot vesper - Pernis apivorus	10	8,1%	0,0%	0,0%	20,5%	2,9%
Milà negre - Milvus migrans	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Milà reial - Milvus milvus	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Àliga marcenca - Circaetus gallicus	10	8,1%	0,0%	21,1%	11,4%	2,9%
Arpella vulgar - Circus aeruginosus	8	6,5%	0,0%	10,5%	11,4%	2,9%
Arpella pal·lida - Circus cyaneus	2	1,6%	3,8%	0,0%	0,0%	2,9%
Esparver cendrós - Circus pygargus	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Astor - Accipiter gentilis	5	4,1%	7,7%	5,3%	4,5%	0,0%
Esparver vulgar - Accipiter nisus	32	26,0%	23,1%	0,0%	31,8%	35,3%
Aligot comú - Buteo buteo	19	15,4%	34,6%	10,5%	6,8%	14,7%
Àliga cridanera - Aquila clanga	1	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Àliga calçada - Hieraetus pennatus	5	4,1%	3,8%	0,0%	6,8%	2,9%
Àliga cuabarrada - Hieraetus fasciatus	10	8,1%	11,5%	0,0%	11,4%	5,9%
Àliga pescadora - Pandion haliaetus	5	4,1%	0,0%	0,0%	11,4%	0,0%
Xoriguer comú - Falco tinnunculus	49	39,8%	50,0%	36,8%	36,4%	38,2%
Falcó cama-roig - Falco vespertinus	1	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Falcó mostatxut - Falco subbuteo	11	8,9%	0,0%	5,3%	18,2%	5,9%
Falcó de la reina - Falco eleonorae	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Falcó pelegrí - Falco peregrinus	3	2,4%	3,8%	0,0%	4,5%	0,0%
Rascló - Rallus aquaticus	26	21,1%	50,0%	0,0%	6,8%	29,4%
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	70	56,9%	73,1%	73,7%	52,3%	41,2%
Polla blava - Porphyrio porphyrio	5	4,1%	3,8%	5,3%	6,8%	0,0%
Fotja - Fulica atra	53	43,1%	69,2%	63,2%	31,8%	26,5%
Grua - Grus grus	1	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Cames llargues - Himantopus himantopus	3	2,4%	0,0%	15,8%	0,0%	0,0%
Corriol petit - Charadrius dubius	15	12,2%	3,8%	0,0%	31,8%	0,0%
Fredulega - Vanellus vanellus	4	3,3%	11,5%	0,0%	0,0%	2,9%
Territ menut - Calidris minuta	2	1,6%	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%
Becadell sord - Lymnocyptes minimus	1	0,8%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Becadell comú - Gallinago gallinago	4	3,3%	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Becada - Scolopax rusticola	3	2,4%	3,8%	0,0%	0,0%	5,9%
Gamba verda - Tringa nebularia	3	2,4%	0,0%	5,3%	4,5%	0,0%
Xivita - Tringa ochropus	20	16,3%	3,8%	0,0%	40,9%	2,9%
Xivitona - Actitis hypoleucos	22	17,9%	0,0%	26,3%	38,6%	0,0%
Gavina capnegra - Larus melanocephalus	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Gavina vulgar - Larus ridibundus	42	34,1%	53,8%	10,5%	45,5%	17,6%
Gavià argentat - Larus michaellis	2	1,6%	3,8%	5,3%	0,0%	0,0%
Fumarell carablanc - Chlidonias hybrida	3	2,4%	0,0%	0,0%	6,8%	0,0%
Fumarell negre - Chlidonias niger	2	1,6%	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%
Colom roquer - Columba livia	17	13,8%	15,4%	5,3%	18,2%	11,8%
Xixella - Columba oenas	4	3,3%	7,7%	0,0%	4,5%	0,0%

Tudó - Columba palumbus	102	82,9%	84,6%	94,7%	79,5%	79,4%
Tórtora turca - Streptopelia decaocto	15	12,2%	15,4%	15,8%	9,1%	11,8%
Tórtora - Streptopelia turtur	13	10,6%	0,0%	31,6%	13,6%	2,9%
Cucut reial - Clamator glandarius	2	1,6%	3,8%	5,3%	0,0%	0,0%
Cucut - Cuculus canorus	8	6,5%	0,0%	42,1%	0,0%	0,0%
Xot - Otus scops	2	1,6%	0,0%	10,5%	0,0%	0,0%
Duc - Bubo bubo	1	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Mussol comú - Athene noctua	11	8,9%	0,0%	15,8%	13,6%	5,9%
Gamarús - Strix aluco	2	1,6%	0,0%	0,0%	2,3%	2,9%
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus	3	2,4%	0,0%	10,5%	2,3%	0,0%
Siboc - Caprimulgus ruficollis	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Ballester - Apus melba	20	16,3%	3,8%	21,1%	27,3%	8,8%
Falciot negre - Apus apus	27	22,0%	0,0%	89,5%	22,7%	0,0%
Blauet - Alcedo atthis	47	38,2%	53,8%	21,1%	40,9%	32,4%
Abellerol - Merops apiaster	40	32,5%	0,0%	73,7%	59,1%	0,0%
Puput - Upupa epops	14	11,4%	0,0%	31,6%	13,6%	5,9%
Colltort - Jynx torquilla	2	1,6%	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%
Picot verd - Picus viridis	20	16,3%	7,7%	15,8%	20,5%	17,6%
Picot garser gros - Dendrocopos major	14	11,4%	11,5%	0,0%	13,6%	14,7%
Cogullada vulgar - Galerida cristata	19	15,4%	23,1%	26,3%	4,5%	17,6%
Cogullada fosca - Galerida theklae	3	2,4%	3,8%	0,0%	0,0%	5,9%
Cotoliu - Lullula arborea	19	15,4%	34,6%	0,0%	4,5%	23,5%
Alosa vulgar - Alauda arvensis	6	4,9%	15,4%	0,0%	0,0%	5,9%
Oreneta de ribera - Riparia riparia	7	5,7%	0,0%	5,3%	13,6%	0,0%
Roquerol - Ptyonoprogne rupestris	23	18,7%	46,2%	0,0%	0,0%	32,4%
Oreneta vulgar - Hirundo rustica	78	63,4%	30,8%	94,7%	97,7%	26,5%
Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica	4	3,3%	7,7%	0,0%	4,5%	0,0%
Oreneta cuablanca - Delichon urbicum	66	53,7%	34,6%	84,2%	79,5%	17,6%
Piula dels arbres - Anthus trivialis	7	5,7%	0,0%	10,5%	11,4%	0,0%
Titella - Anthus pratensis	31	25,2%	50,0%	0,0%	0,0%	52,9%
Cuereta groga - Motacilla flava	2	1,6%	0,0%	10,5%	0,0%	0,0%
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea	22	17,9%	15,4%	0,0%	4,5%	47,1%
Cuereta blanca - Motacilla alba	86	69,9%	76,9%	73,7%	59,1%	76,5%
Cargolet - Troglodytes troglodytes	78	63,4%	88,5%	84,2%	40,9%	61,8%
Pardal de bardissa - Prunella modularis	27	22,0%	42,3%	0,0%	0,0%	47,1%
Pit-roig - Erithacus rubecula	89	72,4%	88,5%	78,9%	40,9%	97,1%
Rossinyol - Luscinia megarhynchos	33	26,8%	0,0%	100,0%	31,8%	0,0%
Cotxa blava - Luscinia svecica	5	4,1%	0,0%	0,0%	9,1%	2,9%
Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros	36	29,3%	53,8%	0,0%	2,3%	61,8%
Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus	10	8,1%	3,8%	0,0%	20,5%	0,0%
Bitxac rogenic - Saxicola rubetra	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Bitxac comú - Saxicola torquatus	20	16,3%	7,7%	15,8%	13,6%	26,5%
Còbit gris - Oenanthe oenanthe	5	4,1%	0,0%	0,0%	9,1%	2,9%
Merla blava - Monticola solitarius	18	14,6%	19,2%	15,8%	11,4%	14,7%
Merla de pit blanc - Turdus torquatus	1	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Merla - Turdus merula	94	76,4%	96,2%	100,0%	47,7%	85,3%
Tord comú - Turdus philomelos	55	44,7%	69,2%	68,4%	11,4%	55,9%
Tord ala-roig - Turdus iliacus	6	4,9%	7,7%	0,0%	0,0%	11,8%
Griva - Turdus viscivorus	51	41,5%	61,5%	68,4%	18,2%	41,2%
Rossinyol bord - Cettia cetti	91	74,0%	88,5%	94,7%	59,1%	70,6%
Trist - Cisticola juncidis	27	22,0%	7,7%	52,6%	29,5%	5,9%
Boscaler pintat gros - Locustella naevia	1	0,8%	0,0%	5,3%	0,0%	0,0%
Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpaceus	19	15,4%	0,0%	10,5%	29,5%	11,8%
Boscarla menjamosquits - Acrocephalus palustris	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Balquer - Acrocephalus arundinaceus	15	12,2%	0,0%	63,2%	6,8%	0,0%
Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta	14	11,4%	0,0%	36,8%	15,9%	0,0%
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	85	69,1%	61,5%	84,2%	56,8%	82,4%
Tallarol gros - Sylvia borin	9	7,3%	0,0%	0,0%	15,9%	5,9%
Tallareta vulgar - Sylvia communis	3	2,4%	0,0%	0,0%	4,5%	2,9%
Tallareta cuallarga - Sylvia undata	26	21,1%	7,7%	5,3%	38,6%	17,6%
Tallarol de garriga - Sylvia cantillans	8	6,5%	3,8%	5,3%	9,1%	5,9%
Tallarol capnegre - Sylvia melanocephala	114	92,7%	84,6%	100,0%	97,7%	88,2%

Mosquiter pàl·lid - <i>Phylloscopus bonelli</i>	19	15,4%	3,8%	68,4%	11,4%	0,0%
Mosquiter ibèric - <i>Phylloscopus ibericus</i>	1	0,8%	0,0%	5,3%	0,0%	0,0%
Mosquiter comú - <i>Phylloscopus collybita</i>	61	49,6%	84,6%	47,4%	9,1%	76,5%
Mosquiter de passa - <i>Phylloscopus trochilus</i>	20	16,3%	3,8%	36,8%	25,0%	2,9%
Reietó - <i>Regulus regulus</i>	3	2,4%	11,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Bruel - <i>Regulus ignicapillus</i>	56	45,5%	46,2%	63,2%	34,1%	50,0%
Papamosques gris - <i>Muscicapa striata</i>	8	6,5%	0,0%	10,5%	13,6%	0,0%
Mastegatxes - <i>Ficedula hypoleuca</i>	12	9,8%	0,0%	21,1%	18,2%	0,0%
Mallerenga cuallarga - <i>Aegithalos caudatus</i>	94	76,4%	88,5%	89,5%	59,1%	82,4%
Mallerenga emplomallada - <i>Parus cristatus</i>	65	52,8%	53,8%	68,4%	45,5%	52,9%
Mallerenga petita - <i>Parus ater</i>	37	30,1%	46,2%	47,4%	20,5%	20,6%
Mallerenga blava - <i>Parus caeruleus</i>	72	58,5%	76,9%	73,7%	45,5%	52,9%
Mallerenga carbonera - <i>Parus major</i>	100	81,3%	92,3%	94,7%	65,9%	85,3%
Raspinell - <i>Certhia brachydactyla</i>	92	74,8%	84,6%	89,5%	61,4%	76,5%
Teixidor - <i>Remiz pendulinus</i>	10	8,1%	15,4%	0,0%	0,0%	17,6%
Oriol - <i>Oriolus oriolus</i>	22	17,9%	0,0%	63,2%	22,7%	0,0%
Botxí - <i>Lanius meridionalis</i>	3	2,4%	0,0%	0,0%	2,3%	5,9%
Capsigrany - <i>Lanius senator</i>	4	3,3%	0,0%	10,5%	4,5%	0,0%
Gaig - <i>Garrulus glandarius</i>	74	60,2%	53,8%	68,4%	52,3%	70,6%
Garsa - <i>Pica pica</i>	58	47,2%	57,7%	42,1%	40,9%	50,0%
Corb - <i>Corvus corax</i>	9	7,3%	11,5%	15,8%	4,5%	2,9%
Estornell vulgar - <i>Sturnus vulgaris</i>	41	33,3%	38,5%	31,6%	22,7%	44,1%
Estornell negre - <i>Sturnus unicolor</i>	29	23,6%	46,2%	36,8%	13,6%	11,8%
Pardal comú - <i>Passer domesticus</i>	71	57,7%	69,2%	73,7%	50,0%	50,0%
Pardal xarrec - <i>Passer montanus</i>	20	16,3%	30,8%	21,1%	9,1%	11,8%
Pardal roquer - <i>Petronia petronia</i>	4	3,3%	3,8%	0,0%	2,3%	5,9%
Pinsà comú - <i>Fringilla coelebs</i>	53	43,1%	84,6%	0,0%	11,4%	76,5%
Gafarró - <i>Serinus serinus</i>	90	73,2%	92,3%	100,0%	47,7%	76,5%
Verdum - <i>Carduelis chloris</i>	79	64,2%	69,2%	89,5%	54,5%	58,8%
Cadernera - <i>Carduelis carduelis</i>	84	68,3%	80,8%	78,9%	59,1%	64,7%
Lluer - <i>Carduelis spinus</i>	5	4,1%	7,7%	0,0%	0,0%	8,8%
Passerell - <i>Carduelis cannabina</i>	46	37,4%	50,0%	36,8%	18,2%	52,9%
Durbec - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	12	9,8%	42,3%	0,0%	0,0%	2,9%
Gratapalles - <i>Emberiza cirlus</i>	49	39,8%	42,3%	84,2%	29,5%	26,5%
Sit negre - <i>Emberiza cia</i>	2	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%
Repicalons - <i>Emberiza schoeniclus</i>	8	6,5%	23,1%	0,0%	0,0%	5,9%
Cruixidell - <i>Emberiza calandra</i>	2	1,6%	0,0%	5,3%	0,0%	2,9%
Ànec mut - <i>Cairina moschata</i>	4	3,3%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%
Ànec mandarí - <i>Aix galericulata</i>	1	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Ànec domèstic - <i>Anas peking/platyrhynchos</i>	6	4,9%	7,7%	5,3%	0,0%	8,8%
Bec de corall senegalès - <i>Estrilda astrid</i>	4	3,3%	0,0%	0,0%	6,8%	2,9%
Bec de corall cuanegra - <i>Estrilda troglodytes</i>	1	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%
TOTAL	160	160	96	92	122	106

Oca vulgar (*Anser anser*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			?	?						?	?		

No observat el 2009. Es recullen informacions antigues d'aquesta espècie a la riera de Llitrà i prop dels Monjos dels anys 1985 i 2004/5.

Ànec blanc (*Tadorna tadorna*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x				x		x						

No observat el 2009. Darrera observació anys 1987, 2006 i 2008.

Ànec xiulador (*Anas penelope*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x		

No observat el 2009. Darrera observació anys 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006 i 2007.

Ànec griset (*Anas strepera*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x					x		x	x	

No observat el 2009. Darrera observació anys 2003 i 2008.

Xarxet (*Anas crecca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		14-4-1996			2009		marxa		-			
	arribada		4-7-2006					arribada		14-9-2009			

S'ha observat en període de migració, els mesos de setembre i octubre.

Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura			x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura			x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars			
	conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x	augmenta				

Durant el mes de març s'observen aparellats, però el 29-3-2009 tan sols s'observen mascles, la qual cosa ens indica que les femelles ja són al niu. El 9-4-2009 veiem una femella amb 10 polls. El 21-4-2009 s'observa una femella amb 11 polls. El 19-5-2009 una femella amb 7 polls.

Ànec cuallarg (*Anas acuta*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x					x	x	x	x	

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1999, 2001, 2004 i 2005.

Xarrasclet (*Anas querquedula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x								

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2003, 2006 i 2007.

Ànec cullerot (*Anas clypeata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	

Dates extremes	marxa	18-4-2001	2009	marxa	5-2-2009
hivernants	arribada	17-7-2006		arribada	-

Entre gener i febrer es van veure 2 mascles. No s'ha tornat a veure més en tot l'any.

Xibec (*Netta rufina*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x				x		x				

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1998, 1999 i 2002.

Morell cap-roig (*Aythya ferina*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x		de pas		x		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x			x					x	x	x			

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2005.

Morell xocolater (*Aythya nyroca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
									x					

No observat el 2009. Observat únicament el 17-9-1988 (PMRA).

Morell de plomall (*Aythya fuligula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x		de pas		x		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
									x		x	x			

No observat el 2009. Darreres observacions any 2002.

Morell d'ulls grocs (*Bucephala clangula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
														x

No observat el 2009. L'únic registre obtingut és del 20-12-1983.

Bec de serra mitjà (*Mergus serrator*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x										

No observat el 2009. L'únic registre obtingut és del 4-4-1966 (PMRA).

Perdiu roja (*Alectoris rufa*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 9-8-2009 i el 14-11-2009 trobem rastres d'un exemplar que ha estat depredat.

Guatlla (*Coturnix coturnix*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

El 14-9-2009 a la nit es troba un exemplar que reposa a terra entre la Marsera i Sant Esteve. L'animal està mullat per la pluja que acaba de caure i s'està asseccant al mig del camí. En quedar enlluernada pels focus del cotxe es deixa apropar molt.

Faisà (*Phasianus colchicus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x		x	x	x						x

No observat el 2009. Darrera observació anys 1997, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.

Cabusset (*Tachybaptus ruficollis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat				
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars					
	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x		augmenta				

El 12-8-2009 s'observa un exemplar jove nascut de fa pocs dies. El 17-8-2009 s'anota un grup familiar. El 2-9-2009 s'observen 2 grups familiars amb polls que criden tot demanant menjar als adults. El 18-9-2009 es troba un niu on hi ha 2 polls crescuts, un dels adults els va a péixer amb una gambúsia (*Gambusia holbrooki*). El 26-10-2009 observem un adult ensenyant a pescar a un poll volander; l'adult pesca un alburn (*Alburnus alburnus*) i l'ensenyà al poll, però enlloc de donar-li se'l menja, tot seguit el poll es capbussa.

Cabussó emplomallat (*Podiceps cristatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x			x		x	x	x

Sols es va observar un únic exemplar que roman a l'embassament entre finals de gener i principis de febrer.

Cabussó collnegre (*Podiceps nigricollis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x						x	x	x	x

No observat el 2009. Darrera observació anys 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 i 2008.

Corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

El màxim d'exemplars durant el 2009 ha estat de 1608 exemplars detectats el 25-1-2009. Aquesta xifra suposa un rècord absolut del nombre d'exemplars observats a l'embassament. El 9-4-2009 s'observa un grup de 21 migrants que volen cap al nord. El 15-9-2009 arriba un grup de 26 migrants a l'embassament. El 23-2-2009 (MOVA) es va observar un exemplar que portava una anella amb la inscripció L1E. Havia estat anellat el 16-6-2007 a Ora Naturreservat Fredrikstad, Noruega.

Bitó (*Botaurus stellaris*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
			x										x						

No observat el 2009. Darreres observacions 2006.

Martinet menut (*Ixobrychus minutus*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació		I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
						x		x		x		x							
Dates extremes estivals		arribada		23-4-2000					2009				arribada		4-5-2009				
		marxa		4-9-2009									marxa		4-9-2009				
Nidificació		Anterior a 2009			segura			x	probable			possible			no detectat				
		2009			segura				probable			x	possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants						1 a 10			x	10 a 100						Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes							rupícoles					pinedes i alzinars					
		conreus i erms							màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant						disminueix					estable						augmenta		x

El 17-7-2009 s'observen molt atrefegats anant d'aquí cap allà. Possiblement estan alimentant polls. A destacar també la citació del 4-9-2009 que representa el registre més tardà obtingut fins al moment al Parc.

Martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura			probable			possible		x	no detectat		
	2009		segura			probable			possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x		

Ha estat vist de manera regular entre el 28-3-2009 i el 26-10-2009.

Martinet ros (*Ardeola ralloides*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes migrants	pr. citació		29-3-05(PTEA)			2009			pr. citació		23-4-2009		
	últ. citació		1-6-1999						últ. citació		4-5-2009		
	pr. citació		31-7-2007						pr. citació		-		
	últ. citació		27-9-2005						últ. citació		-		

Ha estat observat en dues ocasions al llarg del 2009, en pas primaveral.

Esplugabous (*Bubulcus ibis*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			

Aquesta au havia estat molt abundant. Enguany sols s'ha observat el 4-11-2009.

Martinet blanc (*Egretta garzetta*)

[illegible]

El 14-3-2009 hi ha un grupet de 8 exemplars que es queda ajocat a un canyar. El 29-3-2009 són 21 exemplars els que es queden a la joca. El 12-8-2009 s'observa un grup de 14 exemplars que s'ajochen a la cua. A l'abril s'arriba a observar el màxim anual de 26 exemplars.

Agró blanc (*Casmerodius albus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x			x	x	x	x	x	x

Al mes de setembre es va anar veient en pas postnupcial. Alguns dies un exemplar i un dia 2 exemplars.

Bernat pescaire (*Ardea cinerea*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Tot l'any es manté un contingent d'entre 10 i 40 exemplars. El 5-2-2009 trobem un exemplar mort a la cua de l'embassament. El 9-4-2009 trobem un exemplar ferit que no pot volar a la Marina. El 26-8-2009 es va poder observar un exemplar juvenil que portava una anella amb la inscripció CU7. Aquest bernat pescaire havia estat anellat com a poll al niu tres mesos abans, el 15-5-2009, a la llacuna de l'Encanyissada del delta de l'Ebre.



Agró roig (*Ardea purpurea*)

Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	pr. citació		14-3-1998				2009		pr. citació		23-4-2009			
	últ. citació		30-9-2004						últ. citació		27-5-2009			

Ha estat observat tan sols al pas prenupcial de primavera.

Cigonya negra (*Ciconia nigra*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x				x	x	x		

No observat el 2009. Darrera observació anys 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.

Cigonya blanca (*Ciconia ciconia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x				x	x			

No observat el 2009. Darrera observació anys 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006 i 2008.

Becplaner (*Platalea leucorodia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x								

No observat el 2009. L'únic registre obtingut és del 12-4-2003.

Aligot vesper (*Pernis apivorus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x		x			x	x	x	x	
Dates extremes migrants	pr. citació		24-3-2003			2009			pr. citació		-	
	últ. citació		7-5-2004						últ. citació		-	
	pr. citació		15-8-2009						pr. citació		15-8-2009	
	últ. citació		23-10-2003						últ. citació		10-10-2009	

Ha estat l'any més fluix (almenys des del 1998) del pas migratori d'aquesta espècie. Possiblement a causa de factors climatològics han desplaçat les rutes de migració per altres serralades. El 12-9-2009 és el dia que s'anoten més exemplars, un total de 26.

Esparver d'espattes negres (*Elanus caeruleus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2009. Observat en una ocasió el 13-8-2002 (DIVA).

Milà negre (*Milvus migrans*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x	x		

El 22-8-2009 es va observar un exemplar en vol migratori cap al sud.

Milà reial (*Milvus milvus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x	x		

El 28-9-2009 es va observar un exemplar en vol migratori cap al sud.

Aufrany (*Neophron percnopterus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2009. Observat únicament l'any 2006.

Voltor comú (*Gyps fulvus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
									x				

No observat el 2009. Darreres observacions anys 2003 i 2005.

Voltor negre (*Aegypius monachus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x								

No observat el 2009. Només es coneix el registre del 5-5-2008 (PTEA, XPCA)

Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Dates extremes estivals	arribada		4-3-2005			2009			arribada		21-4-2009							
	marxa		17-11-2005						marxa		10-10-2009							
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible				no detectat						
	2009		segura		x	probable		possible				no detectat						
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100							
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x				
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera							
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta		x				

El 23-5-2009 s'observa un adult amb una serp blanca acabada de capturar, en ple vol se la va empassant. El 26-8-2009 es va poder observar un exemplar jove que demanava menjar a l'adult.

Arpella vulgar (*Circus aeruginosus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x			x	x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació		6-3-2002			2009			pr. citació		24-4-2009		
	últ. citació		2-5-1999						últ. citació		25-4-2009		
	pr. citació		21-8-1998						pr. citació		29-8-2009		
	últ. citació		21-10-2006						últ. citació		3-10-2009		

El 24-4-2009 s'observa un exemplar que vola migrant cap al nord. El 25-4-2009 s'observa un exemplar que ha fet nit per la zona de la Timba, ja que s'hi observa a trenc d'alba, a les 7 del matí. Al pas de tardor ha estat més freqüent que no pas al de primavera.

Arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x					x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		19-4-2007			2009		marxa		31-1-2009			
	arribada		2-9-2007					arribada		24-10-2009			

Al gener es va observar un exemplar hivernant per la zona de conreus entre el Corral d'en Rafeques i el riu Foix. A la tardor s'ha vist en pas.

Esparver cendrós (*Circus pygargus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x				x	x				

El 12-9-2009 es va observar un exemplar en vol migratori cap al sud.

Astor (*Accipiter gentilis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta		

El 14-3-2009 s'observa un exemplar que porta una presa a les potes. Al juny es va realitzar una observació estival d'un exemplar establert al territori, prop d'un dels niu.

Esparver vulgar (*Accipiter nisus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable				possible				no detectat		
	2009		segura		x	probable				possible				no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100					Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes								rupícoles						x
		conreus i erms								màquies i garrigues						
Tendència poblacional nidificant				disminueix						estable		x		augmenta		

El 29-7-2009 observem un esparver que porta una presa a les potes. El 24-10-2009 veiem un esparver que es banya prop del Puig de l'Àliga en un toll d'aigua de la pluja. A banda de les parelles que es reproduïxen al parc, al pas de tardor van ser observats en migració entre el 15-8-2009 i el 24-10-2009.

Aligot comú (*Buteo buteo*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable		x	augmenta				

A la tardor s'anoten alguns exemplars migrants. La parella nidificant es va observar a l'abril, sembla que té el niu fora dels límits del Parc del Foix, com en els darrers anys.

Àliga cridanera (*Aquila clanga*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x	x	

El 19-10-2009 al migdia observem un exemplar d'àliga cridanera que travessa la zona del Turó de les Tres Partions provinent del nord i segueix cap el sud-est. Tot i que aquesta és la primera citació de l'espècie al Parc, disposem de dades d'un exemplar marcat a Estònia amb un transmissor que envia les posicions via satèl·lit, que va passar per les muntanyes del Parc o molt a prop, entre el 17-11-2008 i el 18-11-2008

Àliga daurada (*Aquila chrysaetos*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x							x							

No observat el 2009. Darreres observacions anys 2000 i 2005.

Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x		x	x	x	x		x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		7-3-2009			2009			arribada		7-3-2009			
	marxa		25-10-2008						marxa		3-10-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura			probable		x	possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible		x	no detectat		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				x
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				

L'observació del mes de març avança la data més primerenca de pas prenupcial.

Àliga cuabarrada (*Hieraetus fasciatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional		nidificant			disminueix			estable		x	augmenta			

S'ha anat veient al llarg de l'any, a vegades un exemplar, a vegades la parella. La reproducció ha fracassat, no està clar el tipus de problemàtica que ha patit, però sembla que les molèsties ocasionades prop del niu n'han estat la causa. Una de les molèsties que hem detectat reiteradament és el pas de parapents a motor per la zona.

Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x			x	x	x			
Dates extremes migrants	pr. citació		16-3-2004			2009			pr. citació		-		
	últ. citació		9-5-2001						últ. citació		-		
	pr. citació		21-8-2005						pr. citació		22-8-2009		
	últ. citació		21-10-2006						últ. citació		24-9-2009		

S'ha observat únicament durant el pas migratori postnupcial. En cinc ocasions entre agost i setembre.

Xoriguer petit (Falco naumanni)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
									x						

No observat el 2009. Darreres observacions any 2000.

Xoriguer comú (*Falco tinnunculus*)

[illegible]

El 28-2-2009 es veu un exemplar per la zona de la Plana Morta. El 4-8-2009 veiem un exemplar que empaita i intenta caçar una gavina prop de Castellet. El 15-8-2009 es va observar un exemplar en migració des del Turó de les Tres Partions.

Rascló (*Rallus aquaticus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible			no detectat		
	2009		segura			probable		possible			no detectat x		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		?	augmenta		

Sols s'ha detectat com a hivernant. El 29-3-2009 es va recollir el darrer registre prenupcial i el 14-9-2009 la primera observació postnupcial.

Polla pintada (*Porzana porzana*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x								

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Rascletó (*Porzana parva*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x									

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1998 i 2005.

Rasclet (*Porzana pusilla*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x					x				

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1978 i 1998.

Guatlla maresa (*Crex crex*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
												x

No observat el 2009. Darrera observació 13-12-1967 (PMRA).

Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 8-6-2009 s'observa un adult acompanyat de 2 polls nounats. El 6-7-2009, el 28-7-2009 i el 29-7-2009 s'observen polls nascuts fa pocs dies. El 4-8-2009 es veuen joves.

Polla blava (*Porphyrio porphyrio*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x			x	x	x	x	x	x		x	

S'han seguit recollit registres d'aquesta espècie repartits al llarg de l'any. Si es segueix anotant amb la freqüència dels darrers anys caldrà reconsiderar la seva fenologia, ja que cada vegada la considerem menys divagant.

Fotja (*Fulica atra*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 4-3-2009 s'observa una parella que està construint el niu. El 29-3-2009 una altra parella construeix niu. El 6-7-2009 s'observa un adult amb polls nascuts de fa pocs dies. El 28-7-2009, el 4-8-2009 i el 10-8-2009 veiem exemplars joves.

Fotja banyuda (*Fulica cristata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x											

No observat el 2009. Sols tenim notícia d'una observació del 9-2-2004 (ASA, EFM).

Grua (*Grus grus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x									x	x	

Destaquem l'observació del 3-11-2009 en què s'anoten 26 exemplars en vol migratori prop de la Casa Alta.

Sisó (*Tetrax tetrax*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x									

No observat el 2009. Darreres observacions 26-4-1972 (PMRA) i 9-3-2008 (MPMB).

Cames llargues (*Himantopus himantopus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
			x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		6-3-2002			2009			arribada		21-4-2009		
	marxa		3-10-2008						marxa		-		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible				no detectat	
	2009		segura			probable		possible				no detectat	

Enguany sols s'ha observat en tres ocasions aquesta espècie. Tot i que fa anys havia nidificat a l'embassament, darrerament no ho fa, ja que no té comportament estival.

Torlit (*Burhinus oedicnemus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	x
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	---

No observat el 2009. Recollim però, l'observació del 31-10-2008 (RJRA) de sis exemplars que es mouen per una zona de conreus propera a Santa Margarida i els Monjos. Es tracta d'una citació de gran interès ja que feia molts anys que no s'observava el torlit al Parc del Foix. Fa uns quants anys que l'espècie sembla recuperar-se. Últimament s'havien anat veient parelles reproductores per diferents sectors de la plana penedesenca, en concret n'hi ha alguna establerta prop de la riera de Marmellar, però una mica apartada del Parc.

Corriol petit (*Charadrius dubius*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		13-3-2002			2009			arribada		21-3-2009			
	marxa		28-9-2001						marxa		11-9-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x	10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 26-8-2009, el 27-8-2009, el 1-9-2009 i el 2-9-2009 s'observa un grup familiar amb 2 adults i 2 joves.

Corriol gros (*Charadrius hiaticula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
									x						

No observat el 2009. Darrera observació 8-9-2006 (XPCA).

Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
												x	x

No observat el 2009. Darrera observació anys 1985 i 2001.

Fredulega (*Vanellus vanellus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x								x	x			
Dates extremes	marxa		4-3-2005				2009				marxa		12-2-2009		
hivernants	arribada		5-11-2007								arribada		19-12-2009		

A finals de gener es va observar el màxim anual de 54 exemplars. Habitualment es veuen pels entorns de mas Calent, al mes de desembre s'han observat prop de Santa Margarida i els Monjos.

Territ menut (*Calidris minuta*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
							x	x	x						

Ha estat observat els dies 10-8-2009 i 27-8-2009 sedimentat a la cua de l'embassament. Aquesta au limícola no s'observa de manera regular tots els anys.

Territ de Temminck (*Calidris Temminckii*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2009. únicament es va observar l'agost de l'any 1998.

Territ beclarg (*Calidris ferruginea*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x			x				

No observat el 2009. Darreres observacions any 2001.

Territ variant (*Calidris alpina*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
								x	x					

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1999 i 2001.

Becadell sord (*Limnocyptes minimus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x										

Interessant observació el 3-1-2009 a la cua de l'embassament d'aquesta au. Ha estat citada molt poques vegades al Parc del Foix.

Becadell comú (*Gallinago gallinago*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
	x	x	x	x						x	x	x						
Dates extremes	marxa		26-4-2005				2009				marxa		25-2-2009					
hivernants	arribada		7-10-2004								arribada		-					

Ha estat vist els mesos de gener i febrer, amb un comportament típicament hivernant.

Becada (*Scolopax rusticola*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		14-3-2004			2009			marxa		7-3-2009		
	arribada		27-10-1996						arribada		12-11-2009		

Els seus hàbits crepusculars en fan molt difícil la seva detecció. De tota manera s'ha aconseguit observar en tres ocasions.

Tètol cuanegre (*Limosa limosa*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x		x								

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1973 i 1985.

Tètol cuabarrat (*Limosa lapponica*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Gamba roja pintada (*Tringa erythropus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x			x						

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1998, 2003 i 2005.

Gamba roja vulgar (*Tringa totanus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x			x	x	x				

No observat el 2009. Darrera observació anys 2004, 2005, 2006 i 2008.

Gamba verda (*Tringa nebularia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x		x	x	x	x			

Al pas primaveral es va anotar el 23-4-2009. A la tardor es va observar el mes de setembre.

Xivita (*Tringa ochropus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		22-4-2003			2009			marxa		29-3-2009		
	arribada		14-6-2005						arribada		6-7-2009		

Ha estat molt freqüent i abundant durant el pas migratori de tardor.

Valona (*Tringa glareola*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x			

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 i 2007.

Xivitona (*Actitis hypoleucos*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació		5-3-1999			2009			pr. citació		9-4-2009		
	últ. citació		24-5-1980						últ. citació		4-5-2009		
	pr. citació		21-6-2007(PTEA)						pr. citació		6-7-2009		
	últ. citació		19-11-1999						últ. citació		17-9-2009		

Destaquem l'observació del 4-5-2009 de fins a 15 exemplars. Al pas post nupcial ha estat més freqüent, però en menys quantitat.

Gavina capnegra (*Larus melanocephalus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
							x	x			x		

S'observa el 4-8-2009 un exemplar solitari. És una au marina que habitualment no entra terra endins.

Gavina menuda (*Larus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x										

No observat el 2009. Darreres observacions any 1999.

Gavina vulgar (*Larus ridibundus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

El 17-7-2009 s'observen 39 exemplars, quasi tots amb plomatge juvenil. S'ha vist tot l'any, encara que entre juliol i setembre n'hi ha hagut més quantitat.

Gavina corsa (*Larus audouinii*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
								x			x		

No observat el 2009. Darreres observacions anys 2005 i 2007.

Gavià fosc (*Larus fuscus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
									x				

No observat el 2009. Observat únicament l'any 2001.

Gavià argentat (*Larus michaellis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x		x	x	x	x			x				

El 21-3-2009 s'observa un grup de 79 exemplars en vol cap al nord. El 25-4-2009 s'anoten veus d'exemplars que volen a gran alçada prop de la Timba.

Xatrac gros (*Sterna caspia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x									

No observat el 2009. Darreres observacions any 2002, 2005 i 2006.

Fumarell carablanc (*Chlidonias hybrida*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x			

El 12-8-2009, el 14-8-2009 i el 4-9-2009 s'observa un exemplar juvenil.

Fumarell negre (*Chlidonias niger*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x		x	x	x				

Els dies 1-9-2009 i 2-9-2009 s'observa un exemplar juvenil.

Fumarell alablanc (*Chlidonias leucopterus*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
									x						

No observat el 2009. Observat sols en una ocasió el 19-9-2008 (XPCA).

Colom roquer (*Columba livia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

S'observa durant tot l'any per Castellet, Santa Margarida i els Monjos i en altres zones humanitzades.

Xixella (*Columba oenas*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable			augmenta			

És un ocell que ha esdevingut molt escàs i localitzat. Segueix en regressió al Parc.

Tudó (*Columba palumbus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x	
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x			
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x		augmenta				

El 15-4-2009 observem una parella amb actituds de zel. El 19-12-2009 en un grup d'una setantena d'exemplars que estan a un camp llaurat, hi ha un tudó amb un plomatge anòmal, de color gairebé negre.

Tórtora turca (*Streptopelia decaocto*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		augmenta		x			

És molt habitual entre la Ràpita i Santa Margarida i els Monjos. Ocasionalment també se'l veu en altres zones amb menor quantitat.

Tórtora (*Streptopelia turtur*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
				x	x	x	x	x	x	x								
Dates extremes estivals	arribada		2-4-2005			2009			arribada		24-4-2009							
	marxa		11-10-2009						marxa		11-10-2009							
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable				possible				no detectat				
	2009		segura		x	probable				possible				no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100		x		Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x			
		conreus i erms			x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable					augmenta					

El 5-9-2009 s'observen 2 exemplars en migració des del Turó de les Tres Partions. Destaquem l'observació del 11-10-2009, ja que habitualment el pas de tardor acaba al setembre, les observacions d'octubre són excepcionals. El registre esdevé el més tardà que s'ha recollit al Parc.

Cucut reial (*Clamator glandarius*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
			x	x	x	x		x										
Dates extremes estivals		arribada		5-2-2009				2009		arribada		5-2-2009						
		marxa		23-7-2006(PTEA)						marxa		-						
Nidificació		Anterior a 2009		segura		x	probable				possible				no detectat			
		2009		segura			probable		x	possible				no detectat				
Estimació de parelles nidificants						1 a 10		x	10 a 100				Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars				
		conreus i erms				x		màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable						augmenta				

El 25-4-2009 s'observa una parella que es mou per la zona de conreus propera a l'aiguabarreig del Foix i el Marmellar. Destaquem el registre primerenc del 5-2-2009 que avança la data més primerenca per a les arribades prenupcials.

Cucut (*Cuculus canorus*)

Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		27-3-06(XPCA)				2009		arribada		9-4-2009			
	marxa		12-9-2008						marxa		8-6-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	x
	conreus i erms	x	màquies i garrigues	x	z. humides/bosc ribera	x
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	

Observacions habituals de l'espècie entre abril i juny.

Òliba (*Tyto alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x		x	x	x			x				
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible			no detectat			
	2009		segura			probable		possible			no detectat x			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x		augmenta				

No observat el 2009. Darrera observació anys 1998, 1999, 2000, 2004, 2006 i 2008. Encara que no s'hagi observat durant aquest període 2009, és molt probable que es mantinguin les poblacions dels darrers anys.

Xot (*Otus scops*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x			x				
Dates extremes estivals	arribada	5-4-1980				2009			arribada	24-4-2009				
	marxa	11-7-2001							marxa	-				
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable			augmenta				

Ha estat anotat poques vegades, a la riera de Marmellar.

Duc (*Bubo bubo*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta					

El 12-11-2009 s'anota cantant uns breus moments.

Mussol comú (*Athene noctua*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat	
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta		

El 6-7-2009 s'observa un exemplar juvenil que ha sortit recentment del niu. El 30-7-2009 observem les restes d'un exemplar que ha estat depredat prop dels Monjos. El 9-8-2009 trobem rastres d'un exemplar que ha estat depredat prop de Torrelletes. El 12-8-2009 trobem un exemplar atropellat prop de Castellet i el 1-9-2009 un atropellat a la carretera de l'Arboç.

Gamarús (*Strix aluco*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura			x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura				probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x		augmenta		

Es va anotar els mesos de setembre i octubre en territoris coneguts.

Mussol banyut (*Asio otus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
					x		x							
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible			no detectat		x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			

No observat el 2009. Darreres observacions anys 2004 i 2005.

Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		19-4-2002			2009			arribada		24-4-2009			
	marxa		1-10-2003						marxa		11-9-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

Ha estat observat entre abril i setembre.

Siboc (*Caprimulgus ruficollis*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals		arribada		17-5-1997		2009			arribada		-	
		marxa		27-9-2007					marxa		12-8-2009	
Nidificació		Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat	
		2009		segura			probable		x	possible		no detectat
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars		
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable		augmenta			

Sols es va observar el 12-8-2009. Realment sembla que en queden ben poques parelles.

Ballester (*Apus melba*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		12-3-2007				2009		arribada		21-3-2009			
	marxa		30-10-2003						marxa		24-10-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			

A la tardor en el pas postnupcial alguns dies va ser força freqüent (12-9-2009, 19-9-2009).

Falciot negre (*Apus apus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		26-3-1999			2009			arribada		9-4-2009			
	marxa		3-10-2004						marxa		19-9-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible		no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100				x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 23-5-2009 trobem closques d'ou al terra, la qual cosa ens indica que hi ha polls acabats de néixer.

Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
						x	x	x	x				

No observat el 2009. Darreres observacions anys 2004, 2005 i 2006.

Blauet (*Alcedo atthis*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura				probable		x	possible			no detectat		
	2009		segura				probable			possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x

Passada la reproducció són força abundants a l'embassament del Foix. Enguany fins i tot s'ha observat a la riera de Llitrà.

Abellerol (*Merops apiaster*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals		arribada		8-4-1999				2009		arribada		9-4-2009		
		marxa		29-9-2001						marxa		18-9-2009		

Nidificació	Anterior a 2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
	2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		
de cria	conreus i erms		x	màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable		x	augmenta		

La citació més primerenca gairebé iguala a la que teníem. El 24-4-2009 s'observa una concentració de 50 exemplars que s'ajouen a un bosc de ribera proper a la Timba. El 29-7-2009 observem un grup de 43 exemplars que surt de les joques que té situades a un bosc de ribera del Foix proper a la Ràpita. El 10-8-2009 s'observa un grup de 12 exemplars que està pescant peixos a la cua i després sota castellet. Es tracta d'un comportament alimentari desconegut per a aquesta espècie. Possiblement es va produir per tal de fer un aprofitament ocasional de l'elevada quantitat de gambúsies que hi havia aquells dies nedant en superfície. El 12-8-2009 s'observa una agrupació de 80 exemplars que entren a ajocar-se a un bosc de ribera proper a la cua de l'embassament.

Gaig blau (*Coracias garrulus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
				x	x	x							

No observat el 2009. Darreres observacions anys 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Puput (*Upupa epops*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

Observacions habituals de l'espècie sobretot en zones de conreus o a prop..

Colltort (*Jynx torquilla*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		?	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x		x	x	
Dates extremes estivals	arribada		5-4-1980			2009			arribada		-		
	marxa		19-9-2009(JGGF)						marxa		19-9-09(JGGF)		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat	
	2009		segura			probable		x	possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable			augmenta		

Observem un exemplar cantant el 18-9-2009 prop de la Timba. L'exemplar es torna a observar a l'endemà, el 19-9-2009 (JGGF) i esdevé la citació més tardana recollida fins el moment (si exceptuem les citacions d'exemplars hivernants).

Picot verd (*Picus viridis*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants	1 a 10		10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars		x
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera		x
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable		x	augmenta	

No és una espècie molt abundant, sobretot la trobem als boscos de ribera i en les zones properes. El 9-10-2009 a la nit trobem un exemplar que dorm a uns 3 metres d'altura en un pal de ciment d'una línia elèctrica.

Picot garser gros (*Dendrocopos major*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x				x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura			probable		x	possible			no detectat	
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta		x	

Enguany s'ha confirmat la reproducció d'aquest ocell al Parc, ja feia uns anys que mostrava indicis evidents d'una probable reproducció. El 29-7-2009 un exemplar emet veus d'alarma per la presència d'un xoriguer.

Picot garser petit (*Dendrocopos minor*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x											
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible			no detectat		x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta		x		

No observat el 2009. Darrera observació any 2008.

Terrerola vulgar (*Calandrella brachydactyla*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x								

No observat el 2009. Darrera observació el 22-5-2002 (PTEA).

Cogullada vulgar (*Galerida cristata*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable				augmenta			

A les zones de conreu s'hi segueixen observant unes quantes parelles establertes.

Cogullada fosca (*Galerida theklae*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura			probable		x	possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

S'observa amb baixa freqüència a les muntanyes del Parc.

Cotoliu (*Lullula arborea*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura			probable			possible			no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

Al Parc les cotolius es reproduïxen de forma molt escassa i localitzada. Sobretot s'observen exemplars hivernants.

Alosa vulgar (*Alauda arvensis*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x							x	x	x
Dates extremes hivernants	marxa		12-3-2005				2009		marxa		7-3-2009	
	arribada		7-10-2006						arribada		24-10-2009	

A primers d'any es van observar fins al març. A l'octubre van tornar a arribar.

Oreneta de ribera (*Riparia riparia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x	x		x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació		26-2-2007				2009	pr. citació		24-4-2009			
	últ. citació		11-6-1998					últ. citació		-			
	pr. citació		7-8-1998					pr. citació		17-8-2009			
	últ. citació		15-10-2000					últ. citació		26-9-2009			

A la primavera van ser molt menys freqüents que en anys anteriors, i sols es va observar en una ocasió. En canvi durant el pas postnupcial s'observa en cinc ocasions des de l'agost a finals de setembre.

Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació		Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
		2009		segura			probable			possible		x	no detectat		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars			
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional		nidificant				disminueix		x	estable				augmenta		

El 4-3-2009 al pantà s'observa una nombrosa presència d'exemplars, un mínim de 300. El 10-10-2009 des del Turó de les Tres Patons s'anoten un mínim de 27 migrants. Destaquem l'observació d'exemplars poc després de l'època reproductora en un ambient que els podria haver estat favorable per niar. Caldrà confirmar si es recupera aquesta espècie com a nidificant.

Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		17-2-1979				2009		arribada		18-2-2009			
	marxa		15-11-1998						marxa		24-10-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable			augmenta				

La primera observació de l'any va ser un bon registre molt primerenc (18-2-2009). El 8-6-2009 s'observen polls volanders. El 12-8-2009 s'observa una agrupació de més de 600 exemplars que intenten ajocar-se a la cua de l'embassament, però els costa de decidir-se, possiblement a causa de la presència d'algun depredador. El 14-9-2009 hi ha uns 200 exemplars que entren a ajocar-se als canyissars. Destaquem la recuperació el 11-9-2009 d'un exemplar amb anella de Brusel·les, estem a l'espera de les dades concretes d'anellament.

Oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals		arribada		7-3-2008			2009			arribada		7-3-2009		
		marxa		3-10-2008						marxa		12-9-2009		
Nidificació		Anterior a 2009		segura		x	probable			possible		no detectat		
		2009		segura			probable		x	possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				x	pinedes i alzinars			
		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			

La primera observació es va obtenir el 7-3-2009, és una citació molt avançada que iguala la de l'any passat.

Oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals		arribada		19-2-2004			2009			arribada		4-3-2009			
		marxa		4-11-2009						marxa		4-11-2009			
Nidificació		Anterior a 2009			segura		x	probable		possible		no detectat			
		2009			segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10					10 a 100				Més de 100	x
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				x	rupícoles						pinedes i alzinars		
		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant					disminueix			x	estable					augmenta	

Aquest any la darrera observació, del 4-11-2009, ha suposat el registre més tardà obtingut al Parc. És el primer cop que s'anota al novembre.

Trobat (*Anthus campestris*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
						x	x	x	x	x	x								
Dates extremes estivals		arribada		11-4-2004				2009				arribada		-					
		marxa		27-9-2008								marxa		-					
Nidificació		Anterior a 2009			segura		x	probable				possible				no detectat			
		2009			segura			probable				possible				no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			x		10 a 100					Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars					
		conreus i erms						màquies i garrigues				x		z. humides/bosc ribera					

No observat el 2009. Darrera observació anys 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.

Piula dels arbres (*Anthus trivialis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x				x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació	26-3-1999					2009	pr. citació	21-4-2009			
	últ. citació	24-4-2006						últ. citació	-			
	pr. citació	15-8-2002						pr. citació	22-8-2009			
	últ. citació	18-10-2003						últ. citació	26-9-2009			

Observacions habituals de l'espècie durant els passos migratoris prenupcial i postnupcial.

Titella (*Anthus pratensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x					x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		9-4-1979			2009			marxa		21-3-2009		
	arribada		13-9-2005						arribada		10-10-2009		

Observacions habituals de l'espècie durant l'hivern.

Grasset de muntanya (*Anthus spinoletta*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x							x					

No observat el 2009. Darreres observacions any 2008.

Grasset de costa (*Anthus petrosus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
			x												

No observat el 2009. Darreres observacions any 1998.

Cuereta groga (*Motacilla flava*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x				x	x		
Dates extremes migrants	arribada	22-3-1998					2009	arribada		15-4-2009			
	marxa	1-5-2004						marxa		23-4-2009			
	arribada	5-9-2001						arribada		-			
	marxa	25-10-2003						marxa		-			

Tan sols ha estat citada en el pas prenupcial.

Cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2009		segura			probable			possible			no detectat		x		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents	zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars			
de cria	conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta				

Durant el període reproductor enguany no ha estat citada.

Cuereta blanca (*Motacilla alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura			x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 21-3-2009 s'observa una parella d'exemplars amb un comportament de zel. El 29-3-2009 hi ha 30 exemplars que entren a la joca. El 8-6-2009 s'observen polls volanders. El 28-7-2009 observem un grup familiar amb polls volanders. El 4-8-2009 es veuen joves. El 12-8-2009 s'observa un grup familiar amb exemplars joves i adults. El 12-11-2009 hi ha uns 80 exemplars que entren a la joca.

Cargolet (*Troglodytes troglodytes*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

Observacions freqüents de l'espècie durant tot l'any. Tant als entorns de l'embassament com a les muntanyes del Parc.

Pardal de bardissa (*Prunella modularis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		28-3-2003			2009			marxa		4-3-2009		
	arribada		8-10-2005						arribada		10-10-2009		

Observacions de l'espècie durant els mesos d'hivern. Com en anys anteriors ha estat molt freqüent des de ben entrada la tardor i durant l'hivern fins a inicis de març.

Pit-roig (*Erithacus rubecula*)

[illegible]

Nidificació	Anterior a 2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
	2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100	x	Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles		pinedes i alzinars		x	
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable		augmenta		x	

Observacions de l'espècie durant tot l'any, durant els mesos de tardor i hivern de manera regular.

Rossinyol (*Luscinia megarhynchos*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		4-4-2007			2009			arribada		9-4-2009			
	marxa		1-10-1999						marxa		18-9-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

Observacions habituals de l'espècie durant l'epoca de reproducció.

Cotxa blava (*Luscinia svecica*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x					x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació	12-3-1998				2009			pr. citació	-					
	últ. citació	15-3-1998							últ. citació	-					
	pr. citació	28-8-05 (JGGF)							pr. citació	7-9-09(MOVA)					
	últ. citació	31-10-1998							últ. citació	1-10-2009					

Feia uns quants anys que s'havia deixat d'observar aquesta au. Al pas postnupcial es va citar fins a 5 dies.

Cotxa fumada (*Phoenicurus ochruros*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x				x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura			probable			possible			no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

Sobretot s'ha observat durant la hivernada. El 24-10-2009 s'arriben a observar en petits grups fins a uns 180 exemplars en migració. El 4-10-2009 trobem un exemplar atropellat a la carretera de Torrelletes.

Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació	29-3-2009				2009			pr. citació	29-3-2009					
	últ. citació	14-5-2002							últ. citació	-					
	pr. citació	16-8-2006							pr. citació	6-9-09(MBLA)					
	últ. citació	23-10-2004							últ. citació	28-9-2009					

Sobretot s'ha observat durant el pas migratori postnupcial. Destaquem però, la primera citació de l'any, ja que avança el registre més primerenc de pas prenupcial que teníem fins ara.

Bitxac rogenic (*Saxicola rubetra*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x				x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació		16-4-2002			2009			pr. citació		-	
	últ. citació		7-5-2000						últ. citació		-	
	pr. citació		11-9-2009						pr. citació		11-9-2009	
	últ. citació		8-10-73 (PMRA)						últ. citació		-	

El registre del 11-9-2009 avança el registre més primerenc de pas postnupcial que teníem fins ara.

Bitxac comú (*Saxicola torquatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

Observacions regulars i amb baixa densitat de l'espècie durant tot l'any.

Còbit gris (*Oenanthe oenanthe*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x	x				x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		31-3-1998			2009			pr. citació		-				
	últ. citació		11-5-2003						últ. citació		-				
	pr. citació		2-9-2005						pr. citació		5-9-2009				
	últ. citació		15-10-2004						últ. citació		10-10-2009				

Observacions de l'espècie durant el pas postnupcial. Es va anotar entre setembre i octubre.

Còbit ros (*Oenanthe hispanica*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		13-4-2000			2009			arribada		-		
	marxa		16-9-1997						marxa		-		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2009		segura			probable		possible		no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable				augmenta		

No observat el 2009. Darreres observacions any 2004, 2005 i 2006.

Còbit roquer (*Oenanthe leucura*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
						x	x	x					

Merla roquera (*Monticola saxatilis*)

No observat el 2009. Darreres observacions any 2001 i 2005.

El 8-6-2009 s'observa un poll volander.

El 24-10-2009 s'observa en pas des del Turó de les Tres Partions.

El 4-5-2009 un exemplar porta becada cap al niu.

No observat el 2009. Darrera observació anys 2000, 2001, 2002, 2004 i 2008.

[illegible]

Nidificació	Anterior a 2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
	2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100	x	Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles		pinedes i alzinars		x	
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera		x	
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable		augmenta		x	

El 12-11-2009 hi ha uns 60 exemplars que entren a la joca a la cua de l'embassament. A la tardor algun dia es va anotar un pas fort d'exemplars.

Tord ala-roig (*Turdus iliacus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x							x	x	x		
Dates extremes hivernants	marxa		15-3-2005			2009			marxa		8-2-2009			
	arribada		23-10-2007						arribada		24-10-2009			

Observacions habituals de l'espècie durant la hivernada. Destaquem la data de les arribades postnupcials que pràcticament iguala el registre extrem que tenim recollit.

Griva (*Turdus viscivorus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant	x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				x
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 15-4-2009 observem una parella amb actituds de zel. A la tardor es van observar uns quants migrants.

Rossinyol bord (*Cettia cetti*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant	x	de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 6-7-2009 s'observen polls volanders.

Trist (*Cisticola juncidis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 24-7-2009 s'observa un exemplar amb becada. Sobretot s'observa a la primavera i estiu establert en territoris de reproducció. De forma més puntual hi ha uns pocs exemplars hivernants.

Boscaler pintat gros (*Locustella naevia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x				x	x			

Destaquem l'observació del 27-4-2009, ja que aquesta és una au que s'observa o escolta molt pocs anys. En tot cas aquest és el primer registre primaveral que obtenim al Parc del Foix.

Boscaler comú (*Locustella luscinioides*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
							x	x	x	x	x	x							
Dates extremes estivals		arribada		2-5-1999				2009			arribada		-						
		marxa		19-10-1999							marxa		-						
Nidificació		Anterior a 2009			segura					probable		x	possible				no detectat		
		2009			segura					probable			possible				no detectat		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes								rupícoles						pinedes i alzinars			
		conreus i erms								màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera			

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Boscarla d'aigua (*Acrocephalus paludicola*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2009. Darreres observacions any 1998.

Boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x							

No observat el 2009. Darreres observacions any 1998.

Boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*)

Fenologia	sedentari		estival			?	hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x		x	x	x	x	x		
Dates extremes estivals		arribada		9-4-2009			2009		arribada		9-4-2009			
		marxa		4-11-2004					marxa		26-10-2009			
Nidificació		Anterior a 2009		segura			probable		x	possible		no detectat		
		2009		segura			probable			possible		x	no detectat	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						
		conreus i erms						màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			

Com sempre ha estat abundant al pas postnupcial. Destaquem l'observació del 9-4-2009 ja que passa a ser el registre més primerenc que hem obtingut del pas prenupcial al Parc del Foix.

Boscarla menjamosquits (*Acrocephalus palustris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2009. Darreres observacions any 1999.

Balquer (*Acrocephalus arundinaceus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		10-4-06(MBLA)				2009			arribada		21-4-2009		
	marxa		24-9-09(MOVA)							marxa		24-9-09(MOVA)		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable				augmenta			

El 6-7-2009 s'observa un adult que treu un sac fecal del niu. El 24-9-2009 s'anella un exemplar, aquesta citació allarga el registre més tardà que teníem.

Bosqueta pàl·lida (*Hippolais opaca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2009. Darreres observacions any 1973 (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Bosqueta vulgar (*Hippolais polyglotta*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		22-4-2008			2009			arribada		4-5-2009			
	marxa		24-9-2009						marxa		24-9-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible				no detectat		
	2009		segura		x	probable		possible				no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

Cal destacar l'observació del 24-9-2009 que esdevé la citació més tardana obtinguda fins el moment al Parc del Foix.

Tallarol de casquet (*Sylvia atricapilla*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta		x		

Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any, més nombroses durant els passos migratoris.

Tallarol gros (*Sylvia borin*)

Fenologia	sedentari		estival ?			hivernant			de pas x		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
					x	x	x	x	x	x			

Dates extremes estivals	arribada	5-5-2008	2009	arribada	-
	marxa	23-10-2001		marxa	12-10-2009

El 18-9-2009 observem un exemplar menjant fruits d'évol (*Sambucus ebulus*).

Tallarol emmascarat (*Sylvia hortensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x		x					

No observat el 2009. Darrera observació anys 2005 i 2008.

Tallareta vulgar (*Sylvia communis*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x			x	x	x				
Dates extremes migrants	pr. citació		17-4-2004			2009	pr. citació		-					
	últ. citació		12-5-1999				últ. citació		-					
	pr. citació		22-8-2000				pr. citació		17-9-2009					
	últ. citació		12-10-1998				últ. citació		11-10-2009					

S'ha vist únicament al pas de tardor. Destaquem l'observació del 11-10-2009 per ser molt tardana, que gairebé iguala la data extrema que tenim recollida.

Tallareta cuallarga (*Sylvia undata*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars						
	conreus i erms			màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any.

Tallarol de garriga (*Sylvia cantillans*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
			x	x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	arribada	29-3-2003				2009				arribada		29-3-2009			
	marxa	22-5-1999								marxa		15-4-2009			
	arribada	13-8-2005								arribada		17-9-2009			
	marxa	9-10-2001								marxa		9-10-2009			

Interessants observacions obtingudes durant els dos passos migratoris. Casualment la primera i la darrera citacions de l'any igualen els registres extrems obtinguts al Parc fins al moment.

Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms			x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera					

Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	
----------------------------------	------------	--	---------	---	----------	--

El 4-8-2009 es veuen joves. És l'espècie que s'observa amb més freqüència als diferents indrets del Parc (93% de les 123 sortides del 2009).

Mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada	23-3-2006				2009			arribada	29-3-2009				
	marxa	11-9-2003							marxa	4-9-2009				
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				x
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

Les dades obtingudes ens indiquen que es manté la població nidificant del Parc.

Mosquiter xiulaire (*Phylloscopus sibilatrix*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x				x						

No observat el 2009. Darrera observació anys 1977, 2005, 2007 i 2008.

Mosquiter ibèric (*Phylloscopus ibericus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
					x									

El 4-5-2009 es produeix la primera citació de l'espècie al Parc del Foix. També és el primer i únic registre d'aquesta espècie corresponent a les comarques del Penedès. Es va observar un exemplar cantant en un arbre als entorns de la cua de l'embassament. La citació encaixa perfectament amb la majoria d'observacions que s'han realitzat a Catalunya, on per ara es considera el mosquiter ibèric un migrant escàs. Aquesta és una espècie que ha estat descrita fa pocs anys. Fins fa poc temps es considerava una subespècie del mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*). Actualment se la reconeix com un altre taxó. En tot cas és una espècie encara poc estudiada i de la qual es disposa de molt poques citacions al nostre país.

Mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x	
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any, sobretot d'exemplars hivernants, però també d'unes poques parelles reproductores.

Mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
			x	x	x		x	x	x	x					

Dates extremes migrants	pr. citació	28-3-2005	2009	pr. citació	28-3-2009
	últ. citació	12-5-2003		últ. citació	27-4-2009
	pr. citació	28-7-2007		pr. citació	19-8-2009
	últ. citació	15-10-2000		últ. citació	1-10-2009

Observacions habituals de l'espècie durant els passos migratoris. Destaquem l'observació del 28-3-2009 que iguala la més primerenca que teníem.

Reietó (*Regulus regulus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		25-3-2004			2009			marxa		5-2-2009		
	arribada		20-10-1998						arribada		-		

Tan sols es va detectar els mesos de gener i febrer.

Bruel (*Regulus ignicapillus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant	x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				x
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable		x	augmenta			

Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any.

Papamosques gris (*Muscicapa striata*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada	9-4-2000				2009			arribada	19-5-2009				
	marxa	8-10-1999							marxa	18-9-2009				
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 3-6-2009 s'observen polls volanders fara el niu.

Mastegatxes (*Ficedula hypoleuca*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		9-4-2009				2009	pr. citació		9-4-2009					
	últ. citació		13-5-2001					últ. citació		25-4-2009					
	pr. citació		4-8-2009					pr. citació		4-8-2009					
	últ. citació		9-10-1998					últ. citació		18-9-2009					

Aquesta espècie al Parc del Foix es comporta com a estrictament migradora. El registre del 9-4-2009 esdevé el més primerenc del pas prenupcial i el registre del 4-8-2009 el més primerenc del pas postnupcial.

Mallerenga cuallarga (*Aegithalos caudatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				x	
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta					

El 23-4-2009 observem una parella, un dels exemplars té la cua torçada, probablement a causa que està covant al niu. El 4-8-2009 es veuen joves (l'observació és una mica tardana).

Mallerenga emplomallada (*Parus cristatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat				
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x	
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta					

Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any.

Mallerenga petita (*Parus ater*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					x
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					

Continua la tendència a l'augment, es va estenent per les zones boscoses del Parc.

Mallerenga blava (*Parus caeruleus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 27-5-2009 i el 17-7-2009 s'observen polls volant fora el niu. El 30-7-2009 observem un grup de joves.

Mallerenga carbonera (*Parus major*)

[illegible]

Nidificació	Anterior a 2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
	2009	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100			Més de 100	x	
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		x
de cria	conreus i erms		x	màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		x
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable		x	augmenta		

El 27-5-2009, 8-6-2009, 26-6-2009, 30-6-2009 i el 6-7-2009 s'observen polls volanders. El 29-7-2009, el 30-7-2009 i el 4-8-2009 observem grups de joves.

Pela-roques (*Tichodroma muraria*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x												

Es recullen les citacions de l'Anuari d'ornitologia de Catalunya. 2002-2005 publicades per l'Institut Català d'Ornitologia. Corresponen al 18-1-2004 (VPRA) i el 14-2-2004 (SSAA), que es va observar un exemplar en unes cingleres d'Olèrdola, a molt poca distància dels límits septentrionals del Parc del Foix.

Raspinell (*Certhia brachydactyla*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x		
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta					

El 8-6-2009 s'observen polls volanders.

Teixidor (*Remiz pendulinus*)

Fenologia	sedentari		estival		?	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		4-4-2007			2009			marxa		19-3-2009		
	arribada		26-8-2008						arribada		26-10-2009		

Observacions habituals de l'espècie durant la hivernada. Es manté una petita població hivernant.

Oriol (*oriolus oriolus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		16-4-2006			2009			arribada		23-4-2009			
	marxa		11-9-2004						marxa		26-8-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

Observacions habituals de l'espècie durant el període reproductor.

Botxí (*Lanius meridionalis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

S'ha observat poques vegades a les muntanyes del Parc. Caldrà seguir les seves poblacions per comprovar si es continuen mantenint estables o si han entrat en regressió com a altres zones del país.

Capsigrany (*Lanius senator*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		9-4-2000			2009			arribada		24-4-2009			
	marxa		28-8-2002						marxa		29-7-2009			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat				
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles			pinedes i alzinars					
	conreus i erms				x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 24-4-2009 s'observa una parella que mostra actituds de zel, a l'endemà defensa ja un territori.

Gaig (*Garrulus glandarius*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x		
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta					

El 6-7-2009 s'observen exemplars juvenils.

Garsa (*Pica pica*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable			augmenta		x		

El 6-7-2009 un exemplar intervén al niu. Ha augmentat la seva presència als voltants de l'embassament.

Gralla (*Corvus monedula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x			x	x			x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible			no detectat		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			

No observat el 2009. Darreres observacions any 1999, 2000 i 2001.

Corb (*Corvus corax*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			probable			possible		x	no detectat		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable			augmenta			

Durant els mesos de març i abril una parella de corbs va preparar un niu a la Timba, però finalment no s'hi va reproduir. Sembla que ho podria haver fet a un altre indret del Parc, on hi hem trobat un altre niu passada l'època de cria, però caldrà confirmar-ho.

Estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100				Més de 100		x
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x	augmenta			

El 27-5-2009 un grup de polls volanders i adults està menjant fruits de morera (*Morus alba*).

Estornell negre (*Sturnus unicolor*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x	
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable			x		augmenta			

El 21-4-2009 s'observa una parella que construeix niu.

Pardal comú (*Passer domesticus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants	1 a 10		10 a 100		Més de 100		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		x	rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms		x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		x	estable		augmenta	

El 29-7-2009 observem un pardal que porta becada.

Pardal xarrec (*Passer montanus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat	
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars			
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta		

El 3-6-2009 s'observen polls volanders que fa poc han abandonat el niu.

Pardal roquer (*Petronia petronia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2009		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				x	pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable			x	augmenta			

Observacions habituals de l'espècie durant l'any.

Pinsà comú (*Fringilla coelebs*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				
Dates extremes	marxa		3-4-2004			2009			marxa							
hivernants	arribada		10-8-2007						arribada							

El 7-3-2009 s'anota un exemplar que canta, la qual cosa denota uns possibles indicis de reproducció. El 10-8-2009 s'observa un mascle. Aquesta observació tant podria correspondre a un exemplar en dispersió postnupcial com a un probable exemplar reproductor.

Pinsà mec (*Fringilla montifringilla*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x									x	x	x

No observat el 2009. Darrera observació anys 2004, 2005 i 2008.

Gafarró (*Serinus serinus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes	x	rupícoles		pinedes i alzinars	x
	conreus i erms	x	màquies i garrigues	x	z. humides/bosc ribera	x
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable	x	augmenta

Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any.

Verdum (*Carduelis chloris*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars						
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta					
Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any.																

Cadèrnera (*Carduelis carduelis*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant	x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents	zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 8-6-2009 i el 30-6-2009 s'observen polls volanders. El 1-9-2009 i el 11-9-2009 s'anoten un grups familiars.

Lluer (*Carduelis spinus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		X		XI	XII	
	x	x	x								x		x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		28-3-2008			2009			marxa		26-1-2009				
	arribada		1-10-2005						arribada		24-10-2009				

Poques observacions d'aquesta espècie irruptiva.

Passerell (*Carduelis cannabina*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta					

Observacions habituals de l'espècie durant tot l'any.

Trencapinyes (*Loxia curvirostra*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x			x	x	x		x	x			

No observat el 2009. Darrera observació anys 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 i 2008.

Pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant	x	de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x				x						x	x

No observat el 2009. Darrera observació anys 2004, 2005 i 2008.

Durbec (*Coccothraustes coccothraustes*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant	x	de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x						x	x	x
Dates extremes hivernants	marxa		1-4-2006			2009			marxa		28-3-2009	
	arribada		15-10-2005						arribada		24-10-2009	

El 21-3-2009 s'observa una parella d'exemplars amb un comportament de possible zel. De tota manera posteriorment no es van tornar a observar.

Sit blanc (*Plectrophenax nivalis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x											

No observat el 2009. Darreres observacions el 15-1-2004.

Verderola (*Emberiza citrinella*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant	x	de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x		x							x		x

No observat el 2009. Darreres observacions any 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 i 2007.

Gratapalles (*Emberiza cirulus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura			x	probable			possible			no detectat		
	2009		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable		x	augmenta			

El 11-9-2009 s'observa un grup de 10 exemplars format per adults i joves.

Sit negre (*Emberiza cia*)

Fenologia	sedentari	?	estival				hivernant	x	de pas			x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x		x					x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura				probable		x	possible				no detectat	
	2009		segura				probable			possible				no detectat	x
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				

A l'octubre es van observar exemplars en migració des del Turó de les Tres Partions.

Hortolà (*Emberiza hortulana*)

Fenologia	sedentari				estival		?	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
						x													
Nidificació		Anterior a 2009		segura			probable		x	possible			no detectat						
		2009		segura			probable			possible			no detectat		x				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars					
		conreus i erms						màquies i garrigues				x		z. humides/bosc ribera					

No observat el 2009. Darreres observacions any 2003.

Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
	x	x	x							x	x	x						
Dates extremes hivernants	marxa		28-3-2005				2009				marxa		4-3-2009					
	arribada		14-10-2005								arribada		12-11-2009					

El 12-11-2009 hi ha uns 20 exemplars que entren a la joca. Un exemplar anellat al pantà l'hivern del 2004, aquest estiu (el 31-7-2009) s'ha recuperat a Txèquia.

Cruixidell (*Emberiza calandra*)

Fenologia	sedentari	?	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x				x	x	x			
Nidificació	Anterior a 2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2009		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable				augmenta			

El 19-5-2009 un mascle canta i marca territori prop de la cua del pantà. A l'hivern se segueix observant a la joca.

- Espècies al·lòctones -

Ànec mut (*Cairina moschata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x	x			

El 26-8-2009 i en dies posteriors s'observa un exemplar a la cua de l'embassament. Aquesta espècie a l'embassament del Foix ja s'hi havia observat, però en tractar-se d'un ànec que és criat a algunes masies i granges no s'hi havia donat importància. Els exemplars observats, suposadament han estat alliberats o escapats.

Ànec carolí (*Aix sponsa*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
			x	x															

No observat el 2009. Darreres observacions any 2002.

Ànec mandarí (*Aix galericulata*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x			

El 18-12-2009 es va observar una femella, de primer junt amb 2 ànecs collverds i després volant.

Ànec domèstic (*Anas peking* / *Anas platyrhynchos* var. *domestica*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x		x	x							x	x

Fins al moment no anotàvem aquesta espècie, ja que es tracta d'exemplars alliberats o escapats. Al 2009 s'ha observat durant diversos mesos.

Periquito (*Melopsittacus undulatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x								

No observat el 2009. Darreres observacions any 2005 i 2007.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x		x		

No observat el 2009. Darreres observacions any 2001 i 2005.

Cotorra de pit gris (*Myiopsitta monachus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x			x				

No observat el 2009. Darreres observacions anys 1998 i 2000.

Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
						x		x				

No observat el 2009. Darreres observacions any 2005.

Lloro de la Patagònia (*Cyanoliseus patagonus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
							x					

No observat el 2009. Darreres observacions any 2001.

Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves (*Lamprotornis chalybaeus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
												x

No observat el 2009. Darreres observacions any 2004.

Teixidor social (*Ploceus cucullatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2009. Darreres observacions any 2004.

Bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
						x	x	x	x	x	x	

Observats diverses vegades fins a un màxim de 6 exemplars entre juliol i novembre. Sembla que s'hi ha establert una petita població entre l'embassament i la riera de Marmellar.

Bec de corall cuanegre (*Estrilda troglodytes*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x		x				x	x

El 17-7-2009 s'observa un exemplar que canta.

Vídua de cua d'agulla (*Vidua macroura*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2009. Darreres observacions any 2007.

Gafarró de front groc (*Serinus mozambicus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2009. Darreres observacions any 2005.

Es recull un resum de les citacions del 2009 d'altres vertebrats del Parc del Foix.

PEIXOS

Anguila (*Anguilla anguilla*) – 2-9-2009, 18-9-2009.

Alburn (*Alburnus alburnus*) – 9-4-2009, 23-4-2009, 19-5-2009, 23-5-2009, 8-6-2009, 26-6-2009, 6-7-2009, 24-7-2009, 4-8-2009, 26-10-2009.

Barb comú (*Barbus graellsii*) – No observat el 2009.

Barb cua-roig (*Barbus haasi*) – No observat el 2009.

Carpí vermell (*Carassius auratus*) – 23-4-2009, 8-6-2009, 18-9-2009.

Madrilla (*Chondrostoma miegii*) – No observat el 2009.

Carpa (*Cyprinus carpio*) – 19-3-2009, 29-3-2009, 23-4-2009, 4-5-2009, 27-5-2009, 8-6-2009, 26-6-2009, 6-7-2009, 17-7-2009, 24-7-2009, 4-8-2009, 10-8-2009, 12-8-2009, 19-8-2009, 26-8-2009, 2-9-2009, 11-9-2009, 15-9-2009, 18-9-2009, 26-10-2009, 27-11-2009, 7-12-2009.

Bagra comuna (*Squalius cephalus*) – No observat el 2009.

Gambúsia (*Gambusia holbrooki*) – 23-4-2009, 4-5-2009, 27-5-2009, 26-6-2009, 6-7-2009, 17-7-2009, 4-8-2009, 19-8-2009, 26-8-2009, 2-9-2009, 18-9-2009, 24-9-2009, 1-10-2009, 26-10-2009, 27-11-2009.

Peix gat (*Ameiurus melas*) – No observat el 2009.

Silur (*Silurus glanis*) – No observat el 2009.

AMFIBIS

Salamandra (*Salamandra salamandra*) – 12-1-2009, 25-1-2009, 14-3-2009, 29-3-2009, 19-11-2009, 28-11-2009.

Tòtil (*Alytes obstetricans*) – 21-3-2009.

Gripauet (*Pelodytes punctatus*) – 9-4-2009, 14-4-2009, 9-10-2009, 8-11-2009.

Gripau comú (*Bufo bufo*) – 5-2-2009, 25-2-2009, 4-3-2009, 19-3-2009, 19-5-2009.

Gripau corredor (*Bufo calamita*) – 15-4-2009, 27-8-2009, 14-9-2009, 12-10-2009.

Reineta comuna (*Hyla meridionalis*) – 29-3-2009, 9-4-2009, 24-4-2009, 25-4-2009.

Granota verda (*Rana perezi*) – 14-3-2009, 19-3-2009, 21-3-2009, 28-3-2009, 29-3-2009, 9-4-2009, 21-4-2009, 23-4-2009, 24-4-2009, 27-4-2009, 4-5-2009, 11-5-2009, 19-5-2009, 23-5-2009, 8-6-2009, 26-6-2009, 17-7-2009, 29-7-2009, 14-9-2009, 12-10-2009, 26-10-2009.

RÈPTILS

Tortuga mediterrània (*Testudo hermanni*) – 26-5-2009.

Tortuga mora (*Testudo graeca*) - No observat el 2009.

Tortuga de rierol (*Mauremys leprosa*) – 23-4-2009, 4-5-2009, 19-5-2009, 23-5-2009, 27-5-2009, 29-7-2009, 26-8-2009, 1-9-2009, 2-9-2009, 1-10-2009, 9-10-2009, 27-11-2009.

Tortuga d'estany (*Emys orbicularis*) – 17-7-2009, 2-9-2009.

Tortuga d'aigua americana (Tortuga de temples roges) (*Trachemys scripta elegans*) – 4-3-2009, 14-3-2009, 19-3-2009, 29-3-2009, 23-4-2009, 27-4-2009, 4-5-2009, 11-5-2009, 19-5-2009, 23-5-2009, 26-6-2009, 6-7-2009, 17-7-2009, 4-8-2009, 10-8-2009, 14-8-2009, 19-8-2009, 26-8-2009, 1-9-2009, 2-9-2009, 18-9-2009, 24-9-2009, 1-10-2009, 9-10-2009, 26-10-2009.

Tortuga d'aigua americana (Tortuga d'orelles grogues) (*Trachemys scripta scripta*) – 23-4-2009, 23-5-2009, 4-8-2009, 14-8-2009, 19-8-2009, 24-9-2009, 1-10-2009.

Tortuga d'aigua americana (*Trachemys scripta troostii*)- estiu

Tortuga d'aigua de Nicaragua (*Trachemys emolli*) - estiu

Tortuga comuna de Florida (*Pseudemys floridiana*) – No observat el 2009.

Tortuga tova xinesa (*Pelodiscus sinensis*) – No observat el 2009.

Tortuga mapa ianqui (*Graptemys pseudogeographica*) - No observat el 2009.

Dragó comú (*Tarentola mauritanica*) – 9-4-2009, 23-4-2009, 4-5-2009, 27-5-2009, 8-6-2009, 26-6-2009, 6-7-2009, 17-7-2009, 9-8-2009, 19-8-2009, 2-9-2009, 11-9-2009, 18-9-2009, 24-9-2009, 1-10-2009, 9-10-2009, 11-10-2009, 26-10-2009, 3-11-2009, 8-11-2009, 14-11-2009.

Dragó rosat (*Hemidactylus turcicus*) – No observat el 2009.

Llargandaix ocel.lat (*Lacerta lepida*) – 27-4-2009, 24-7-2009, 22-8-2009, 19-9-2009.

Sargantana ibèrica (*Podarcis hispanica*) – 7-3-2009, 12-10-2009.
Sargantaner gros (*Psammodromus algirus*) – 30-7-2009, 9-8-2009, 15-8-2009, 19-8-2009, 8-9-2009, 12-9-2009, 18-9-2009, 26-9-2009, 12-10-2009.
Vidriol (*Anguis fragilis*) – 12-10-2009, 18-12-2009.
Serp de ferradura (*Coluber hippocrepis*) – 9-8-2009.
Serp blanca (*Elaphe scalaris*) – No observat el 2009.
Serp llisa meridional (*Coronella girondica*) – No observat el 2009.
Serp verda (*Malpolon monspessulanus*) – 9-8-2009, 26-8-2009, 3-10-2009.
Serp d'aigua (*Natrix maura*) – 8-6-2009, 2-9-2009.
Colobra de collar (*Natrix natrix*) – No observat el 2009.
Escorçó ibèric (*Vipera latasti*) - No observat el 2009.

MAMÍFERS

Eriçó clar (*Atelerix algirus*) – 19-5-2009.
Musaranya comuna (*Crociodura russula*) – 4-5-2009, 10-10-2009.
Musaranya nana (*Suncus etruscus*) – No observat el 2009.
Ratpenat de ferradura gran (*Rhinolophus ferrumequinum*) – 9-10-2009.
Ratpenat de ferradura petit (*Rhinolophus hipposideros*) – No observat el 2009.
Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*) - 9-10-2009.
Ratpenat d'Escalera (*Myotis escaleraei*) – 15-4-2009, 8-10-2009, 9-10-2009, 12-10-2009.
Ratpenat de musell llarg (*Myotis myotis*) – 14-9-2009.
Ratpenat d'aigua (*Myotis daubentonii*) – 12-11-2009.
Ratpenat de peus grans (*Myotis capaccinii*) – No observat el 2009.
Ratpenat noctul petit (*Nyctalus leisleri*) – No observat el 2009.
Ratpenat comú (*Pipistrellus pipistrellus*) – 14-3-2009, 12-8-2009, 14-9-2009, 9-10-2009, 12-11-2009, 19-11-2009, 28-11-2009.
Ratpenat soprano (*Pipistrellus pygmaeus*) – 14-3-2009, 28-3-2009, 29-3-2009, 12-8-2009, 26-8-2009, 14-9-2009, 9-10-2009, 11-10-2009, 12-11-2009, 14-11-2009, 28-11-2009.
Ratpenat de vores clares (*Pipistrellus kuhli*) – 14-3-2009, 12-8-2009, 14-9-2009, 9-10-2009, 12-11-2009, 14-11-2009, 19-11-2009.
Ratpenat muntanyenc (*Hypsugo savii*) – 12-8-2009.
Ratpenat dels graners (*Eptesicus serotinus*) – 12-8-2009, 14-9-2009.
Ratpenat orellut meridional (*Plecotus austriacus*) – 11-5-2009, 14-9-2009, 28-11-2009.
Ratpenat de cova (*Miniopterus schreibersii*) - No observat el 2009.
Ratpenat cuallarg (*Tadarida teniotis*) – 14-9-2009, 9-10-2009.
Llebre (*Lepus europaeus*) – No observat el 2009.
Llebre ibèrica (*Lepus granatensis*) - No observat el 2009.
Conill (*Oryctolagus cuniculus*) – 11-1-2009, 12-1-2009, 26-1-2009, 5-2-2009, 4-3-2009, 19-3-2009, 21-3-2009, 29-3-2009, 9-4-2009, 14-4-2009, 24-4-2009, 25-4-2009, 27-4-2009, 4-5-2009, 27-5-2009, 3-6-2009, 8-6-2009, 6-7-2009, 17-7-2009, 24-7-2009, 30-7-2009, 4-8-2009, 9-8-2009, 19-8-2009, 26-8-2009, 5-9-2009, 11-9-2009, 17-9-2009, 24-9-2009, 4-10-2009, 8-10-2009, 9-10-2009, 11-10-2009, 12-10-2009, 26-10-2009, 4-11-2009, 8-11-2009, 14-11-2009, 19-11-2009, 27-11-2009, 28-11-2009, 17-12-2009, 18-12-2009, 27-12-2009.
Esquirol (*Sciurus vulgaris*) – 12-1-2009, 22-1-2009, 26-1-2009, 5-2-2009, 12-2-2009, 25-2-2009, 14-3-2009, 19-3-2009, 29-3-2009, 9-4-2009, 23-4-2009, 25-4-2009, 27-4-2009, 4-5-2009, 19-5-2009, 23-5-2009, 27-5-2009, 3-6-2009, 26-6-2009, 29-6-2009, 24-7-2009, 29-7-2009, 4-8-2009, 9-8-2009, 19-8-2009, 2-9-2009, 4-9-2009, 11-9-2009, 18-9-2009, 4-10-2009, 11-10-2009, 12-10-2009, 26-10-2009, 3-11-2009, 14-11-2009, 19-11-2009, 22-11-2009, 27-11-2009, 28-11-2009, 7-12-2009, 17-12-2009, 27-12-2009.
Rata cellarda (*Eliomys quercinus*) – No observat el 2009.
Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*) – 24-4-2009.
Rata negra (*Rattus rattus*) – 8-2-2009.
Rata comuna (*Rattus norvegicus*) – 8-2-2009, 12-10-2009, 3-11-2009.
Ratolí domèstic (*Mus musculus*) – No observat el 2009.
Ratolí mediterrani (*Mus spretus*) – 11-9-2009.
Rata d'aigua (*Arvicola sapidus*) – 30-11-2009.
Talpó comú (*Microtus duodecimcostatus*) – 3-1-2009, 12-1-2009, 22-1-2009, 26-1-2009, 25-2-2009, 4-3-2009, 29-3-2009, 23-4-2009, 4-5-2009, 3-6-2009, 8-6-2009, 17-7-2009, 24-7-2009, 29-7-2009, 4-10-2009, 26-10-2009, 14-11-2009, 27-11-2009, 30-11-2009, 17-12-2009, 18-12-2009, 27-12-2009.

Senglar (*Sus scrofa*) – 3-1-2009, 11-1-2009, 12-1-2009, 22-1-2009, 25-1-2009, 5-2-2009, 25-2-2009, 28-2-2009, 4-3-2009, 19-3-2009, 28-3-2009, 29-3-2009, 14, 4, 2009, 15-4-2009, 23-4-2009, 27-4-2009, 4-5-2009, 27-5-2009, 3-6-2009, 26-6-2009, 28-7-2009, 9-8-2009, 12-8-2009, 19-8-2009, 2-9-2009, 8-9-2009, 11-9-2009, 17-9-2009, 1-10-2009, 4-10-2009, 8-10-2009, 9-10-2009, 12-10-2009, 26-10-2009, 4-11-2009, 12-11-2009, 14-11-2009, 19-11-2009, 27-11-2009, 28-11-2009, 30-11-2009, 7-12-2009, 17-12-2009, 27-12-2009.

Guineu (*Vulpes vulpes*) – 11-1-2009, 28-2-2009, 14-4-2009, 4-3-2009, 9-4-2009, 21-4-2009, 4-5-2009, 23-5-2009, 23-5-2009, 27-5-2009, 3-6-2009, 8-6-2009, 26-6-2009, 29-6-2009, 6-7-2009, 17-7-2009, 29-7-2009, 4-8-2009, 9-8-2009, 19-8-2009, 26-8-2009, 29-8-2009, 1-9-2009, 2-9-2009, 11-9-2009, 18-9-2009, 30-9-2009, 4-10-2009, 12-10-2009, 4-11-2009, 26-10-2009, 8-11-2009, 14-11-2009, 28-11-2009, 17-12-2009, 18-12-2009, 27-12-2009.

Mostela (*Mustela nivalis*) – 24-10-2009.

Fura (*Mustela putorius*) - No observat el 2009.

Visó americà (*Mustela vison*) – No observat el 2009.

Fagina (*Martes foina*) – 14-11-2009.

Llúdriga (*Lutra lutra*) - No observat el 2009.

Toixó (*Meles meles*) – 26-1-2009, 4-3-2009, 29-3-2009, 15-4-2009, 24-4-2009, 27-5-2009, 24-7-2009, 9-8-2009, 11-9-2009, 12-10-2009, 24-10-2009, 26-10-2009, 27-11-2009, 17-12-2009, 27-12-2009.

Gat mesquer (*Genetta genetta*) - 12-10-2009.