

PARC DEL FOIX

MEMÒRIA ORNITOLÒGICA DEL 2010

Recull de dades i textos a càrrec
de Cisco Guasch, Humbert Salvadó i Xavier Bayer.



Merla roquera (*monticola saxatilis*)

sumari

Sortides realitzades durant l'any
Nivell de les aigües a l'embassament
Meteorologia
Acció de l'home sobre el medi
Activitats diverses
El programa SOCC
Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix
El programa PERNIS i les migracions postnupcials
Censos d'ocells aquàtics
Resum de la campanya d'anellament 2010
Els ocells del Parc del Foix el 2010
Annex 1 - Observacions d'altres vertebrats

En l'elaboració de la memòria ornitològica del 2010 han participat en alguna sortida i/o han aportat dades les següents persones (directament o a través de l'ORNITHO.CAT):

Daniel Imbernón Vigara (DIVA)
Joan Guash González (JGGF)
Josep Guasch Marlès (JGMX)
Manel Bonilla López (MBLA)
Marc Olivé Vázquez (MOVA)
Marc Peris Miras (MPMB)
Martí Cardona Melgarejo (MCMF)
Rafa Jiménez Rodríguez (RJRA)
Tomàs Pulido Enrique (TPEA)
Toni Llobet François (TLFA)
Xavier Parra Cuenca (XPCA)

A les quals agraïm la seva col·laboració.

Entre parèntesi indiquem el codi utilitzat en el text per a cada persona.

Les observacions d'anys anteriors que es citen, apareixen al text seguides entre parèntesi de les inicials de la persona que en el seu moment ens va facilitar les dades: Antonio Somalo Alique (ASA), Eduardo Fernandez Martín (EFM), Pere Xavier Albornà Rovira (PARA), Pere Mestre Raventós (PMRA), Pedro Torres Expósito (PTEA), Sergi Sales Asensio (SSAA) i Vittorio Pedrochi Rius (VPRA).

Les dades i observacions que no van seguides de cap codi d'inicials, cal atribuir-les a l'equip redactor de la memòria.

* Sortides realitzades durant l'any


Durant aquest any 2010 s'ha fet un total de 111 sortides al Parc del Foix que han suposat un total de 337 hores i 10 minuts. En aquestes 111 sortides s'han recollit un total de 3.782 registres.

A més de les sortides específiques per recollir informació de camp s'han realitzat diferents actuacions per tal de completar la màxima informació sobre les aus del Parc del Foix. Per setè any s'han realitzat sessions d'anellament; en total s'hi ha participat en 16 jornades. També s'han recollit dades que han estat cedides per diferents col·laboradors (forestals, ornitòlegs, aficionats...). En total, a més dels 3.782 registres d'ocells, se n'han recollit 262 dels col·laboradors i dels anellaments. Així doncs, el total ha estat de 4.044 registres.

1er. trimestre	25 sortides	73 h. 15 min.	gener	9 sortides
			febrer	7 sortides
			març	9 sortides
2on. trimestre	28 sortides	91 h. 20 min.	abril	11 sortides
			maig	11 sortides
			juny	6 sortides
3er. trimestre	32 sortides	101 h. 40 min.	juliol	5 sortides
			agost	10 sortides
			setembre	17 sortides
4rt. trimestre	26 sortides	70 h. 55 min.	octubre	11 sortides
			novembre	8 sortides
			desembre	7 sortides
TOTAL 2010	111 sortides	337 h. 10 min.		

* Nivell de les aigües a l'embassament

A l'embassament el nivell de les aigües s'ha mantingut pràcticament al màxim durant tot l'any. Tan sols entre meitats de juliol i meitats d'agost es va notar una lleugera baixada del nivell que va arribar aproximadament uns 40 centímetres per sota de la cota de nivell ple. Així doncs, no s'han produït les baixades habituals dels darrers anys, en què durant dos o tres mesos es formaven platges a la cua de l'embassament.



* Meteorologia

La mitjana de totes les temperatures de l'any 2010 ha estat inferior a la mitjana climàtica dels darrers anys a pràcticament tot Catalunya (segons el Servei Meteorològic de Catalunya). Es considera el 2010 un dels anys més freds de les dues darreres dècades. Pel que fa a les precipitacions, el 2010 ha estat plujós, més que els darrers anys. Hi ha hagut 7 mesos que s'han superat els 50 litres/m² de pluges. La

taula següent mostra les temperatures mitjanes mensuals i les pluges recollides a l'estació meteorològica del Departament d'Agricultura situada al costat de la riera de Llitrà.

Temperatures	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	set.	oct.	nov.	des.
Mitjana °C	7,21	7,51	9,45	13,67	15,76	19,6	24,45	23,44	19,95	15,6	10,21	7,64
Plugues	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	set.	oct.	nov.	des.
Litres/m ²	65,2	58,2	67,4	12,3	14,5	50,4	3,0	72,7	55,5	91,6	9,8	13,6

*** Acció de l'home sobre el medi**

Des de la posta en marxa del Parc del Foix s'han produït moltes millores des d'una òptica de conservació i protecció de la natura. També s'ha treballat molt per tal d'informar i conscienciar al públic que visita l'espai natural.

Com en anys anteriors hem seguit anotant accions irregulars que caldria evitar: gossos abandonats, gent pescant en zones d'accés restringit, abocament de deixalles.

3-1-2010 observatori d'aus trencat

3-1-2010 caçadors prop de la cua de l'embassament

17-7-2010 hi ha una tenda amb gent acampada al gual on s'uneix el Foix i la riera de Marmellar

17-7-2010 hi ha diversos pollastres morts abocats al gual on s'uneix el Foix i la riera de Marmellar

26-7-2010 hi ha una tenda amb gent acampada al fondo de l'Alzina

8-8-2010 hi ha una colla de pescadors al camp d'oliveres de la cua de l'embassament

3-11-2010 hi ha una borrasa muntada a mode de xarxa per pescar

7-11-2010 hi ha 12 pescadors al camp d'oliveres de la cua de l'embassament

També hem anotat que molts dissabtes i festius hi ha activitats de vol que poden perjudicar l'àliga cuabarrada. En concret el pas de parapents a motor per la zona del niu.



Fotos dels dies 8-8-2010 i 17-7-2010 respectivament



Fotos dels dies 17-7-2010 i 3-11-2010 respectivament

* Activitats diverses

1- S'ha deixat enllestit per a la seva publicació un treball sobre la fauna vertebrada del Parc del Foix a petició de la fundació "Catalunya i territori". En aquests moments està a impremta.

2- S'ha preparat una guia de flora i fauna del Parc del Foix, que el proper 2011 publicarà l'editorial Brau amb el suport del Consorci del Parc del Foix.

3- S'ha participat en diverses sortides amb tècnics de flora i fauna la Diputació de Barcelona. En un primer moment els vam ensenyar la descoberta d'una interessant localitat on hi creixen plantes de gran interès per al Parc. Sobretot en destaca la riquesa de geòfits tals com: **Tulipa silvestre** (*Tulipa sylvestris* subsp. *australis*), **Fritil·lària** (*Fritillaria nigra* subsp. *boissieri* = *F. hispanica*), **Marcet** (*Dipcadi serotinum*), **Calabruixa petita** (*Muscari neglectum*), **Abellera fosca** (*Ophrys fusca*), **Abellera del Marroc** (*Ophrys dyris*), **Caputxina tacada** (*Neotinea maculata*), **Pentecosta** (*Orchis morio*), **Talictre tuberós** (*Thalictrum tuberosum*), **Ranúncle de codina** (*Ranunculus gramineus*), **Espaseta, gladiol** (*Gladiolus illyricus*), **Lliri menut** (*Iris lutescens* subsp. *chamaeiris*), **All de bruixa** (*Allium roseum*) i **All capil·lar** (*Allium moschatum*). També uns quants teròfits com **Lleterola exigua** (*Euphorbia exigua*) i **Arenària de codina** (*Arenaria conimbricensis* subsp. *conimbricensis*), i camèfits com la **Candelera o Salvió blener** (*Phlomis lychnitis*) i la **Campaneta cabdellada** (*Convolvulus lanuginosus*).

Mercès a aquestes troballes, els tècnics ja han proposat algunes actuacions de cara a constituir una *Localitat d'Especial Interès per a la Conservació de la Flora* del Pla estratègic de conservació d'hàbitats i flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

En d'altres sortides es van recollir dades sobre invertebrats catalogats d'*Especial Interès per a la Conservació del Parc del Foix*.

4- Per Televisió de Catalunya, a través del CANAL 33, s'han seguit projectant alguns dels reportatges de natura i fauna realitzats en anys anteriors amb la participació dels components de l'associació Còbit, i que tenen relació amb el Parc del Foix.

* El programa SOCC

Aquest és el novè any que participem en el programa SOCC, amb un transsecte que transcorre per l'interior del Parc del Foix. D'entre les categories establertes des de l'ICO es participa en la de "mostreig en ambients mediterranis". El recorregut té el seu inici a cal Bladet i passa per cal Semison. Transcorre per diferents ambients naturals entre els quals hi ha la pineda, la brolla i els conreus. L'itinerari es realitza per partida doble, hi participen dos ornitòlegs. Les dates en què s'ha realitzat el SOCC són:

1er cens SOCC època hivernal – 15-1-2010 i 18-1-2010
1er cens SOCC època de nidificació – 16-4-2010 - 29-4-2010
2n cens SOCC època de nidificació – 17-5-2010 - 27-5-2010
2n cens SOCC època hivernal – 10-12-2010 - 23-12-2010

Les característiques i la metodologia d'aquest programa es poden consultar a les memòries ornitològiques dels anys anteriors i també a la pàgina web de l'Institut Català d'Ornitologia.

* Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix

Per una banda s'ha seguit per tretzè any amb la "Campanya de seguiment de migracions d'aus rapinyaires al Penedès". A més s'han organitzat altres activitats a l'entorn de les migracions d'ocells al Parc del Foix i a l'entorn de la natura. Es va programar un alliberament de rapinyaires al puig de l'Àliga i 4 sessions d'observació de les migracions des del turó de les Tres Partions.

El programa d'activitats ha estat el següent:

21-8-2010 – **Alliberament de rapinyaires** del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa

* a les 18 h. al Puig de l'Àliga, ocells en vol.

* a les 19,30 h. rutes a masos abandonats per alliberar mussols

5-9-2010 – **Observació migracions** - entre 10 i 14 h. Turó de les Tres Partions

12-9-2010 – **Observació migracions** - entre 10 i 14 h. Turó de les Tres Partions

19-9-2010 – **Observació migracions** - entre 10 i 14 h. Turó de les Tres Partions

2-10-2010 – **Observació migracions** - entre 10 i 14 h. Turó de les Tres Partions

Hem de destacar la nombrosa participació de públic a l'activitat del dia de l'alliberament d'aus rapinyaires. La jornada va ser un èxit, l'assistència va ser molt nombrosa, des de mainada fins a gent gran. Al Puig de l'Àliga hi van acudir més de 80 persones, mentre que a les rutes per alliberar els **mussols** hi van venir prop de 30 persones. A la tarda es van alliberar un **astor** i un **gamarús**, procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. Al vespre es van alliberar 10 **mussols** en 5 localitats diferents a l'entorn de masies abandonades. El gran interès i la sensibilització envers la natura per part del públic participant, van impulsar que diferents voluntaris es comprometessin a construir fins a 4 caixes niu per a mussols. En una setmana estaven penjades a zones properes al Parc, i el dissabte següent es feia l'alliberament de 8 **mussols** més en aquestes 4 caixes.



Moment dels alliberaments al Parc del Foix


En la sessió d'observació de migracions del 19-9-2010 es va aprofitar per realitzar una trobada d'ornitòlegs que realitzen seguiment de les migracions des d'altres zones de Catalunya i que formen part

del programa PERNIS de l'Institut Català d'Ornitologia. Hi van assistir fins a 14 persones, procedents del Ripollès, del Vallès, del Berguedà, del Barcelonès, del Garraf, del Penedès, etc... Cada any a nivell de Catalunya es realitza una trobada a una de les estacions del programa Pernis. Aquest any la trobada es va celebrar a l'estació del Parc del Foix situada al Turó de les Tres Partions.

* El programa PERNIS i les migracions postnupcials

Per vuitè any consecutiu s'ha dut a terme aquest programa al nostre país. Es tracta d'un programa de seguiment de les migracions d'aus rapinyaires a la tardor. Des del Parc del Foix també s'hi ha participat. El programa pretén crear una xarxa de seguiment de la migració de rapinyaires a Catalunya. Es coordina des de l'ICO. L'objectiu és conèixer les característiques del pas postnupcial, determinar les rutes migratòries i les tendències poblacionals al llarg dels anys. Es fan un total de 10 censos en sessions de 4 hores; de les 10 del matí a les 14 del migdia. Les sessions són setmanals i preferiblement cal fer-les en dissabte (o en tot cas entre divendres i dilluns).

En els quadres següents hi ha un resum de les observacions realitzades en el programa Pernis i també s'hi resumeixen les recollides en altres dates. En total han estat 1029 els ocells rapinyaires i planadors migrants que s'han vist en el pas postnupcial del 2010.



RESUM 2010	lloc	data	hores	espècies	exemplars
PERNIS 1	Turó de les Tres Partions	14/8	4:00	3	7
PERNIS 2	Turó de les Tres Partions	21/8	4:00	1	2
ALL. RAP.	Puig de l'Àliga	21/8	1:05	1	1
PERNIS 3	Turó de les Tres Partions	28/8	4:00	3	13
PERNIS 4	Turó de les Tres Partions	5/9	4:00	3	18
	Turó de les Tres Partions	6/9	2:00	5	17
PERNIS 5	Turó de les Tres Partions	12/9	4:30	3	62
	Turó de les Tres Partions	18/9	2:00	8	53
PERNIS 6	Turó de les Tres Partions	19/9	6:30	12	261
	Turó de les Tres Partions	21/9	1:40	1	1
	Turó de les Tres Partions	22/9	5:20	11	229
	Turó de les Tres Partions	24-9	1:15	4	42
	Turó de les Tres Partions	25-9	2:35	4	25
PERNIS 7	Turó de les Tres Partions	26-9	5:20	7	34
	Turó de les Tres Partions	27-9	2:55	3	7
	Turó de les Tres Partions	29-9	4:40	6	19
	Turó de les Tres Partions	1/10	2:00	5	9
PERNIS 8	Turó de les Tres Partions	2/10	4:00	4	8
	Turó de les Tres Partions	3/10	4:25	6	26
	Turó de les Tres Partions	5/10	3:30	6	31
	Turó de les Tres Partions	6/10	3:45	9	97
	Turó de les Tres Partions	7/10	1:05	3	4
PERNIS 9	Turó de les Tres Partions	8/10	4:00	3	6
	Turó de les Tres Partions	14/10	3:00	2	8
	Turó de les Tres Partions	15/10	1:30	4	7
PERNIS 10	Turó de les Tres Partions	16/10	4:30	4	10
	Turó de les Tres Partions	17/10	9:00	6	24
	Altres observacions puntuals	vàries		5	8
TOTALS		26 dies	96:35:00	17 (diferents)	1029

* Censos d'ocells aquàtics

** - Introducció -

Els resultats obtinguts durant el seguiment de les aus aquàtiques iniciats durant el període de tardor de 2007 i continuats durant el 2008 i 2009 van ser molt satisfactoris i reveladors de la dinàmica dels ocells al Pantà. La metodologia seguida ens ofereix poder treballar les dades objectivament. Durant l'any 2010 ens hem proposat continuar el treball iniciat per tal de donar més robustesa als resultats ja obtinguts fins el 2009. Els resultats així obtinguts, de manera comparativa ens donen una nova eina per la gestió del Parc i ens mostren el potencial de l'embassament com a punt de nidificació, hivernada i migració dels ocells aquàtics.

** - Metodologia proposada -

S'ha aplicat la metodologia establerta l'any 2007. Durant cada quinzena s'ha realitzat una sortida per recollir dades. S'estableix un període entre l'1 i el 15 de cada mes per realitzar un mostreig, i un altre entre el dia 16 i el darrer dia del mes.

A cada sessió es fa la visita de vuit estacions diferents situades a les vores de punts diversos de l'embassament. S'estableixen les vuit estacions següents:

- Aguait d'ocells
- Zona de bogues a la paret (camp d'oliveres)
- Canyissar de la cua

- Caseta d'en Segura
- La Marina
- La presa
- Fondo de l'Alzina
- Gual del Foix i Marmellar

La visita a aquestes estacions es fa sempre al matí a primera hora. Cal evitar de fer-la en dies festius o quan hi hagi massa afluència de públic als entorns de l'embassament. L'horari d'inici ha de quedar comprès entre la sortida del sol i una hora més tard. La visita a cadascuna de les estacions es fa sempre seguint el mateix ordre. A cada estació s'hi realitza un recull de dades durant 12 minuts. En aquest temps es van anotant la quantitat d'ocells de cadascuna de les espècies aquàtiques que s'observen i també la quantitat de les que hem considerat espècies a mostrejar pel fet que tenen força lligam amb el medi aquàtic. De la resta d'espècies tan sols s'anota la seva presència. La presa de dades es fa tant dels ocells que estan a la zona que s'observa, com dels que hi passen volant. En la fitxa de recollida de dades, també cal prendre nota de diversos aspectes referents a la climatologia, a l'observació visual de residus i contaminants, i el nivell de l'embassament. També s'han d'anotar tots aquells aspectes relacionats amb el comportament de les aus que puguin ser d'interès.

A la fitxa s'hi ha inclòs un seguit d'espècies indicadores entre les quals hi ha les aus aquàtiques més habituals a l'embassament i també altres ocells lligats als ambients naturals més aigualosos. S'han deixat espais en blanc on s'hi anoten altres aus aquàtiques menys habituals. A més, en un apartat final es pren nota de la diversitat d'altres espècies d'ocells observades o escoltades en el conjunt de la visita. I encara hi ha un darrer apartat on cal anotar els altres animals vertebrats (peixos, amfibis, rèptils i mamífers) que s'observen directament, s'escolten o es detecten a partir de rastres diversos.

Per tal de poder extreure i contrastar resultats entre les diferents quinzenes s'ha vetllat perquè durant la sessió hi hagi unes bones condicions que permetin el recull de les dades. Si en alguna de les estacions hi ha un factor que alteri o pugui alterar els resultats se'n pren nota. Tanmateix els dies en què les condicions ambientals han estat desfavorables (pluja o boira) hem ajornat la visita.

** - Resultats -

Durant el període de gener a desembre de 2010 s'han realitzat 24 mostreigs per recollir dades per al seguiment dels ocells aquàtics de l'embassament del Foix. Concretament s'han fet dos mostreigs per cada mes (un mostreig cada quinzena).

De les aus indicadores previstes en la fitxa patró s'han recollit observacions d'un total de 23 espècies. En concret les següents: *Anas platyrhynchos*, *Tachybaptus ruficollis*, *Phalacrocorax carbo*, *Egretta garzetta*, *Ardea cinerea*, *Circus aeruginosus*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Charadrius dubius*, *Tringa ochropus*, *Actitis hypoleucos*, *Larus ridibundus*, *Alcedo atthis*, *Motacilla cinerea*, *Motacilla alba*, *Luscinia svecica*, *Cettia cetti*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Phylloscopus collybita*, *Remiz pendulinus* i *Emberiza schoeniclus*.

A més, durant alguns dels mostreigs també s'han observat 11 espècies d'ocells aquàtics de presència poc habitual o més escassa a l'embassament. Aquest és el cas de *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Ardea purpurea*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Porphyrio porphyrio*, *Himantopus himantopus*, *Gallinago gallinago* i *Scolopax rusticola* que també s'observaren el 2008 o el 2009, a més, aquest any s'observa *Porzana porzana* i *Larus audouinii* per primera vegada als censos.

La següent taula mostra els resultats de les espècies indicadores i ocasionals d'ambients aquàtics de cada estació en les 24 visites que s'han realitzat seguint la metodologia establerta.



Rascló (*Rallus aquaticus*)

2010

	Estació 1	Estació 2	Estació 3	Estació 4	Estació 5	Estació 6	Estació 7	Estació 8	Total
	Aguait	Paret	Canyissar	Caseta	Marina	Presa	F. Alzina	Gual	Pantà
	valors mitjans del nº d'individus								
<i>Anas platyrhynchos</i>	8,33	4,67	0,46	2,83	10,33	7,75	0,63	0,38	35,38
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	0,71	0,46	0,00	0,79	0,79	0,50	0,83	0,04	4,13
<i>Phalacrocorax carbo</i>	2,04	47,63	0,25	6,42	5,83	1,96	0,17	0,13	64,42
<i>Egretta garzetta</i>	0,75	0,67	0,17	0,17	0,08	0,46	0,08	0,92	3,29
<i>Ardea cinerea</i>	1,75	5,08	0,38	5,79	4,92	2,83	0,38	0,58	21,71
<i>Circus aeruginosus</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Pandion haliaetus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rallus aquaticus</i>	0,63	0,08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
<i>Gallinula chloropus</i>	5,67	2,58	2,04	2,33	1,58	0,96	2,92	1,17	19,25
<i>Fulica atra</i>	1,54	0,79	0,04	0,42	1,42	0,54	0,42	0,00	5,17
<i>Charadrius dubius</i>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Tringa ochropus</i>	0,04	0,00	0,04	0,17	0,08	0,04	0,00	0,00	0,38
<i>Actitis hypoleucos</i>	0,21	0,25	0,00	0,08	0,33	0,17	0,00	0,04	1,08
<i>Larus ridibundus</i>	0,33	2,17	0,00	2,13	1,92	9,46	0,00	0,00	16,00
<i>Alcedo atthis</i>	0,63	0,92	0,17	0,33	0,54	0,25	0,38	0,33	3,54
<i>Motacilla cinerea</i>	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00	0,42	0,04	0,50	1,13
<i>Motacilla alba</i>	0,79	1,50	0,38	1,04	1,58	2,63	0,29	0,54	8,75
<i>Luscinia svecica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
<i>Cettia cetti</i>	6,17	4,25	5,42	2,46	3,17	0,88	2,17	3,58	28,08
<i>Cisticola juncidis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	0,17	0,29	0,63	0,00	0,08	0,00	0,54	0,83	2,54
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	0,25	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
<i>Phylloscopus collybita</i>	0,21	0,25	0,17	0,25	0,58	0,67	0,54	0,63	3,29
<i>Remiz pendulinus</i>	0,42	0,29	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
<i>Emberiza schoeniclus</i>	0,00	0,25	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,79
espècies ocasionals									
<i>Anas clypeata</i>	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Anas crecca</i>	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
<i>Anas platyrhynchos var. domestica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,04	1,13
<i>Ardea purpurea</i>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,13
<i>Gallinago gallinago</i>	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
<i>Himantopus himantopus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
<i>Ixobrychus minutus</i>	0,42	0,25	0,04	0,00	0,21	0,08	0,25	0,04	1,29
<i>Larus audouinii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Nycticorax nycticorax</i>	0,33	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,67	1,08
<i>Porphyrio porphyrio</i>	0,92	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	1,08
<i>Porzana porzana</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Scolopax rusticola</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04

Les estacions de la cua de l'embassament, tal i com ens mostren aquests resultats, tenen un alt interès, ja que la majoria d'espècies d'ocells aquàtics s'han observat en aquesta zona i a més, hi ha espècies que tan sols s'observen en aquest sector, com per exemple *Gallinago gallinago*, *Rallus aquaticus*, *Charadrius dubius*, *Porzana porzana*, *Anas crecca*, *Remiz pendulinus*, i *Acrocephalus arundinaceus*. Aquests resultats ens mostren que les estacions de la cua de l'embassament tenen un alt interès, ja que la majoria d'espècies d'ocells aquàtics s'han observat en aquesta zona i a més hi ha espècies que tan sols s'observen en aquesta zona, com per exemple *Gallinago gallinago*, *Rallus aquaticus*, *Charadrius dubius*, *Porzana porzana*, *Anas crecca* i *Remiz pendulinus*, i *Acrocephalus arundinaceus*.

Cal fer esment un any més, de l'espècie que apareix amb major quantitat, i es tracta de l'hivernant *Phalacrocorax carbo*. Mentre que com el 2008 i el 2009 entre les espècies que s'observen en un major nombre d'estacions i de manera més uniforme hi ha *Gallinula chloropus*, *Motacilla alba* i *Cettia cetti*, que són les primeres espècies que colonitzen els ambients aquàtics a les comarques que hi ha als entorns de l'embassament del Foix. També s'observen a totes les estacions però amb menys regularitat *Anas platyrhynchos*, *Phalacrocorax carbo*, *Ardea cinerea*, i *Alcedo atthis*. A més *Egretta garzetta*, també s'observa en totes les estacions durant el 2010, però és difícil d'observar quan estem a prop com a l'estació 3, així que alertat de la nostra presència roman o ben amagat o fuig de manera sigil·losa. Tant *Tachybaptus ruficollis* com *Fulica atra* s'havien observat a totes les estacions el 2009, però de la mateixa manera que el martinet blanc el 2009, aquestes no s'observen en estacions molt properes al visitant (Estació 3 i Estació 8). Així les estacions 3, 7 i 8, on la distància de l'observador és molt propera als ocells, el nombre d'individus observats és significativament menor (menys de 12 individus promig per visita, vegeu taula 2). També hem de fer notar les absències, doncs no s'observa en cap visita ni *Cisticola juncidis* ni *Pandion haliaetus*. Ambdues espècies sí que són observades a les proximitats de l'embassament, o en d'altres dates en què no es fa el cens. Concretament *Pandion*

haliaetus s'observa de manera regular quan segueix la serralada Litoral durant les migracions, i alguns dies fins i tot resta a l'embassament sedimentada.

La taula següent mostra els càlculs de manera conjunta per a cada estació de l'abundància i la riquesa d'espècies en nombre d'espècies i l'índex de diversitat de Shannon.



2010	Estació 1	Estació 2	Estació 3	Estació 4	Estació 5	Estació 6	Estació 7	Estació 8	Total
	Aguait	Paret	Canyissar	Caseta	Marina	Presa	F. Alzina	Gual	Pantà
Nº d'individus promig	32,8	72,6	11,9	25,3	33,6	29,7	10,8	10,8	227,4
Nº ind màxim	62,0	407,0	25,0	51,0	81,0	66,0	18,0	27,0	585,0
Nº ind mínim	18,0	16,0	2,0	8,0	16,0	7,0	4,0	3,0	93,0
Nº d'espècies total	26,0	21,0	23,0	15,0	19,0	17,0	17,0	19,0	35,0
Nº d'espècies promig	9,4	7,6	4,5	6,4	8,0	6,3	5,0	4,7	15,8
Nº d'espècies màxim	12	11	8	9	10	12	8	10	19
Nº d'espècies mínim	6	5	2	3	6	3	1	1	13
Index diversitat Shannon H									
Valor promig	2,3	2,0	1,7	1,9	2,0	1,6	1,9	1,8	2,5
Desviació standard	0,36	0,77	0,44	0,51	0,40	0,58	0,70	0,66	0,57
Valor màxim	2,9	3,1	2,6	2,9	2,7	2,5	2,7	2,7	3,3
Valor mínim	1,3	0,2	0,6	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	1,3

Estacions de mostreig període gener-desembre 2010



Els resultats són molt semblants als del període tardor 2007 - desembre 2009. El nombre total de 37 espècies aquàtiques creiem que és rellevant ja que l'embassament del Foix és l'única zona humida important de les comarques del Penedès. Concretament a la primera estació, situada a l'aguait és on s'hi ha observat més espècies en concret 26, i el 2009 es va arribar a 29 espècies. Els resultats mostren que aquesta estació està ben localitzada, essent el punt de major interès per a les espècies aquàtiques. És l'única estació on s'hi han observat totes les espècies indicadores proposades, per exemple el 2009 encara que aquest any no s'hi ha observat *Emberiza schoeniclus* ni *Luscinia svecica*.

En relació al número d'individus promig, el resultat de 227 és notablement inferior al de 2009 (393 individus promig) o el de 2008 (334 individus promig) per cens total. Com en el període anterior cal considerar un cert biaix a causa de l'elevat nombre de *Phalacrocorax carbo* que hivernen a l'embassament, que aquest fou notablement superior a l'hivern 2008-2009.



Les figures 1, 2 i 3 ens mostren les dinàmiques al llarg del període d'estudi 2010 i comparativament els promitjos del 2008-2010. Hi podem veure com l'evolució és afectada per un fort component estacional. Per tant, el paper de l'embassament assoleix una major rellevància a les èpoques de pas i en especial durant l'hivern. Així doncs, a l'època de reproducció de les aus és quan s'assoleixen els valors més baixos d'individus. El nombre d'espècies és força regular durant tot l'any i tant de manera singular com comparativa amb els promitjos. S'obté un màxim a la segona quinzena d'abril, que el 2010 és de 18 espècies, superior a la mitjana i un màxim més ample durant el període postnupcial que va d'octubre a desembre. Durant aquest any s'ha inclòs *Anas platyrhynchos* var. *domestica*, que a l'ésser una subespècie no la considerem, òbviament, com una espècie més. Per valorar la diversitat també ens ajuda l'anàlisi de l'índex de diversitat que ens mostra uns màxims a les èpoques de pas prenupcial i postnupcial. L'interès de l'embassament per les aus migratòries aquàtiques un cop més es confirma d'una manera molt clara.



Evolució de l'abundància de les aus aquàtiques. Període 2010 i promig 2008-2010



Evolució del nombre d'espècies d'aus aquàtiques. Període 2010 i promig 2008-2010



Evolució de l'índex de diversitat de les aus aquàtiques. Període 2010 i promig 2008-2010

Una altra de les informacions que s'ha recollit en les 24 visites és la presència d'altres vertebrats a les vuit estacions de mostreig o en els recorreguts que es fan per anar d'un lloc a altre. Aquestes dades també ens evidencien la forta presència d'animals que tot i no haver estat considerats indicadors en el present estudi, sí que tenen una vinculació (més o menys directa) amb l'espai estudiat i per tant amb la qualitat de les aigües. S'han observat un bon nombre d'espècies d'ocells, també de peixos, d'amfibis, de rèptils i de mamífers.

* Resum de la campanya d'anellament 2011 - amb dades de Manel Bonilla i Marc Olivé (ICO)

És el setè any que es realitzen tasques d'anellament al Parc del Foix. Enguany s'hi ha anat 16 jornades. De la mateixa manera que les darreres campanyes s'ha actuat a dos punts diferents; als canyissars de la cua de l'embassament i a la riera de Marmellar. S'han fet un total 1102 captures; 1073 primeres captures, 26 controls (recaptures d'ocells anellats al pantà) i 3 recuperacions. En total han estat 32 les espècies capturades i alliberades. Vegem a les següents taules les dades recollides per Marc Olivé i Manel Bonilla respectivament.

ESPÈCIE	25/08	29/08	05/09	06/09	11/09	12/09	13/09	19/09	20/09	21/09	TOTAL
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>									1		1
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	10	3	5	3	5	10	3	1	5		45
<i>Alcedo atthis</i>	3					1					4
<i>Carduelis chloris</i>									1		1
<i>Cettia cetti</i>	4		1	1	1	5		3	3		18
<i>Erithacus rubecula</i>				1					2		3
<i>Falco subbuteo</i>				1							1
<i>Ficedula hypoleuca</i>				1					1		2
<i>Hippolais polyglotta</i>	1										1
<i>Hirundo rustica</i>	62	62	67	93	15		65	133		54	551
<i>Luscinia megarhynchos</i>	2		1								3
<i>Luscinia svecica</i>						2					2
<i>Parus caeruleus</i>						10					10
<i>Parus major</i>		1	1								2
<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	1	1		4	2					9
<i>Riparia riparia</i>				1			1	3		1	6
<i>Serinus serinus</i>								1			1
<i>Sturnus vulgaris</i>						1					1
<i>Sylvia atricapilla</i>	1				1		1				3
<i>Sylvia communis</i>								1			1
<i>Sylvia borin</i>		1			4	5					10
<i>Sylvia melanocephala</i>						2					2
<i>Turdus merula</i>	1			1	2		1		1	1	7
TOTAL	85	68	76	102	32	38	71	142	14	56	684
RECUPERACIONS				1							1
CONTROLS		2	2	4	1	4	1		5		19
CAPTURES TOTALS	85	70	78	107	33	42	72	142	19	56	704

ESPÈCIE	06/06	24/08	26/08	16/10	13/11	15/12	TOTAL
<i>Aegithalos caudatus</i>				1			1
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		1					1
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		4	4				8
<i>Cettia cetti</i>	1	1		3	1		6
<i>Certhia brachydactyla</i>	1			1			2
<i>Erithacus rubecula</i>			1	7	1		9
<i>Falco tinnunculus</i>						1	1
<i>Fringilla coelebs</i>					1		1
<i>Garrulus glandarius</i>				1			1
<i>Hirundo rustica</i>		112	205				317
<i>Luscinia megarhynchos</i>	3						3
<i>Parus caeruleus</i>				2			2
<i>Phylloscopus collybita</i>				1	3		4
<i>Phylloscopus trochilus</i>			2				2
<i>Prunella modularis</i>				2			2
<i>Serinus serinus</i>	1						1
<i>Sylvia atricapilla</i>	5	1		1	4		11
<i>Sylvia borin</i>			1				1
<i>Sylvia melanocephala</i>	3			2	1		6
<i>Turdus merula</i>	3	1		3	1		8
<i>Turdus philomelos</i>	0			1	1		2
TOTAL	17	120	213	25	13	1	389
RECUPERACIONS		1	1				2
CONTROLS	2			2	3		7
CAPTURES TOTALS	19	121	214	27	16	1	398

Destaquem l'anellament per primera vegada d'una boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*). Aquesta és la segona vegada que s'observa l'espècie al Parc del Foix.

També resulta de gran interès la recuperació de 3 orenetes vulgars (*Hirundo rustica*), que havien estat anellades al Delta del Llobregat (Baix Llobregat), a Botarell (Baix Camp) i a Holanda.

Concretament un exemplar anellat el 5-9-2009 a les Basses de Can Dimoni (Delta Llobregat) es va recuperar al Parc del Foix el 24-8-2010. Un exemplar anellat a Botarell el 16-7-2010 es va recuperar

al Parc del Foix el 26-8-2010. I un exemplar amb anella d'Holanda es va recuperar al Pantà el 6-9-2011 (d'aquest exemplar resta pendent la rebuda de les dades d'anellament).

* Els ocells del Parc del Foix el 2010

Aquest any s'han arribat a observar un total de 171 espècies d'ocells diferents. Per altra banda el total acumulat d'espècies que tenim recollides al llarg dels darrers 50-60 anys al Parc del Foix ha quedat en 248. Destaquem el control per primera vegada al Parc del Foix segons els nostres arxius de les següents aus.

1er. Trimestre

2on. Trimestre

Oca del Canadà (*Branta canadensis*)

3er. Trimestre

4rt. Trimestre

Arpella pàl·lida russa (*Circus macrourus*)

Merla d'aigua (*Cinclus cinclus*)

També el 2-7-2010 es va observar un ocell que podria ser una **boscarla mostatxuda** (*Acrocephalus melanopogon*) i que representaria una nova espècie per al Parc del Foix. Tanmateix l'observació no es considera suficientment segura, ja que va ser molt breu, i hi ha altres espècies del gènere *Acrocephalus* que són molt similars.

Destaquem l'observació de tres noves espècies per al Parc del Foix. En primer lloc l'**oca del Canadà** (*Branta canadensis*), que és una au pròpia d'Amèrica del Nord. Va ser introduïda a alguns països de l'Europa septentrional i a l'actualitat s'hi han consolidat poblacions silvestres. Els exemplars europeus poden realitzar moviments migratoris cap a territoris més meridionals de la resta de continent. En segon lloc hem d'esmentar l'**arpella pàl·lida russa** (*Circus macrourus*), es va veure un exemplar durant la campanya d'observació de les migracions de tardor des del Turó de les Tres Partions. És un ocell rapinyaire que a Catalunya ha estat citat poques vegades, ja que les seves rutes migratòries transcorren per l'est d'Europa. Finalment s'ha vist la **merla d'aigua** (*Cinclus cinclus*) (XPCA-ORNITHO.CAT). És un ocell que presenta una distribució força àmplia a Catalunya; requereix rius ben nets. L'arribada al Parc s'atribueix a un moviment provocat per una fugida dels freds forts que va fer aquells dies al Principat i en especial a les zones de muntanya.



Oca del Canadà observada aquest 2010.

A més aquest 2010 ha aportat importants troballes pel que fa a noves espècies nidificants al Parc del Foix. Cal destacar que per primera vegada hem pogut comprovar la nidificació de la **merla roquera** (*Monticola saxatilis*), la **boscarla de canyar** (*Acrocephalus scirpaceus*), el **blauet** (*Alcedo atthis*), la **polla blava** (*Porphyrio porphyrio*) i el **tallarol de garriga** (*Sylvia cantillans*). Per altra banda, també és molt destacable l'augment de parelles nidificants del **martinet menut** (*Ixobrychus minutus*). Possiblement el cas més sorprenent ha estat el de la merla roquera, que fins ara al Parc del Foix sols havia estat citada en períodes de pas migratori i de forma molt excepcional. És una au estival que nidifica a diverses zones de Catalunya. Mostra preferència per ambients naturals amb roquissars i sobretot pels prats de muntanya que troba al Pirineu i al Prepirineu. Al nostre país és un ocell que es considera poc abundant. A les comarques del Penedès la seva presència com a nidificant és molt escassa. En el cas de la boscarla de canyar i del blauet en anys anteriors ja s'havien observat indicis d'una possible reproducció, però mai s'havia acabat de comprovar. Ha estat aquest 2010 quan finalment s'ha observat amb certesa. Pel que fa a la polla blava és un ocell que arreu del país està mostrant un increment de la seva presència i també dels llocs on s'ha començat a reproduir. Fins fa pocs anys no s'havia anotat al Penedès, aquesta és la primera citació de nidificació a les comarques penedesenques. La nidificació de la polla blava, juntament amb la boscarla de canyar, el blauet i l'increment del martinet menut donen un elevat valor natural afegit, al Parc del Foix. Finalment el cas del tallarol de garriga ha resultat ben sorprenent. A les comarques del Penedès és un ocell comú com a reproductor a la Serralada Prelitoral, però extremadament escàs a la Serralada Litoral.



La polla blava ha criat per primer cop al pantà

Entre les moltes citacions interessants ens cal destacar l'observació d'una **guatlla** (*Coturnix coturnix*) durant el pas postnupcial i la d'un **mosquiter ibèric** (*Phylloscopus ibericus*) cantant al pas prenupcial. També tenim notícia de 2 **hortolans** (*Emberiza hortulana*) (MPMB) sedimentats durant el pas de tardor. L'anellament d'un exemplar de **boscarla dels joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) (MOVA) ha estat de gran importància. A l'estiu es va produir una citació de **gavina corsa** (*Larus audouinii*), és una au que s'ha vist en comptades ocasions al Parc del Foix. Les nevades a molts punts d'Europa ens van permetre d'observar un grup de 5 **oques vulgars** (*Anser anser*) pocs dies abans d'acabar l'any. També és força interessant l'observació de 2 **Gralles** (*Corvus monedula*) prop de les Masuques, ja que feia bastants anys que no s'observava aquesta espècie.



S'ha pogut comprovar la nidificació del blauet i del tallarol de garriga.

	NOMBRE D'OBSERVACIONS I PERCENTATGES DURANT EL 2010					
			Percentatge d'observacions			
			respecte sortides efectuades en cada període			
	Total observacions	percentatge 2010	gener-març	abril-juny	juliol-setembre	octu.-desembre
Oca vulgar - Anser anser	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Xarxet - Anas crecca	8	7,2%	16,0%	0,0%	0,0%	15,4%
Ànec collverd - Anas platyrhynchos	65	58,6%	76,0%	67,9%	37,5%	57,7%
Ànec cuallarg - Anas acuta	2	1,8%	8,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ànec culerot - Anas clypeata	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Perdiu roja - Alectoris rufa	17	15,3%	28,0%	17,9%	15,6%	0,0%
Guatlla - Coturnix coturnix	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Faisà - Phasianus colchicus	2	1,8%	4,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Cabusset - Tachybaptus ruficollis	52	46,8%	64,0%	46,4%	31,3%	50,0%
Cabussó collnegre - Podiceps nigricollis	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo	44	39,6%	68,0%	32,1%	6,3%	61,5%
Martinet menut - Ixobrychus minutus	22	19,8%	0,0%	46,4%	28,1%	0,0%
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax	20	18,0%	4,0%	25,0%	37,5%	0,0%
Martinet ros - Ardeola ralloides	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Esplugabous - Bubulcus ibis	1	0,9%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Martinet blanc - Egretta garzetta	45	40,5%	52,0%	60,7%	28,1%	23,1%
Agró blanc - Casmerodius albus	1	0,9%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bernat pescaire - Ardea cinerea	61	55,0%	64,0%	67,9%	37,5%	53,8%
Agró roig - Ardea purpurea	4	3,6%	4,0%	10,7%	0,0%	0,0%
Aligot vesper - Pernis apivorus	16	14,4%	0,0%	3,6%	37,5%	11,5%
Milà negre - Milvus migrans	2	1,8%	4,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Milà reial - Milvus milvus	2	1,8%	0,0%	0,0%	3,1%	3,8%
Àliga marcenca - Circaetus gallicus	11	9,9%	8,0%	3,6%	21,9%	3,8%
Arpella vulgar - Circus aeruginosus	19	17,1%	8,0%	10,7%	34,4%	11,5%
Arpella pàl·lida - Circus cyaneus	3	2,7%	0,0%	0,0%	3,1%	7,7%
Arpella pàl·lida russa - Circus macrourus	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Esparver cendrós - Circus pygargus	4	3,6%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%
Astor - Accipiter gentilis	8	7,2%	8,0%	0,0%	9,4%	11,5%
Esparver vulgar - Accipiter nisus	42	37,8%	36,0%	7,1%	50,0%	57,7%
Aligot comú - Buteo buteo	42	37,8%	40,0%	28,6%	12,5%	76,9%
Àliga calçada - Hieraaetus pennatus	4	3,6%	4,0%	0,0%	6,3%	3,8%
Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus	7	6,3%	12,0%	3,6%	3,1%	7,7%
Àliga pescadora - Pandion haliaetus	7	6,3%	0,0%	0,0%	15,6%	7,7%
Xoriguer comú - Falco tinnunculus	48	43,2%	28,0%	35,7%	53,1%	53,8%
Esmerla - Falco columbarius	5	4,5%	0,0%	0,0%	6,3%	11,5%
Falcó mostatxut - Falco subbuteo	20	18,0%	0,0%	10,7%	34,4%	23,1%
Falcó de la reina - Falco eleonorae	4	3,6%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%
Falcó pelegrí - Falco peregrinus	3	2,7%	0,0%	3,6%	0,0%	7,7%
Rascló - Rallus aquaticus	27	24,3%	56,0%	3,6%	0,0%	46,2%
Polla pintada - Porzana porzana	3	2,7%	8,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	66	59,5%	76,0%	67,9%	37,5%	61,5%
Polla blava - Porphyrio porphyrio	26	23,4%	4,0%	25,0%	31,3%	30,8%
Fotja - Fulica atra	47	42,3%	64,0%	53,6%	12,5%	46,2%
Cames llargues - Himantopus himantopus	4	3,6%	0,0%	10,7%	3,1%	0,0%
Corriol petit - Charadrius dubius	4	3,6%	4,0%	3,6%	6,3%	0,0%
Fredulega - Vanellus vanellus	3	2,7%	4,0%	0,0%	0,0%	7,7%
Becadell comú - Gallinago gallinago	7	6,3%	8,0%	0,0%	0,0%	19,2%
Becada - Scolopax rusticola	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Xivita - Tringa ochropus	7	6,3%	4,0%	7,1%	9,4%	3,8%
Xivitona - Actitis hypoleucos	17	15,3%	0,0%	39,3%	15,6%	3,8%
Gavina vulgar - Larus ridibundus	34	30,6%	36,0%	0,0%	37,5%	50,0%
Gavina corsa - Larus audouinii	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Gavià argentat - Larus michaellis	3	2,7%	8,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Colom roquer - Columba livia	16	14,4%	28,0%	14,3%	6,3%	11,5%
Xixella - Columba oenas	9	8,1%	4,0%	17,9%	6,3%	3,8%
Tudó - Columba palumbus	89	80,2%	100,0%	89,3%	56,3%	80,8%
Tórtora turca - Streptopelia decaocto	12	10,8%	24,0%	3,6%	3,1%	15,4%
Tórtora - Streptopelia turtur	14	12,6%	0,0%	42,9%	6,3%	0,0%

Cucut reial - Clamator glandarius	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Cucut - Cuculus canorus	21	18,9%	8,0%	64,3%	3,1%	0,0%
Òliba - Tyto alba	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Xot - Otus scops	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Duc - Bubo bubo	2	1,8%	4,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Mussol comú - Athene noctua	8	7,2%	8,0%	10,7%	9,4%	0,0%
Gamarús - Strix aluco	3	2,7%	4,0%	0,0%	6,3%	0,0%
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus	2	1,8%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%
Siboc - Caprimulgus ruficollis	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Ballester - Apus melba	32	28,8%	12,0%	32,1%	50,0%	15,4%
Falciot negre - Apus apus	40	36,0%	4,0%	89,3%	43,8%	0,0%
Falciot pàl·lid - Apus pallidus	2	1,8%	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%
Blauet - Alcedo atthis	44	39,6%	40,0%	42,9%	31,3%	46,2%
Abellerol - Merops apiaster	47	42,3%	0,0%	82,1%	75,0%	0,0%
Gaig blau - Coracias garrulus	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Puput - Upupa epops	15	13,5%	16,0%	17,9%	9,4%	11,5%
Colltort - Jynx torquilla	3	2,7%	4,0%	7,1%	0,0%	0,0%
Picot verd - Picus viridis	47	42,3%	64,0%	39,3%	34,4%	34,6%
Picot garser gros - Dendrocopos major	23	20,7%	32,0%	14,3%	6,3%	34,6%
Picot garser petit - Dendrocopos minor	1	0,9%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cogullada vulgar - Galerida cristata	20	18,0%	16,0%	32,1%	9,4%	15,4%
Cogullada fosca - Galerida theklae	8	7,2%	0,0%	14,3%	6,3%	7,7%
Cotoliu - Lullula arborea	20	18,0%	28,0%	14,3%	6,3%	26,9%
Alosa vulgar - Alauda arvensis	7	6,3%	8,0%	0,0%	0,0%	19,2%
Oreneta de ribera - Riparia riparia	13	11,7%	8,0%	21,4%	15,6%	0,0%
Roquerol - Ptyonoprogne rupestris	21	18,9%	40,0%	0,0%	3,1%	38,5%
Oreneta vulgar - Hirundo rustica	74	66,7%	32,0%	103,6%	93,8%	26,9%
Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica	2	1,8%	4,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Oreneta cuablanca - Delichon urbicum	67	60,4%	24,0%	89,3%	84,4%	34,6%
Trobat - Anthus campestris	3	2,7%	0,0%	10,7%	0,0%	0,0%
Piula dels arbres - Anthus trivialis	10	9,0%	0,0%	14,3%	18,8%	0,0%
Titella - Anthus pratensis	39	35,1%	64,0%	3,6%	3,1%	80,8%
Grasset de muntanya - Anthus spinoletta	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea	30	27,0%	40,0%	7,1%	6,3%	61,5%
Cuereta blanca - Motacilla alba	74	66,7%	92,0%	64,3%	43,8%	73,1%
Merla d'aigua - Cinclus cinclus	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Cargolet - Troglodytes troglodytes	74	66,7%	84,0%	85,7%	37,5%	65,4%
Pardal de bardissa - Prunella modularis	29	26,1%	48,0%	0,0%	3,1%	61,5%
Pit-roig - Eriothacus rubecula	76	68,5%	104,0%	60,7%	25,0%	96,2%
Rossinyol - Luscinia megarhynchos	39	35,1%	0,0%	96,4%	37,5%	0,0%
Cotxa blava - Luscinia svecica	2	1,8%	0,0%	0,0%	3,1%	3,8%
Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros	40	36,0%	76,0%	7,1%	0,0%	73,1%
Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus	6	5,4%	4,0%	3,6%	12,5%	0,0%
Bitxac rogenç - Saxicola rubetra	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Bitxac comú - Saxicola torquatus	25	22,5%	20,0%	35,7%	15,6%	19,2%
Còbit gris - Oenanthe oenanthe	4	3,6%	0,0%	3,6%	3,1%	7,7%
Còbit ros - Oenanthe hispanica	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Merla roquera - Monticola saxatilis	3	2,7%	0,0%	10,7%	0,0%	0,0%
Merla blava - Monticola solitarius	25	22,5%	20,0%	42,9%	6,3%	23,1%
Merla de pit blanc - Turdus torquatus	3	2,7%	0,0%	0,0%	3,1%	7,7%
Merla - Turdus merula	88	79,3%	104,0%	92,9%	43,8%	84,6%
Tord comú - Turdus philomelos	58	52,3%	100,0%	35,7%	12,5%	73,1%
Tord ala-roig - Turdus iliacus	10	9,0%	24,0%	0,0%	0,0%	15,4%
Griva - Turdus viscivorus	55	49,5%	76,0%	50,0%	3,1%	80,8%
Rossinyol bord - Cettia cetti	70	63,1%	88,0%	75,0%	37,5%	57,7%
Trist - Cisticola juncidis	14	12,6%	8,0%	28,6%	12,5%	0,0%
Boscarla dels joncs - Acrocephalus schoenot	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpace	16	14,4%	0,0%	21,4%	28,1%	3,8%
Balquer - Acrocephalus arundinaceus	16	14,4%	0,0%	50,0%	6,3%	0,0%
Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta	20	18,0%	0,0%	46,4%	21,9%	0,0%
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	80	72,1%	96,0%	82,1%	40,6%	76,9%
Tallarol gros - Sylvia borin	4	3,6%	0,0%	0,0%	9,4%	3,8%
Tallarol emmascarat - Sylvia hortensis	1	0,9%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tallareta vulgar - <i>Sylvia communis</i>	2	1,8%	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%
Tallareta cuallarga - <i>Sylvia undata</i>	41	36,9%	24,0%	32,1%	46,9%	42,3%
Tallarol de garriga - <i>Sylvia cantillans</i>	8	7,2%	0,0%	25,0%	3,1%	0,0%
Tallarol capnegre - <i>Sylvia melanocephala</i>	110	99,1%	104,0%	96,4%	93,8%	103,8%
Mosquiter pàl·lid - <i>Phylloscopus bonelli</i>	30	27,0%	4,0%	85,7%	15,6%	0,0%
Mosquiter xiulaire - <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Mosquiter ibèric - <i>Phylloscopus ibericus</i>	1	0,9%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mosquiter comú - <i>Phylloscopus collybita</i>	47	42,3%	88,0%	25,0%	6,3%	61,5%
Mosquiter de passa - <i>Phylloscopus trochilus</i>	11	9,9%	4,0%	14,3%	18,8%	0,0%
Reietó - <i>Regulus regulus</i>	5	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	19,2%
Bruel - <i>Regulus ignicapillus</i>	54	48,6%	56,0%	57,1%	25,0%	61,5%
Papamosques gris - <i>Muscicapa striata</i>	5	4,5%	0,0%	7,1%	9,4%	0,0%
Mastegatxes - <i>Ficedula hypoleuca</i>	12	10,8%	4,0%	17,9%	15,6%	3,8%
Mallerenga cuallarga - <i>Aegithalos caudatus</i>	85	76,6%	104,0%	82,1%	50,0%	76,9%
Mallerenga emplomallada - <i>Parus cristatus</i>	72	64,9%	76,0%	67,9%	50,0%	69,2%
Mallerenga petita - <i>Parus ater</i>	33	29,7%	24,0%	35,7%	25,0%	34,6%
Mallerenga blava - <i>Parus caeruleus</i>	71	64,0%	92,0%	75,0%	37,5%	57,7%
Mallerenga carbonera - <i>Parus major</i>	82	73,9%	100,0%	85,7%	37,5%	80,8%
Raspinell - <i>Certhia brachydactyla</i>	83	74,8%	96,0%	89,3%	59,4%	57,7%
Teixidor - <i>Remiz pendulinus</i>	16	14,4%	36,0%	0,0%	0,0%	26,9%
Oriol - <i>Oriolus oriolus</i>	27	24,3%	0,0%	53,6%	37,5%	0,0%
Botxí - <i>Lanius meridionalis</i>	3	2,7%	0,0%	7,1%	3,1%	0,0%
Capsigrany - <i>Lanius senator</i>	4	3,6%	0,0%	7,1%	6,3%	0,0%
Gaig - <i>Garrulus glandarius</i>	72	64,9%	72,0%	75,0%	43,8%	73,1%
Garsa - <i>Pica pica</i>	66	59,5%	84,0%	50,0%	40,6%	69,2%
Gralla - <i>Corvus monedula</i>	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Corb - <i>Corvus corax</i>	12	10,8%	24,0%	3,6%	6,3%	11,5%
Estornell vulgar - <i>Sturnus vulgaris</i>	46	41,4%	44,0%	39,3%	34,4%	50,0%
Estornell negre - <i>Sturnus unicolor</i>	36	32,4%	36,0%	39,3%	12,5%	46,2%
Pardal comú - <i>Passer domesticus</i>	71	64,0%	80,0%	89,3%	43,8%	46,2%
Pardal xarrec - <i>Passer montanus</i>	24	21,6%	40,0%	25,0%	9,4%	15,4%
Pardal roquer - <i>Petronia petronia</i>	6	5,4%	8,0%	7,1%	3,1%	3,8%
Pinsà comú - <i>Fringilla coelebs</i>	54	48,6%	104,0%	3,6%	6,3%	96,2%
Gafarró - <i>Serinus serinus</i>	88	79,3%	100,0%	103,6%	43,8%	76,9%
Verdum - <i>Carduelis chloris</i>	79	71,2%	84,0%	92,9%	43,8%	69,2%
Cadenera - <i>Carduelis carduelis</i>	87	78,4%	104,0%	103,6%	46,9%	65,4%
Lluer - <i>Carduelis spinus</i>	12	10,8%	28,0%	0,0%	0,0%	19,2%
Passerell - <i>Carduelis cannabina</i>	50	45,0%	44,0%	71,4%	28,1%	38,5%
Trencapinyes - <i>Loxia curvirostra</i>	3	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	11,5%
Pinsà borroner - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Durbec - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%
Gratapalles - <i>Emberiza cirlus</i>	57	51,4%	68,0%	78,6%	25,0%	38,5%
Sit negre - <i>Emberiza cia</i>	5	4,5%	8,0%	0,0%	0,0%	11,5%
Hortolà - <i>Emberiza hortulana</i>	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%
Repicatalons - <i>Emberiza schoeniclus</i>	13	11,7%	28,0%	0,0%	0,0%	23,1%
Cruixedell - <i>Emberiza calandra</i>	8	7,2%	20,0%	3,6%	0,0%	7,7%
Espècies al·lòctones						
Oca del Canadà - <i>Branta canadensis</i>	1	0,9%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%
Ànec mut - <i>Cairina moschata</i>	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Ànec domèstic - <i>Anas peking/platyrhynchos</i>	10	9,0%	12,0%	10,7%	6,3%	7,7%
Bec de corall senegalès - <i>Estrilda astrid</i>	2	1,8%	0,0%	0,0%	3,1%	3,8%

En les pàgines següents, en tractar individualment cadascuna de les espècies, a l'hora d'omplir les taules sobre fenologia, migració, tendències poblacionals, etc... s'han tingut en compte fonamentalment les dades recollides al llarg dels darrers quinze anys (en el cas que les dades de referència fossin anteriors s'ha fet constar). A la fenologia de les espècies exòtiques s'hi ha posat l'abreviatura “exo” en l'apartat de divagant, atès que per ara no es poden considerar de cap altre apartat.

Oca vulgar (*Anser anser*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
													x

És de gran interès l'observació de 5 exemplars en vol cap a l'oest el dia 26-12-2010 als entorns de Penyafer. Les fortes nevades i freds que es van produir en dies anteriors a bona part d'Europa haurien fet baixar cap a les nostres latituds a aquestes aus. A diverses zones humides de Catalunya aquests dies també hi va haver una notable entrada d'oques vulgars.

Ànec blanc (*Tadorna tadorna*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x				x		x						

No observat el 2010. Darrera observació anys 1987, 2006 i 2008.

Ànec xiulador (*Anas penelope*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
	x	x	x							x	x						

No observat el 2010. Darrera observació anys 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006 i 2007.

Ànec gris (*Anas strepera*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x					x			x	x	

No observat el 2010. Darrera observació anys 2003 i 2008.

Xarxet (*Anas crecca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
Dates extremes	marxa		14-4-1996			Enguany			marxa		20-2-2010		
hivernants	arribada		4-7-2006						arribada		25-11-2010		

El xarxet ha estat vist en quantitats baixes els mesos més freds de l'any, tant a principis com a finals d'any.

Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*)

Fenologia		sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació		Anterior			segura			x	probable		possible		no detectat		
		Enguany			segura			x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100			x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable			x	augmenta			

El 8-5-2010 s'observa una femella amb 7 polls. El 17-5-2010 s'observa una femella amb 7 polls i una altra amb 4 polls. El 18-5-2010 es veu una femella amb 4 polls. El 25-6-2010 i en dies següents s'observen exemplars juvenils. El 17-7-2010 veiem una femella amb 6 polls. El 17-7-2010 de matinada arriben un mínim de 60 exemplars, sembla que procedeixen del riu Foix. Una cosa similar passa el 16-8-2010, que n'arriben uns 70.

Ànec cuallarg (*Anas acuta*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x					x	x	x	x	

El 20-2-2010 s'observa una femella a la cua de l'embassament que esdevé la citació més primerenca del pas prenupcial obtinguda al Parc.

Xarrasclet (*Anas querquedula*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x								

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2003, 2006 i 2007.

Ànec cullerot (*Anas clypeata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		18-4-2001			Enguany		marxa		8-5-2010			
	arribada		17-7-2006					arribada		-			

L'observació del 8-5-2010 ha passat a ser la citació més tardana del pas prenupcial obtinguda al Parc.

Xibec (*Netta rufina*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x				x		x		

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1998, 1999 i 2002.

Morell cap-roig (*Aythya ferina*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x			x					x	x	x

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2005.

Morell xocolater (*Aythya nyroca*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2010. Observat únicament el 17-9-1988 (PMRA).

Morell de plomall (*Aythya fuligula*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x		x	x

No observat el 2010. Darreres observacions any 2002.

Morell d'ulls grocs (*Bucephala clangula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
												x	

No observat el 2010. L'únic registre obtingut és del 20-12-1983.

Bec de serra mitjà (*Merqus serrator*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x								

No observat el 2010. L'únic registre obtingut és del 4-4-1966 (PMRA).

Perdiu roja (*Alectoris rufa*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms	x	màquies i garrigues	x	z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	

El 8-8-2010 observem un grup familiar amb 9 exemplars; polls crescutets que acompanyen als adults. El 8-9-2010 s'observa un altre grup familiar. Aquesta espècie normalment es localitza a les muntanyes del Parc, enguany s'ha vist diverses vegades algun exemplar al costat mateix de l'embassament.

Guatlla (*Coturnix coturnix*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

El 3-9-2010 observem un exemplar sedimentat en uns matolls propers al Turó de les Tres Partions. Sense cap mena de dubte es tracta d'una guatlla migrant que s'ha aturat a les muntanyes del Parc per reposar i recuperar forces. Aquesta és una au que abans havia estat força habitual i que els darrers anys ha esdevingut extremadament excepcional per aquestes contrades.

Faisà (*Phasianus colchicus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x		x	x	x							x	

El 4-2-2010 veiem una femella morta per un caçador a la zona de la Timba. El 19-12-2010 en trobem una altra de morta als entorns de Mas Albornar.

Cabusset (*Tachybaptus ruficollis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant	x	de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura	x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura	x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants			1 a 10	x	10 a 100		Més de 100					
Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars							
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	x						
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta							

El 24-5-2010 hi ha una parella que ha fet niu a una bassa propera a les Masduques, ja feia dies que s'observava per la zona. El 24-6-2010 i dies següents s'observa a la parella amb 3 polls en aquesta bassa. El 24-6-2010 a l'embassament veiem un adult que porta becada. El 16-8-2010 veiem un jove de l'any al pantà. El 6-9-2010 veiem i adult amb 2 polls al pantà.

Cabussó emplomallat (*Podiceps cristatus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x			x		x	x	x

No observat el 2010. Darrera observació anys 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.

Cabussó collnegre (*Podiceps nigricollis*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
			x					x	x	x	x	x							

El 16-8-2010 s'observa un exemplar a la cua de l'embassament. És una dada molt primerenca de pas postnupcial.

Corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

En el cens del 23-1-2010 es van arribar a contar 1294 exemplars a les joques. El 30-3-2010 s'observa un estol de 28 exemplars que migra cap al nord. El 15-5-2010 s'observa un estol de 6 migrants. Al pas de tardor també es van

observar diversos estols en migració. A finals d'any sembla que el contingent d'hivernants és molt menor que els últims hiverns.

Bitó (*Botaurus stellaris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x									x	

No observat el 2010. Darreres observacions 2006.

Martinet menut (*Ixobrychus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
				x	x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		7-4-2010				Enguany		arribada		7-4-2010				
	marxa		6-9-2010						marxa		6-9-2010				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable				augmenta		x		

El 20-4-2010 ja es detecten cants a 2 territoris diferents i s'observen 2 exemplars més en d'altres indrets. El 2-7-2010 s'arriben a localitzar fins a 7 punts diferents amb presència de martinet menut, en un d'aquests indrets una parella marca niu. El 26-8-2010 observem 2 polls volanders prop del canyissar on marcaven niu el 2-7-2010. Les observacions d'aquest 2010 han estat de gran interès, sobretot perquè s'ha anotat una quantitat de parelles establertes superior a la dels darrers anys, a més s'han millorat els registres extrems de les arribades i marxades.

Martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		
Nidificació	Anterior		segura				probable			possible		x	no detectat		
	Enguany		segura				probable			possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x

El 18-5-2010 anotem un exemplar juvenil. El 28-6-2010 hi ha 2 subadults. El 26-7-2010 i el 16-8-2010 veiem un juvenil.

Martinet ros (*Ardeola ralloides*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes migrants	pr. citació	29-3-05(PTEA)				Enguany			pr. citació	-			
	últ. citació	1-6-1999							últ. citació	15-5-2010			
	pr. citació	31-7-2007							pr. citació	-			
	últ. citació	27-9-2005							últ. citació	-			

Encara que sempre ha estat una au escassa, molts anys s'observen exemplars en pas migratori, enguany el 15-5-2010 a una bassa propera a les Masuques.

Esplugabous (*Bubulcus ibis*)

Espiragobius (Dabulus 1913)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Tan sols es va observar el 2-2-2010. Aquesta au, al pantà, havia arribat a concentrar molts exemplars anys enrere.

Martinet blanc (*Egretta garzetta*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant	x	de pas	x	divagant	
-----------	-----------	--	---------	---	-----------	---	--------	---	----------	--

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

El 16-3-2010 s'observa un grupet de 5 exemplars que s'ajoca als canyars de la cua de l'embassament. Enguany s'ha observat tots els mesos de l'any, al mes de març és quan es va detectar amb majors quantitats.

Agró blanc (*Casmerodius albus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x			x	x	x	x	x	x			

El 16-3-2010 hi ha un exemplar que es mou per diferents zones del riu Foix. Aquesta observació és la primera que obtenim per aquesta espècie al mes de març.

Bernat pescaire (*Ardea cinerea*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

El 16-3-2010 es troben 3 exemplars morts. En els censos quinzenals d'ocells aquàtics, s'acostumen a detectar entre 20 i 30 exemplars, encara que ocasionalment es pot arribar fins a gairebé 50 exemplars. El 21-9-2010 (MOVA) es va observar un exemplar juvenil anellat. Segons ens informen de l'Institut Català d'Ornitologia havia estat anellat de poll el 28-4-2010 al Sot del Fuster de Vilanova de la Barca. Aquest exemplar l'hem anat observant diverses vegades fins a les darreries de desembre.

Agró roig (*Ardea purpurea*)

Fenologia	sedentari			estival	x		hivernant	?		de pas	x		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes	pr. citació	14-3-1998				Enguany				pr. citació	16-2-2010			
estivals	últ. citació	30-9-2004								últ. citació	22-6-2010			

Destaquem l'observació del 16-2-2010, ja que és molt poc habitual que es produeixin citacions en període hivernal.

Cigonya negra (*Ciconia nigra*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
				x				x	x	x					

No observat el 2010. Darrera observació anys 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.

Cigonya blanca (*Ciconia ciconia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x				x	x				

No observat el 2010. Darrera observació anys 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006 i 2008.

Becplaner (*Platalea leucorodia*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x										

No observat el 2010. L'únic registre obtingut és del 12-4-2003.

Aligot vesper (*Pernis apivorus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
			x		x			x	x	x	x								
Dates extremes migrants	pr. citació	24-3-2003				Enguany				pr. citació	-								
	últ. citació	15-5-2010								últ. citació	15-5-2010								
	pr. citació	15-8-2009								pr. citació	28-8-2010								
	últ. citació	23-10-2003								últ. citació	6-10-2010								

El 15-5-2010 s'observen diversos estols de migrants, en total s'arriben a anotar un mínim de 47 exemplars. Al pas migratori postnupcial també van ser molt abundants.

Esparver d'espattes negres (*Elanus caeruleus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
								x									

No observat el 2010. Observat en una ocasió el 13-8-2002 (DIVA).

Milà negre (*Milvus migrans*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
			x	x	x			x	x	x							

El dia 1-3-2010 observem un exemplar que es desplaça en vol migratori cap al nord. El 15-5-2010 s'observa un migrant.

Milà reial (*Milvus milvus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
			x	x	x			x	x	x			

El 26-9-2010 s'anoten 2 exemplars al Turó de les Tres Partions. El 13-10-2010 (XPCA-ORNITHO.CAT) s'observa un exemplar d'aquesta espècie al Turó de les Tres Partions.

Aufrany (*Neophron percnopterus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2010. Observat únicament l'any 2006.

Voltor comú (*Gyps fulvus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2010. Darreres observacions any 2003 i 2005.

Voltor negre (*Aegypius monachus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x							

No observat el 2010. Només es coneix el registre del 5-5-2008 (PTEA, XPCA)

Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dates extremes estivals	arribada		4-3-2005			Enguany			arribada		25-3-2010		
	marxa		17-11-2005						marxa		17-10-10(MPMB)		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta		x		

El 25-3-2010 s'anota un exemplars amb actituds de zel. El 2-7-2010 se sent la veu d'un poll que demana menjar des del niu. El 17-10-2010 (MPMB) s'observa un exemplar en pas migratori pel Turó de les Tres Partions, es tracta d'una citació molt tardana.

Arpella vulgar (*Circus aeruginosus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x	x			x	x	x	x	

Dates extremes migrants	pr. citació	6-3-2002	Enguany	pr. citació	30-3-2010
	últ. citació	2-5-1999		últ. citació	20-4-2010
	pr. citació	21-8-1998		pr. citació	3-9-2010
	últ. citació	21-10-2006		últ. citació	6-10-2010

El 30-3-2010 hi ha una arpella sedimentada a la cua de l'embassament, i també se n'observa una altra en vol migratori cap al nord. El 2-4-2010 s'observa un mascle que migra cap al nord. Al pas postnupcial va ser abundant.

Arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x					x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		19-4-2007			Enguany			marxa		-		
	arribada		2-9-2007						arribada		18-9-2010		

S'ha observat en tres ocasions al pas postnupcial, el 18-9-2010, el 15-10-2010 i el 16-10-2010.

Arpella pàl·lida russa (*Circus macrourus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
										x			

El 6-10-2010 a la tarda s'observa un exemplar des del Turó de les Tres Partions. Aquesta és la primera citació de l'espècie al Parc del Foix. És un ocell rapinyaire que al nostre país ha estat vist molt poques vegades, ja que acostuma a realitzar els seus viatges migratoris per rutes que passen per l'orient europeu.

Esparver cendrós (*Circus pygargus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
				x				x	x					

Els dies 21-8-2010, 3-9-2010, 5-9-2010 i 22-9-2010 s'observa un exemplar (cada dia) en pas migratori.

Astor (*Accipiter gentilis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x		augmenta			

El 25-3-2010 s'observa un exemplar que manifesta actituds de zel. El 21-8-2010 s'allibera una femella d'astor entre el Puig de l'Àliga i el Turó de les Tres Partions. El 19-9-201 i el 22-9-2010 es veuen exemplars migrants dels cims més alts del Parc. El 17-10-2010 (MPMB) s'observa un exemplar en pas migratori pel Turó de les Tres Partions.

Esparver vulgar (*Accipiter nisus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta		

El 2-4-2010 s'observa un exemplar que migra cap al nord. A partir de meitats d'agost, el setembre i l'octubre es van anotar molts exemplars en vol migratori cap al sud. Al maig es van recollir indicis de cria probable.

Aligot comú (*Buteo buteo*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x	
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta				

S'ha continuat veient una parella que es reproduïx als límits del Parc. A la tardor es va anotar un pas i una entrada d'exemplars que vénen a hivernar.

Àliga cridanera (*Aquila clanga*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
										x	x				

No observat el 2010. Es disposa de registres dels anys 2008 i 2009.

Àliga daurada (*Aquila chrysaetos*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x							x					

No observat el 2010. Observada únicament els anys 2000 i 2005.

Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x		x	x	x	x		x	x	x			
Dates extremes	arribada		7-3-2009			Enguany			arribada		-		
estivals	marxa		25-10-2008						marxa		1-10-2010		
Nidificació	Anterior		segura			x		possible		no detectat			
	Enguany		segura					possible		no detectat		x	
Hàbitats preferents	zones urbanes						rupícoles						
de cria	conreus i erms						màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			

Destaquem l'observació d'un exemplar hivernant el 15-1-2010, que de bon matí estava aturat prop de cal Semison. Ja s'havia produït alguna citació d'exemplars hivernants al Parc, però són molt excepcionals.

Àliga cuabarrada (*Hieraetus fasciatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles			x		pinedes i alzinars		
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta	

El 4-3-2010 observem un exemplar que porta una presa a les potes. El 20-3-2010 veiem el niu arreglat amb branques verdes. A l'entorn del 15-4-2010 ens informen que ha mort el poll que hi havia al niu de l'àliga, hi ha indicis que podria ser a causa de molèsties.

Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*)

Fenologia		sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x			x	x	x		
Dates extremes		pr. citació		16-3-2004			Enguany		pr. citació		-		
migrants		últ. citació		9-5-2001					últ. citació		-		

	pr. citació	14-8-2010		pr. citació	14-8-2010
	últ. citació	21-10-2006		últ. citació	6-10-2010

Ha estat un bon any en què s'ha observat una quantitat relativament abundant d'àligues pescadores en pas postnupcial (un mínim de 9). L'observació del 14-8-2010 avança el registre més primerenc del pas postnupcial.

Xoriguer petit (*Falco naumanni*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
									x					

No observat el 2010. Darreres observacions any 2000.

Xoriguer comú (*Falco tinnunculus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 7-3-2010 als entorns del castell de Sant Raimon de Penyafort observem una parella en zel que arriba a realitzar una còpula. El 18-5-2010 veiem un exemplar amb una presa a les potes. Al pas postnupcial ha estat molt abundant amb dies de pas intens com ara el 6-10-2010 amb un mínim de 60 exemplars migrant.

Falcó cama-roig (*Falco vespertinus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
									x	x									

No observat el 2010. Darrera observació any 1998, 2004, 2005, 2007 i 2009.

Esmerla (*Falco columbarius*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x		x	x					x	x	x	x
Dates extremes hivernants	marxa		14-3-2004			Enguany		marxa		-		
	arribada		28-9-2002					arribada		19-9-2010		

Ha estat observada diversos dies durant el pas postnupcial; el 19-9-2010, 5-10-2010, 6-10-2010 i 14-10-2010.

Falcó mostatxut (*Falco subbuteo*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		5-4-1996			Enguany		arribada		15-5-2010				
	marxa		23-10-2004					marxa		8-10-2010				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura			probable		x	possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 15-5-2010 s'observen diversos migrants, en total s'arriben a anotar un mínim de 4 exemplars. El 18-5-2010 hi ha un exemplar que acaba de caçar i està menjant la presa aturat a un fil elèctric prop de les Masuques. El 6-9-2010 (MOVA) es captura un exemplar que és anellat i alliberat.

Falcó de la reina (*Falco eleonora*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
								x	x	x			

El 18-9-2010, el 19-9-2010 i el 22-9-2010 s'anota un exemplar en pas cada dia. El 29-9-2010 (MPMB) s'observen un exemplar de fase clara i un altre de fase fosca en pas migratori pel Turó de les Tres Partions. En total, doncs, han estat 5 els exemplars observats, aquesta xifra representa l'any que se n'han vist més.

Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*)

[illegible]

El 15-4-2010 s'anota un exemplar a les muntanyes del Parc, la citació ens indica que no massa lluny ha de tenir el niu. El 24-12-2010 s'observa un exemplar als entorns de la Casa Alta que vola amb una presa a les potes.

Rascló (*Rallus aquaticus*)

Rasclet (<i>Rhamus aquaticus</i>)														
Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible				no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible				no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		?	augmenta			

Tot i que la major part de citacions es produeixen durant els mesos de tardor i hivern, hi ha alguna parella que es pot quedar a nidificar a l'embassament, sobretot en anys com aquest 2010 que el nivell de les aigües s'ha mantingut alt. El 25-6-2010 s'obté un registre de probable reproducció.

Polla pintada (*Porzana porzana*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x								

El 16-3-2010, el 20-3-2010 i el 7-4-2010 s'observa un exemplar a la cua de l'embassament.

Rascletó (*Porzana parva*)

[illegible]

No observat el 2010. Es disposa de registres dels anys 1998 i 2005.

Rasclet (*Porzana pusilla*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x					x				

No observat el 2010. Es disposa de registres dels anys 1978 i 1998.

Guatlla maresa (*Crex crex*)

[illegible]

No observat el 2010. Darrera observació 13-12-1967 (PMRA).

Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*)

[illegible]

Nidificació	Anterior	segura	x	probable		possible		no detectat	
	Enguany	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100	x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles		pinedes i alzinars			
	conreus i erms			màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	x		
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable	x	augmenta			

El 24-6-2010 observem polls sortits del niu recentment. El 25-6-2010 veiem una femella amb 2 polls. El 2-7-2010 veiem un adult amb 5 polls nounats. El 6-9-2010 trobem un exemplar atropellat a la carretera de l'Arboç.

Polla blava (*Porphyrio porphyrio*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura			probable			possible			no detectat	x
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars					
		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					x

El 3-11-2010 veiem un adult que porta becada diverses vegades per a 2 polls nascuts recentment. El 7-11-2010 els 2 adults aporten becada a un poll. Aquest 2010 ha estat el primer any en què s'ha pogut comprovar la reproducció de la polla blava a l'embassament del Foix. A més, aquesta citació també és la primera per a les comarques del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf). La polla blava és una espècie que els darrers anys s'ha anat expandint força al territori català.

Fotja (*Fulica atra*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable				augmenta				

L' 1-3-2010 observem un exemplar que construeix niu a la cua de l'embassament. El 16-4-2010 observem una altra parella que construeix niu. El 17-5-2010 s'observa una femella amb 4 polls molt petits. El 26-7-2010 es veuen joves. A l'hivern, el 4-2-2010, és quan es va observar el màxim d'exemplars, 26 en total.

Fotja banyuda (*Fulica cristata*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x												

No observat el 2010. Sols tenim notícia d'una observació del 9-2-2004 (ASA, EFM).

Grua (*Grus grus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
		x										x		x

No observat el 2010. Darrera observació anys 1998, 1999, 2007 i 2009.

Sisó (*Tetrax tetrax*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x									

No observat el 2010. Es disposa de registres del 26-4-1972 (PMRA) i 9-3-2008 (MPMB).

Cames llargues (*Himantopus himantopus*)

Canins marçals (Ximantopas i Ximantopas)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		6-3-2002			Enguany		arribada		8-5-2010			
	marxa		3-10-2008					marxa		23-7-2010			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		x	

El cames llargues s'ha observat tant a la cua de l'embassament com a una bassa prop de les Masuques, sempre un o dos exemplars.

Torlit (*Burhinus oedicnemus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2010. Darrera observació anys 1950/60 i 2008.

Corriol petit (*Charadrius dubius*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals		arribada		13-3-2002			Enguany		arribada		25-3-2010			
		marxa		28-9-2001					marxa		16-8-2010			
Nidificació		Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
		Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

S'ha observat tant a la cua de l'embassament com a la pedrera de la cimitera dels Monjos i a una bassa prop de les Masuques. El nivell alt de les aigües de l'embassament ha dificultat la seva presència al pantà.

Corriol gros (*Charadrius hiaticula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
									x					

No observat el 2010. Es disposa d'un registre del 8-9-2006 (XPCA).

Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*)

Daurada grossa (x. lavians apfearia)															
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
												x	x		

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1985 i 2001.

Fredulega (*Vanellus vanellus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
	x	x	x									x	x
Dates extremes hivernants	marxa		4-3-2005			Enguany			marxa		10-1-2010		
	arribada		5-11-2007						arribada		9-11-2010		

El 10-1-2010 s'anoten diversos grups de fredulegues que volen cap al sud. En concret un grup de 30, un de 16 i un de 49 exemplars. Això va ser produït per una baixada de temperatures molt forta dels dies anteriors. El 9-11-2010 a prop de la Ràpita veiem 5 fredulegues. El 17-12-2010 s'observa un exemplar als conreus a la banda de l'Arboç.

Territ menut (*Calidris minuta*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
							x	x	x			

No observat el 2010. Darreres observacions any 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006 i 2009.

Territ de Temminck (*Calidris Temminckii*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2010. Únicament es va observar l'agost de l'any 1998.

Territ beclarg (*Calidris ferruginea*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
					x			x									

No observat el 2010. Darreres observacions any 2001.

Territ variant (*Calidris alpina*)

Fenologia variant (Cantaris alpina)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x	x			

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1999 i 2001.

Becadell sord (*Lymnocyrtus minimus*)

Becard de sord (<i>Eumyias polioptila minor</i>)																			
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
	x	x	x																

No observat el 2010. Darreres observacions any 1998, 2008 i 2009.

Becadell comú (*Gallinago gallinago*)

Decadenes com a (Guanyada guanyada)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x						x	x	x
Dates extremes	marxa		26-4-2005			Enguany			marxa		1-3-2010	
hivernants	arribada		7-10-2004						arribada		6-11-2010	

Encara que en poca quantitat s'ha observat diverses vegades a la cua de l'embassament, i també en una ocasió al riu Foix a prop de les Masses.

Becada (*Scolopax rusticola*)

Becuda (Sceloporus rusticola)														
Fenologia	sedentari			estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x							x	x	x		
Dates extremes	marxa		14-3-2004			Enguany			marxa		-			
hivernants	arribada		27-10-1996						arribada		17-12-2010			

Tan sols s'ha anotat un exemplar als entorns de la Marina el 17-12-2010.

Tètol cuanegre (*Limosa limosa*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x		x							

No observat el 2010. Es disposa de registres dels anys 1973 i 1985.

Tètol cuabarrat (*Limosa lapponica*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	x
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	---

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Gamba roja pintada (*Tringa erythropus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x			x					

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1998, 2003 i 2005.

Gamba roja vulgar (*Tringa totanus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x			x	x	x			

No observat el 2010. Darrera observació anys 2004, 2005, 2006 i 2008.

Gamba verda (*Tringa nebularia*)

Santula vespa (E. inga nebulosa)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x		x	x	x	x		

No observat el 2010. Darreres observacions any 1998, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 i 2009.

Xivita (*Tringa ochropus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Dates extremes	marxa		22-4-2003		Enguany		marxa		20-4-2010			
hivernants	arribada		14-6-2005				arribada		2-7-2010			

Sobretot s'ha anat observant durant les èpoques de pas. Hi ha una observació del 7-3-2010 que tant podria correspondre a un exemplar hivernant com a un exemplar en pas prenupcial molt primerenc.

Valona (*Tringa glareola*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x	x	x	x	x		

No observat el 2010. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 i 2007.

Xivitona (*Actitis hypoleucos*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dates extremes migrants	pr. citació		5-3-1999			Enguany			pr. citació		2-4-2010	
	últ. citació		24-5-1980						últ. citació		18-5-2010	
	pr. citació		21-6-2007(PTEA)						pr. citació		23-7-2010	
	últ. citació		19-11-1999						últ. citació		1-10-2010	

La xivitona ha estat observada als dos passos migratoris, el prenupcial i el postnupcial.

Gavina capnegra (*Larus melanocephalus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
							x	x			x	

No observat el 2010. Darreres observacions any 2005, 2007, 2008 i 2009.

Gavina menuda (*Larus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x									

No observat el 2010. Es disposa de registres de l'any 1999.

Gavina vulgar (*Larus ridibundus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Durant el 2010 s'han anat observant exemplars durant la major part de l'any. Encara que entre abril i juny no se'n van veure, mentre que al juliol i agost diversos dies s'anotaven entre 50 i 100 exemplars.

Gavina corsa (*Larus audouinii*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
						x		x			x		

El 22-6-2010 es va observar un exemplar a l'embassament. Aquesta és una au que en aquest espai natural s'havia pogut observar tan sols en tres ocasions, per tant la citació d'aquest 2010 és de gran interès. Es va poder veure un exemplar pescant alburns davant de la Marina.

Gavià fosc (*Larus fuscus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2010. Observat únicament l'any 2001.

Gavià argentat (*Larus michaellis*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
	x		x	x	x	x			x										

El 20-2-2010 observem un grup de 78 exemplars que sobrevola l'embassament, volen en formació en direcció al sud-oest.

Xatrac gros (*Sterna caspia*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
				x															

No observat el 2010. Darreres observacions anys 2002, 2005 i 2006.

Fumarell carablanc (*Chlidonias hybrida*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x				

No observat el 2010. Darreres observacions any 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2009.

Fumarell negre (*Chlidonias niger*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x		x	x	x			

No observat el 2010. Darreres observacions any 1980, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2009.

Fumarell alablanc (*Chlidonias leucopterus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2010. Observat sols en una ocasió el 19-9-2008 (XPCA).

Colom roquer (*Columba livia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible			no detectat		
	Enguany	segura			x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100		x	Més de 100		

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes	x	rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	

S'anota de forma habitual a l'entorn de molts nuclis urbans.

Xixella (*Columba oenas*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible			no detectat		
	Enguany	segura			x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles				x		pinedes i alzinars		
		conreus i erms			màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta	

El 14-10-2010 des del Turó de les Tres Partions s'observen 2 exemplars en desplaçament migratori.

Tudó (*Columba palumbus*)

Fenologia	sedentari		x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior			segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany			segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El dia 1-3-2010 s'observen diversos exemplars en vol de zel. El 14-3-2010 s'observa una parella amb actituds de festeig i que finalment realitza una còpula. El 15-4-2010 es localitza un niu ocupat per una parella. El 17-4-2010 s'anoten exemplars en zel. El 17-5-2010 s'observa una parella al niu. El 24-5-2010 i el 28-6-2010 es veuen parelles en zel. Al pas postnupcial s'anoten diversos estols de migrants, per exemple el 8-10-2010 passen 62 exemplars.

Tórtora turca (*Streptopelia decaocto*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		augmenta		x			

S'observa habitualment a diverses poblacions i entorns urbans; els Monjos, la Ràpita, les Masuques, Castellet.

Tórtora (*Streptopelia turtur*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada	2-4-2005				Enguany			arribada		17-4-2010			
	marxa	11-10-2009							marxa		16-8-2010			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable			augmenta				

S'ha observat entre els mesos d'abril i agost en ambients forestals i agrícoles.

Cucut reial (*Clamator glandarius*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x	x		x					
Dates extremes estivals	arribada		5-2-2009			Enguany		arribada		-		
	marxa		23-7-2006(PTEA)					marxa		-		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat	
	Enguany		segura			probable		possible		x	no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			
	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			

El 15-4-2010 (DIVA-ORNITHO.CAT) s'observen 2 exemplars als entorns de Castellet. Es manté una població molt baixa.

Cucut (*Cuculus canorus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		25-3-2010			Enguany			arribada		25-3-2010		
	marxa		12-9-2008						marxa		12-6-2010		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura			probable		x	possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x
	conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera		x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta	

Destaquem l'observació d'un exemplar el 25-3-2010, que emet unes veus poc conegudes i que resta amagat entre la vegetació de ribera de la cua de l'embassament. Aquesta citació passa a ser el registre més primerenc obtingut fins ara al Parc del Foix.

Òliba (*Tyto alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x		x	x	x			x			
Nidificació		Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
		Enguany		segura			probable			possible		x	no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes		x	rupícoles		x	pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 8-8-2010 trobem egagròpiles d'òliba, hi ha restes de 42 musaranyes comunes, 22 ratolins de bosc, 7 ratolins mediterranis i 2 ratolins domèstics.

Xot (*Otus scops*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI		XII	
						x		x	x	x				x				
Dates extremes estivals		arribada		5-4-1980					Enguany			arribada		30-5-2010				
		marxa		11-7-2001								marxa		-				
Nidificació		Anterior			segura			x	probable			possible			no detectat			
		Enguany			segura				probable			possible			x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			x	10 a 100						Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles					pinedes i alzinars					x
		conreus i erms				x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			x	estable						augmenta			

El 30-5-2010 un mascle canta a un bosc de ribera que flanqueja el riu Foix.

Duc (*Bubo bubo*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100					
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta					

El 5-4-2010 observem un exemplar amb el territori de cria establert a una fondalada poc accessible.

Mussol comú (*Athene noctua*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 24-6-2010 un exemplar marca territori entorn d'una petita edificació enrunada. El 21-8-2010 s'alliberen 10 mussols a diferents punts del Parc del Foix. El 6-9-2010 trobem un exemplar atropellat.

Gamarús (*Strix aluco*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta		

El 21-8-2010 s'allibera un exemplar de gamarús entre el Puig de l'Àliga i el Turó de les Tres Partions.

Mussol banyut (*Asio otus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x		x						
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars			x	
	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				

No observat el 2010. Darreres observacions anys 2004 i 2005.

Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		19-4-2002			Enguany			arribada		30-5-2010			
	marxa		1-10-2003						marxa		-			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms	x	màquies i garrigues	x	z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	

Hi ha diverses parelles establertes a la zona de muntanya del Parc, de forma més escassa en podem trobar alguna als conreus ermotats.

Siboc (*Caprimulgus ruficollis*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
					x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		17-5-1997				Enguany			arribada		30-5-2010			
	marxa		27-9-2007							marxa		-			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable			x	augmenta			

Es manté una població molt petita de siboc a l'entorn dels conreus que flanquegen el riu Foix.

Ballester (*Apus melba*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		12-3-2007			Enguany			arribada		20-3-2010			
	marxa		30-10-2003						marxa		17-10-10(MPMB)			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles				x	pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable				augmenta		x	

Destaquem la troballa d'una nova colònia de cria als entorns de Santa Margarida i els Monjos.

Falciot negre (*Apus apus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		25-3-2010			Enguany			arribada		25-3-2010			
	marxa		3-10-2004						marxa		19-9-2010			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100			x
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

La citació de les arribades del 25-3-2010, passa a ser la més primerenca obtinguda al Parc del Foix. El 17-5-2010 s'observa una parella que entra al niu.

Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
						x	x	x	x					

El 21-8-2010 s'observen un o més exemplars caçant insectes als entorns del Turó de les Tres Partions.

Blauet (*Alcedo atthis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura			probable		x	possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x

El 28-6-2010 s'observa a un grupet de blauets, un dels exemplars és un poll volander i els altres 2 li donen becada diverses vegades. El 2-7-2010 s'observa com 2 exemplars entren i surten d'un talús. El 17-7-2010 un exemplar surt del niu que hi ha al petit talús on es veien intervenir en dies passats. Finalment aquest 2010 es verifica la reproducció de l'espècie al Parc del Foix. Feia anys que es recollien evidències probables de reproducció, però fins ara mai s'havia localitzat un niu de blauet.

Abellerol (*Merops apiaster*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI		XII		
						x		x	x		x		x						
Dates extremes estivals		arribada		7-4-2010				Enguany				arribada		7-4-2010					
		marxa		29-9-2001								marxa		26-9-2010					
Nidificació		Anterior				segura		x	probable				possible				no detectat		
		Enguany				segura		x	probable				possible				no detectat		
Estimació de parelles nidificants						1 a 10			10 a 100			x		Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars					
		conreus i erms				x		màquies i garrigues				x		z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant						disminueix						estable		x		augmenta			

La citació del 7-4-2010 avança en un dia el registre més primerenc obtingut fins ara al Parc del Foix. El 2-5-2010 i el 8-5-2010 s'observen exemplars que estan a prop dels nius i que ja els estan començant a arreglar. El 30-5-2010 una trentena d'exemplars entra a ajocar-se a uns arbres de la cua de l'embassament. El 24-6-2010 intervenen als nius. El 2-7-2010 un exemplar porta becada al niu. El 2-8-2010 veiem un estol format per exemplars adults i per joves volanders.

Gaig blau (*Coracias garrulus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x						

El 15-5-2010 s'observa un exemplar migrant que vola arran de muntanya per la zona dels camps de Bellestar.

Puput (*Upupa epops*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior			segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany			segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100			x		Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				x		rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				x		màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable			x		augmenta			

S'ha anat observant durant tot l'any a l'entorn de les terres de conreu.

Colltort (*Jynx torquilla*)

Fenologia		sedentari		estival		x	hivernant		?	de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Dates extremes		arribada		4-3-2010			Enguany			arribada		4-3-2010		
estivals		marxa		19-9-2009(JGGF)						marxa		-		
Nidificació		Anterior		segura		x	probable			possible		no detectat		

	Enguany	segura		probable	x	possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10		x	10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars		x		
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera		x		
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable		x	augmenta		

Destaquem la citació del 4-3-2010, ja que esdevé l'arribada més primerenca obtinguda al parc del Foix.

Picot verd (*Picus viridis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars			x	
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

Aquest any s'ha observat una ocupació de nous territoris a l'entorn de l'embassament, la qual cosa ens fa intuir una possible expansió de l'espècie a nivell general al Parc.

Picot garser gros (*Dendrocopos major*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta		x		

Se segueix observant l'expansió de l'espècie, que aquest any ha estat anotada amb major quantitat i major freqüència que els darrers anys.

Picot garser petit (*Dendrocopos minor*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x										
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 20-3-2010 es detecta un exemplar cantant en un bosc de ribera al riu Foix.

Terrerola vulgar (*Calandrella brachydactyla*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
					x										

No observat el 2010. Es disposa d'un registre del 22-5-2002 (PTEA).

Cogullada vulgar (*Galerida cristata*)

Segunda Varig (Cercada errada)													
Fenologia	sedentari		x	estival		hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100		

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		
	conreus i erms		x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant	disminueix		x	estable			augmenta		

Tot i la disminució que ha sofert l'espècie durant els darrers 20 anys, es mantenen unes quantes parelles nidificants.

Cogullada fosca (*Galerida theklae*)

Fenologia	sedentari		x	estival				hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				
Nidificació	Anterior			segura			x	probable			possible			no detectat			
	Enguany			segura			x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable			x	augmenta				

El 15-4-2010 localitzem 2 territoris diferents de cria de cogullada fosca, en un d'ells s'observa a un exemplar que porta becada.

Cotoliu (*Lullula arborea*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues		x		z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta		

El 7-3-2010 observem dues parelles als entorns del castell de Sant Raimon de Penyafort que ja semblen establertes al territori de cria. Al mes de maig s'observen diverses parelles nidificants.

Alosa vulgar (*Alauda arvensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		12-3-2005			Enguany			marxa		2-2-2010		
	arribada		7-10-2006						arribada		16-10-2010		

A partir de l'octubre s'observen les primeres arribades dels exemplars que es quedaran a passar l'hivern aquí.

Oreneta de ribera (*Riparia riparia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x	x	x		x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació		26-2-2007			Enguany		pr. citació		18-3-10(DIVA)		
	últ. citació		11-6-1998					últ. citació		17-5-2010		
	pr. citació		7-8-1998					pr. citació		14-8-2010		
	últ. citació		15-10-2000					últ. citació		22-9-2010		

Ha estat observada tant al pas migratori prenupcial com al postnupcial. Destaquem l'anellament de 6 exemplars durant el mes de setembre (MOVA).

Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles			x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			

Tendència poblacional nidificant	disminueix	x	estable		augmenta	
----------------------------------	------------	---	---------	--	----------	--

Entre setembre i octubre es va anotar un bon nombre d'exemplars migrants, per exemple el 16-10-2010 un mínim de 29 migrants. A l'hivern també es poden veure roquerols arrecerats a diversos punts.

Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació	I		II		III		IV	V		VI		VII		VIII		IX	X	XI	XII
				x		x		x		x		x		x		x		x	
Dates extremes estivals		arribada		17-2-1979				Enguany				arribada		1-3-2010					
		Enguany		15-11-1998								marxa		17-10-10(MPMB)					
Nidificació		Anterior		segura		x		probable				possible				no detectat			
		Enguany		segura		x		probable				possible				no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10						10 a 100						Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				x		rupícoles						pinedes i alzinars					
		conreus i erms				x		màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				x		estable						augmenta			

Es va observar amb regularitat entre març i octubre.

Oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant					
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
				x	x	x	x	x	x	x	x									
Dates extremes estivals		arribada		7-3-2008				Enguany			arribada		25-3-2010							
		marxa		3-10-2008							marxa		-							
Nidificació		Anterior			segura		x	probable				possible				no detectat				
		Enguany			segura			probable		x		possible				no detectat				
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			x		10 a 100					Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles				x		pinedes i alzinars						
		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera						

El 25-3-2010 s'observen dos exemplars al pantà.

Oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada	19-2-2004				Enguany			arribada	1-3-2010				
	marxa	4-11-2009							marxa	17-10-10(MPMB)				
Nidificació	Anterior	segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany	segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 30-5-2010 una parella arregla el niu a Torrelletes. Es manté com a nidificant a diversos nuclis urbans.

Trobat (*Anthus campestris*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		11-4-2004			Enguany			arribada		15-5-2010	
	marxa		27-9-2008						marxa		12-6-2010	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars	
	conreus i erms					màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera		

Es manté la població nidificant, amb poques parelles, establertes a la zona de muntanya.

Piula dels arbres (*Anthus trivialis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x				x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació		26-3-1999			Enguany		pr. citació		15-4-2010		
	últ. citació		29-4-2010					últ. citació		29-4-2010		
	pr. citació		15-8-2002					pr. citació		6-9-2010		
	últ. citació		18-10-2003					últ. citació		27-9-2010		

S'ha observat durant el pas prenupcial i el postnupcial. Destaquem l'observació del 29-4-2010 que passa a ser la més tardana del pas prenupcial al Parc del Foix.

Titella (*Anthus pratensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x					x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		9-4-1979			Enguany			marxa		2-4-2010		
	arribada		13-9-2005						arribada		13-10-2010		

S'ha observat amb regularitat durant l'hivern, tant a primers d'any com al final.

Grasset de muntanya (*Anthus spinoletta*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
			x							x									

El 16-10-2010 s'observa un estol de 4 exemplars que passen migrant pel Turó de les Tres Partions. L'observació és de gran interès, ja que és una au citada en comptades ocasions al Parc.

Grasset de costa (*Anthus petrosus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x									

No observat el 2010. Es disposa de registres de l'any 1998.

Cuereta groga (*Motacilla flava*)

Fenologia		sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant								
Mesos observació		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
						x		x		x								x		x					
Dates extremes migrants		arribada		22-3-1998						Enguany						arribada		-							
		marxa		1-5-2004												marxa		-							
		arribada		5-9-2001												arribada		-							
		marxa		25-10-2003												marxa		-							

No observat el 2010. Darreres observacions any 2004, 2005, 2006, 2008 i 2009.

Cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			x	augmenta				

A l'hivern s'observa regularment, encara que en poca quantitat, al riu i a l'embassament. En època de cria sols en queda alguna parella, i no tots els anys.

Cuereta blanca (*Motacilla alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant	x	de pas	x	divagant	
-----------	-----------	---	---------	--	-----------	---	--------	---	----------	--

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars		
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta		

El 2-4-2010 s'observa un exemplar que transporta materials per construir el niu.

Merla d'aigua (*Cinclus cinclus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant				x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
											x		

El 26-11-2010 s'observa un exemplar d'aquesta espècie a la cua de l'embassament (XPCA-ORNITHO.CAT). Es la primera citació d'aquesta espècie al Parc del Foix. Aquest ocell s'ha observat diverses vegades al curs alt del riu Foix, tot i això és una espècie poc habitual al Penedès. L'aparició d'un exemplar a la cua del Pantà podria respondre a uns dies en què hi va haver forts freds, que haurien desplaçat l'ocell fins aquí.

Cargolet (*Troglodytes troglodytes*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles			x	pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

Aquesta espècie, tot i que és força amagadissa, es detecta al llarg de tot l'any mercès als seus reclams.

Pardal de bardissa (*Prunella modularis*)

Fenologia	sedentari			estival		hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x							x	x	x		
Dates extremes	marxa		28-3-2003			Enguany			marxa		25-3-2010			
hivernants	arribada		8-10-2005						arribada		14-10-2010			

Durant els períodes hivernals s'ha anotat de forma regular, ja que tot i el seu caràcter esquiu s'escolta sovint. El 16-10-2010 (MOVA) es capturen dos exemplars en les sessions d'anellament.

Pit-roig (*Erithacus rubecula*)

Fenologia	sedentari		x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior			segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany			segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				x
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable			augmenta		x		

S'ha anotat de forma habitual al llarg de tot l'any. Sembla que es manté a l'alça la tendència de la població reproductora, ja que es localitzen parelles en nous indrets.

Rossinyol (*Luscinia megarhynchos*)

Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes	arribada		2-4-2010				Enguany			arribada		2-4-2010			

estivals	marxa	1-10-1999			marxa	22-9-2010
Nidificació	Anterior	segura	x	probable	possible	no detectat
	Enguany	segura	x	probable	possible	no detectat
Estimació de parelles nidificants		1 a 10		10 a 100		Més de 100
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles		pinedes i alzinars
de cria	conreus i erms	x		màquies i garrigues	x	z. humides/bosc ribera
Tendència poblacional nidificant		disminueix		estable	x	augmenta

La data de la primera arribada, el 2-4-2010, és anterior als registres de l'espècie obtinguts fins al moment.

Cotxa blava (*Luscinia svecica*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x					x	x	x				
Dates extremes migrants	pr. citació		12-3-1998			Enguany			pr. citació		-			
	últ. citació		15-3-1998						últ. citació		-			
	pr. citació		28-8-05 (JGGF)						pr. citació		12-9-10(MOVA)			
	últ. citació		31-10-1998						últ. citació		18-10-2010			

El 12-9-2010 (MOVA) al pantà es capturen 2 exemplars que són anellats i alliberats. El 18-10-2010 s'observa un exemplar a la cua de l'embassament.

Cotxa fumada (*Phoenicurus ochruros*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x				x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta					

El 14-10-2010 s'arriben a anotar un mínim de 105 exemplars que passen migrant pels entorns del Turó de les Tres Partions. A l'hivern l'espècie és força abundant i ben distribuïda. A la primavera es va detectar una parella nidificant a Torrelletes.

Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació	25-3-2010					Enguany	pr. citació	25-3-2010			
	últ. citació	14-5-2002						últ. citació	5-4-2010			
	pr. citació	14-8-2010						pr. citació	14-8-2010			
	últ. citació	23-10-2004						últ. citació	22-9-2010			

Al pas prenupcial la data més primerenca és del 25-3-2010 i per al pas postnupcial la primera arribada es detecta el 14-8-2010. En ambdós casos els registres extrems són més primerencs que els que havíem recollit fins al moment.

Bitxac rogenc (*Saxicola rubetra*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
				x	x				x	x									
Dates extremes migrants	pr. citació	16-4-2002					Enguany	pr. citació	-										
	últ. citació	7-5-2000						últ. citació	-										
	pr. citació	11-9-2009						pr. citació	12-9-2010										
	últ. citació	8-10-73 (PMRA)						últ. citació	-										

Tan sols ha estat observat al pas migratori postnupcial.

Bitxac comú (*Saxicola torquatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant	x	de pas	x	divagant	
-----------	-----------	---	---------	--	-----------	---	--------	---	----------	--

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta	

El 30-5-2010 una femella porta becada cap al niu.

Còbit gris (*Oenanthe oenanthe*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x				x	x			
Dates extremes migrants	pr. citació		31-3-1998			Enguany			pr. citació		29-4-2010		
	últ. citació		11-5-2003						últ. citació		-		
	pr. citació		2-9-2005						pr. citació		21-9-2010		
	últ. citació		15-10-2004						últ. citació		14-10-2010		

S'ha observat als dos períodes de pas migratori.

Còbit ros (*Oenanthe hispanica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		13-4-2000			Enguany			arribada		29-4-2010		
	marxa		16-9-1997						marxa		-		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura			probable			possible		x	no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars			
	conreus i erms				màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable			augmenta			

El 29-4-2010 s'observa un exemplar en un sector de muntanya on en anys anteriors ja s'hi havia detectat un territori de cria. Els darrers anys, però, sembla mantenir la tendència a disminuir la seva presència al Parc.

Còbit roquer (*Oenanthe leucura*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
						x	x	x					

No observat el 2010. Darreres observacions any 2002, 2004 i 2008.

Merla roquera (*Monticola saxatilis*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x							
Dates extremes estivals	arribada		18-4-2001			Enguany			arribada		2-5-2010		
	marxa		12-6-2010						marxa		12-6-2010		
Nidificació	Anterior		segura			probable			possible			no detectat	x
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				

El 2-5-2010 a les muntanyes del Parc observem un mascle que realitza vols de zel repetidament, també canta amb força i defensa un territori. El 15-5-2010 s'observa el mascle cantant al mateix lloc que dues setmanes enrere, canta durant diverses hores al mateix punt (mentre suposem que la femella resta covant). El 12-6-2010 encara s'observa per la zona, però amb un comportament més esquiu.

Aquest any, doncs s'ha confirmat la reproducció de la merla roquera al Parc del Foix. Fins ara sols havia estat citada en períodes de pas migratori i de forma molt excepcional. És una au estival que nidifica a diverses zones de Catalunya. Mostra preferència per ambients naturals amb roquissars i sobretot pels prats de muntanya amb

roques disperses que troba al Pirineu i al Prepirineu. Al nostre país és un ocell que es considera poc abundant. A les comarques del Penedès la seva presència com a nidificant és molt escassa.

Merla blava (*Monticola solitarius*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 25-6-2010 veiem una parella que porta becada diverses vegades a una zona de penya-segats del riu Foix més avall de l'embassament.

Merla de pit blanc (*Turdus torquatus*)

Menja de pr. blanc (faras torquatas)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x	x	x	
Dates extremes migrants	pr. citació	-				Enguany		pr. citació	-			
	últ. citació	-						últ. citació	-			
	pr. citació	1-10-2003						pr. citació	26-9-2010			
	últ. citació	3-11-2008						últ. citació	17-10-10(MPMB)			

Destaquem l'observació d'un exemplar el 26-9-2010, ja que aquesta citació representa el registre més primerenc del pas postnupcial. El 14-10-2010 es va observar un exemplar en pas pel Turó de les Tres Partions. El 17-10-2010 (MPMB) s'observen 3 exemplars en pas migratori al Turó de les Tres Partions.

Merla (*Turdus merula*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat					
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat					
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x					
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x				
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			x				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x		augmenta					

És una au que s'observa durant tot l'any amb molta freqüència a la major part d'ambients naturals.

Griva cerdana (*Turdus pilaris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x									x	x	

No observat el 2010. Darrera observació anys 2000, 2001, 2002, 2004 i 2008.

Tord comú (*Turdus philomelos*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable			augmenta			x	

El 29-1-2010 prop de Torrelletes s'anota una entrada notable de tords cap als arbres on es van a ajocar. El 13-10-2010 observem un grupet de migrants sedimentats als entorns del Turó de les Tres Partions. Durant el pas

postnupcial, a l'octubre s'obtenen interessants registres d'exemplars en migració, per exemple el 14-10-2010 s'arriba a anotar un mínim de 240 exemplars migrant.

Tord ala-roig (*Turdus iliacus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		15-3-2005			Enguany			marxa		25-2-2010		
	arribada		14-10-2010						arribada		14-10-2010		

El 16-2-2010 observem 5 exemplars que entren a una joca. A destacar l'observació de 5 exemplars migrant el 14-10-2010, ja que representa el registre més primerenc de pas postnupcial obtingut fins ara al Parc del Foix.

Griva (*Turdus viscivorus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta					

El 15-5-2010 localitzem una parella que acaba de pondre el primer ou al niu. Curiosament el niu està situat en un cep enmig d'una vinya. El 18-5-2010 el niu ja té 5 ous i el 24-5-2010 ja els té covats. El 18-9-2010 hi ha una vintena d'exemplars que se sedimenten prop del Turó de les Tres Partions. En d'altres dates del pas postnupcial també se n'observen estols en migració, el 2-10-2010, per exemple, en passen un mínim de 62.

Rossinyol bord (*Cettia cetti*)

Rosinyor bord (Centa caia)																
Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		x	de pas			divagant			
Mesos observació	I		II	III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior			segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany			segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars						
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x	
Tendència poblacional nidificant		disminueix				estable				x	augmenta					

Al llarg de tots el mesos de l'any s'ha observat amb molta freqüència i en certa quantitat a l'embassament. A molts sectors del riu Foix i altres punts amb aigua també s'hi anota.

Trist (*Cisticola juncidis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

S'han anotat exemplars durant totes les èpoques de l'any, encara que a l'hivern costa de detectar perquè es manté molt localitzat en uns quants erms.

Boscaler pintat gros (*Locustella naevia*)

Ecosistema pinar 8-85 (Eucalyptus nauda)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x				x	x			

No observat el 2010. Darreres observacions any 2005, 2006 i 2009.

Boscaler comú (*Locustella luscinioides*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
					x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		2-5-1999			Enguany			arribada		-				
	marxa		19-10-1999						marxa		-				
Nidificació	Anterior		segura			probable		x	possible			no detectat			
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x

No observat el 2010. Darreres observacions any 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Boscarla d'aigua (*Acrocephalus paludicola*)

<i>Escaña d'aigua</i> (<i>Percepsnarus paradisea</i>)																			
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
								x											

No observat el 2010. Darreres observacions any 1998.

Boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Escarab dels joncs (Hercepspharus senecioideus)															
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
					x				x						

El 20-9-2010 (MOVA) a la cua de l'embassament es captura un exemplar que és anellat. Interessant observació, ja que esdevé la segona vegada que s'anota aquesta espècie al Parc del Foix.

Boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
						x	x	x	x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals		arribada		9-4-2009				Enguany		arribada		17-5-2010							
		marxa		4-11-2004						marxa		1-10-2010							
Nidificació		Anterior			segura				probable		x	possible			no detectat				
		Enguany			segura			x	probable			possible			no detectat				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars					
		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera				x	

La presència continuada de diversos exemplars durant els mesos de maig, juny i juliol en punts molt localitzats de l'embassament és una mostra evident de la reproducció d'aquesta au. En repetides ocasions s'han anotat mascles cantant, defensant el territori i fins i tot portant aliment al bec (17-5-2010, 22-6-2010, 24-6-2010, 25-6-2010, 28-5-2010, 2-7-2010). En principi s'han detectat un mínim de 3 territoris diferents ocupats. Pensem que les singularitats climatològiques, i especialment el freds tardans i l'abundor de pluges d'aquest any, poden haver influït en afavorir l'establiment d'aquestes aus.

Boscarla menjamosquits (*Acrocephalus palustris*)

Boscana mulleriana (A. leucophaea parastis)															
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
								x							

No observat el 2010. Es disposa de registres de l'any 1999.

Balquer (*Acrocephalus arundinaceus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		10-4-06(MBLA)			Enguany		arribada		16-4-2010		
	marxa		24-9-09(MOVA)					marxa		24-8-10(MBLA)		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars			

de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant	disminueix				estable				x	augmenta			

Hem de destacar que aquest 2010 el balquer s'ha anotat a diversos punts de la cua de l'embassament amb unes quantitats superiors a les dels darrers anys.

Bosqueta pàl·lida (*Hippolais opaca*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
								x						

No observat el 2010. Darreres observacions any 1973 (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Bosqueta vulgar (*Hippolais polyglotta*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		17-4-2010			Enguany			arribada		17-4-2010		
	marxa		24-9-2009						marxa		6-9-2010		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100	x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		
	conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera		x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta	

La citació del 17-4-2010 passa a ser la més primerenca que hem obtingut fins ara al Parc.

Tallarol de casquet (*Sylvia atricapilla*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta		x		

S'observa durant tot l'any, a l'hivern i en períodes de migracions són molt nombrosos.

Tallarol gros (*Sylvia borin*)

Fenologia	sedentari		estival		?	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x	x	x	x	x	x		
Dates extremes estivals	arribada		5-5-2008				Enguany		arribada		-	
	marxa		23-10-2001						marxa		18-10-2010	

Tan sols s'ha observat durant el pas migratori postnupcial.

Tallarol emmascarat (*Sylvia hortensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x		x		x					

El 30-3-2010 s'anota el cant d'un exemplar. Aquesta és una espècie que ha minvat molt, tan sols s'observa de manera molt esporàdica uns quants anys durant el pas migratori.

Tallareta vulgar (*Sylvia communis*)

Fenologia														
sedentari			estival			hivernant			de pas			x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x			x	x	x			
Dates extremes migrants		pr. citació		17-4-2004			Enguany		pr. citació		-			
		últ. citació		12-5-1999					últ. citació		-			

	pr. citació	22-8-2000		pr. citació	19-9-10(MOVA)
	últ. citació	12-10-1998		últ. citació	22-9-2010

El 19-9-2010 (MOVA) a l'embassament es captura un exemplar que és anellat i alliberat. El 22-9-2010 s'observen 2 exemplars als entorns del pantà de Foix.

Tallareta cuallarga (*Sylvia undata*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta					

El 5-4-2010 s'observen exemplars amb actituds de zel. El 30-5-2010 un exemplar porta becada cap al niu.

Tallarol de garriga (*Sylvia cantillans*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x		x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		29-3-2003			Enguany			arribada		2-4-2010		
	marxa		9-10-2001						marxa		3-9-2010		
Nidificació	Anterior		segura			probable			possible			no detectat	x
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
	conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				

Per primera vegada es documenta la reproducció d'aquesta espècie al Parc del Foix. Cal destacar l'observació d'un mascle que aporta materials al niu el 6-6-2010 (TPEA) als entorns del Turó de les Tres Partions. També resulta de gran importància l'observació d'un altre mascle el 25-6-2010 als entorns de l'embassament del Foix. Aquesta espècie en terres del Penedès és molt escassa a la Serralada Litoral, tan sols tenim constància de la seva cria en punts molt localitzats de les muntanyes d'Ordal. A les muntanyes del Parc del Foix, aquest 2010, s'hi han pogut localitzar un mínim de 2 territoris. Cal tenir present, a més, el comportament discret i esquiu de l'espècie. Pensem que les singularitats climatològiques, i especialment l'abundor de pluges d'aquest any, poden haver influït en afavorir l'establiment d'aquestes aus en localitats que altres anys potser són un xic massa àrides.

Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant				de pas				divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100	x	
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta		

Aquesta és una de les aus que s'observen amb major freqüència durant tot l'any al Parc del Foix.

Mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*)

Mossèn Jeroni Puig (Ptychocheilus borealis)																			
Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
				x	x	x	x	x	x	x	x								
Dates extremes		arribada		23-3-2006				Enguany				arribada		30-3-2010					
estivals		marxa		11-9-2003								marxa		6-8-2010					
Nidificació	Anterior			segura		x	probable				possible				no detectat				
		Enguany			segura		x	probable				possible				no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10					10 a 100		x	Més de 100						

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	x
	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable		x	augmenta

Els primers exemplars ja es van anotar a finals de març. Durant l'època reproductora van ser habituals i a l'agost es van produir les darreres observacions.

Mosquiter xiulaire (*Phylloscopus sibilatrix*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x				x						

El 15-4-2010 (DIVA-ORNITHO.CAT) s'observa 1 exemplar als entorns de Castellet.

Mosquiter ibèric (*Phylloscopus ibericus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x		x									

L'observació d'un mascle cantant el 25-3-2010 resulta de gran interès. Aquesta és la segona citació de l'espècie al Parc del Foix. És un ocell difícil de reconèixer, ja que és una espècie molt similar al mosquiter comú, el cant és un dels trets diferencials que ens van permetre la seva identificació.

Mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x	
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

Tot i ser una espècie predominantment hivernant, unes poques parelles nidifiquen al Parc.

Mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x	x		x	x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		25-3-2010			Enguany			pr. citació		25-3-2010				
	últ. citació		12-5-2003						últ. citació		17-4-2010				
	pr. citació		28-7-2007						pr. citació		6-8-2010				
	últ. citació		15-10-2000						últ. citació		22-9-2010				

L'observació del 25-3-2010, a més de ser la més primerenca d'enguany, ha estat de gran interès, ja que avança els registres obtinguts fins ara.

Reietó (*Regulus regulus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x							x	x	x			
Dates extremes hivernants	marxa		25-3-2004			Enguany			marxa		-				
	arribada		20-10-1998						arribada		9-12-2010				

A principis d'any, durant l'hivern no es va observar cap dia, en canvi a finals d'any, i més concretament al desembre ha estat força comú.

Bruel (*Regulus ignicapillus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior	segura			x	probable			possible			no detectat			
	Enguany	segura			x	probable			possible			no detectat			

Estimació de parelles nidificants	1 a 10		10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars		x
	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable		x	augmenta	

El 17-5-2010 s'observa un grupet de polls volanders que han sortit del niu recentment. El 6-8-2010 s'anota un grup de joves.

Papamosques gris (*Muscicapa striata*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		9-4-2000			Enguany			arribada		17-5-2010			
	marxa		8-10-1999						marxa		22-9-2010			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

S'ha observat entre els mesos de maig i setembre.

Mastegatxes (*Ficedula hypoleuca*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		30-3-2010			Enguany			pr. citació		30-3-2010				
	últ. citació		13-5-2001						últ. citació		8-5-2010				
	pr. citació		4-8-2009						pr. citació		23-8-2010				
	últ. citació		9-10-1998						últ. citació		1-10-2010				

El 8-5-2010 hi ha un exemplar que està caçant insectes molt a prop d'un niu de mallerenga blava, una de les mallerengues que ocupen el niu surt a envestir-lo fins que l'allunya de la zona. Destaquem la citació del 30-3-2010 que esdevé la més primerenca que hem obtingut al Parc del Foix.

Mallerenga cuallarga (*Aegithalos caudatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 2-2-2010 a la riera de Llitrà i el 4-2-2010 als entorns del pantà ja es localitzen les parelles formades. El 4-2-2010 trobem un exemplar atropellat a la carretera de Clariana. El 2-5-2010 i el 18-5-2010 ja s'observa un estol de joves que fa poc han sortit del niu. El 30-5-2010 i el 2-6-2010 veiem un grupet de polls volanders acompanyat dels adults que encara els donen becada.

Mallerenga emplomallada (*Parus cristatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars		x				
		conreus i erms		màquies i garrigues		x. z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x		augmenta		

El 2-5-2010 s'observa un estol de joves que fa poc han sortit del niu.

Mallerenga petita (*Parus ater*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x		Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta				x

El 17-5-2010 s'observa un exemplar que entra al niu amb becada. El 28-6-2010 veiem un grup familiar amb polls volanders que segueixen als adults.

Mallerenga blava (*Parus caeruleus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat					
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat					
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars			x			
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			x			
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			x	augmenta				

El 17-4-2010 una parella entra al niu. El 8-5-2010 una parella té niu en un freixe, se'ls veu entrar i sortir diverses vegades, també s'observa com foragiten a un mastegatatzes que està caçant insectes molt a prop. El 2-6-2010 s'anota un grup de polls volanders.

Mallerenga carbonera (*Parus major*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x				
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars				x	
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta					

S'ha observat al llarg de tot l'any a la major part del Parc del Foix. El 20-5-2010 s'anota un grup de polls volanders que fa poc han sortit del niu.

Pela-roques (*Tichodroma muraria*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
	x	x																	

No observat el 2010. Es disposa de registres de l'any 2004.

Raspinell (*Certhia brachydactyla*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100			Més de 100			x		
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable			x	augmenta				

El 2-2-2010 a la riera de Llitrà ja es localitzen les parelles formades. El 2-6-2010 s'anota un adult peixant un poll.

Teixidor (*Remiz pendulinus*)

Fenologia	sedentari		estival			?	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		
Dates extremes hivernants	marxa		4-4-2007			Enguany			marxa		16-3-2010			
	arribada		26-8-2008						arribada		18-10-2010			

Observacions habituals de l'espècie durant els mesos d'hivern als canyissars de l'embassament. El 16-2-2010 s'arriben a observar un mínim de 10 exemplars.

Oriol (*oriolus oriolus*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
						x	x	x	x	x	x							
Dates extremes estivals		arribada		16-4-2006				Enguany			arribada		20-4-2010					
		marxa		11-9-2004							marxa		6-9-2010					
Nidificació		Anterior		segura		x	probable				possible				no detectat			
		Enguany		segura		x	probable				possible				no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10					10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars				x
		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant					disminueix					estable		x	augmenta					

Tal i com és habitual en l'espècie es va observar a partir de finals d'abril, fins a les primeries de setembre.

Botxí (*Lanius meridionalis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars						
de cria	conreus i erms			x		màquies i garrigues		x		z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable		augmenta			

El 12-6-2010 s'observa un exemplar que marca territori.

Capsigrany (*Lanius senator*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació	I		II		III		IV	V		VI		VII	VIII		IX	X		XI	XII
						x		x		x		x	x						
Dates extremes estivals		arribada		9-4-2000				Enguany				arribada		2-6-2010					
		marxa		28-8-2002								marxa		23-7-2010					
Nidificació		Anterior				segura		x	probable				possible				no detectat		
		Enguany				segura		x	probable				possible				no detectat		
Estimació de parelles nidificants						1 a 10						10 a 100		x		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars					
		conreus i erms				x		màquies i garrigues				x		z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant						disminueix		x		estable						augmenta			

El 23-7-2010 anotem un exemplar que marca territori. Enguany s'han produït poques observacions del capsigrany al Parc del Foix, des del 2008 hem notat una disminució clara de l'espècie.

Gaig (*Garrulus glandarius*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior	segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany	segura		x	probable			possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants		1 a 10		10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles			pinedes i alzinars		x
	conreus i erms		màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		x
Tendència poblacional nidificant		disminueix		estable		x	augmenta	

El 2-7-2010 observem un grupet de joves que fa poc ha sortit del niu, encara van amb els adults.

Garsa (*Pica pica*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta		

El 22-6-2010 i el 4-7-2010 s'observen joves sortits del niu fa pocs dies. Els darrers anys s'ha notat un lleu increment dels territoris al voltant de Castellet, però en conjunt l'espècie es manté estable.

Gralla (*Corvus monedula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		x	x	x	x	x			x	x		x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				

El 17-4-2010 s'observen 2 exemplars en vol prop de les Masuques. Aquesta espècie aquests darrers anys sembla que està consolidant un petit nucli reproductor en un punt del Baix Penedès proper al Parc del Foix.

Corb (*Corvus corax*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible		x	no detectat			
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles			x	pinedes i alzinars				
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable				augmenta			

El 4-3-2010 hi ha 5 exemplars que s'aturen a un niu. Possiblement es tracta d'exemplars juvenils nascuts al niu l'any anterior. En d'altres dates s'anota la parella d'adults a l'entorn del territori.

Estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta					

El 16-4-2010 observem una parella que construeix niu. El 2-6-2010 s'anota un grup de joves volanders. Al setembre i octubre s'observen exemplars migrant.

Estornell negre (*Sturnus unicolor*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		de pas		divagant	
-----------	-----------	---	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	--

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100	x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars			
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta		

El 8-5-2010 s'observa un exemplar que porta becada cap al niu. El 2-6-2010 s'anota un grup de joves volanders. El 17-5-2010 s'observa un exemplar que depreda a un dragó comú.

Pardal comú (*Passer domesticus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars					
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable			augmenta				

Les poblacions d'aquesta espècie (tot i la disminució dels seus efectius al llarg dels darrers 15 o 20 anys) es troben força repartides pels sectors més humanitzats de l'espai natural.

Pardal xarrec (*Passer montanus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

S'observa durant tot l'any a l'entorn de determinats sectors dedicats a l'agricultura.

Pardal roquer (*Petronia petronia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible			no detectat			
	Enguany	segura			x	probable		possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					x	pinedes i alzinars				
	conreus i erms			màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			x	augmenta			

A l'hivern s'ha anat veient a diversos punts en zones de conreus. Durant el període de cria resta molt localitzat a determinats cingles i talussos del Parc.

Pinsà comú (*Fringilla coelebs*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Dates extremes	marxa		7-4-2010		Enguany		marxa		7-4-2010			
hivernants	arribada		10-8-2007				arribada		2-10-2010			

El 29-1-2010 prop de Torrelletes s'anota una entrada forta de pinsans cap als boscos on es van a ajocar. Destaquem l'observació del 7-4-2010 que passa a ser la citació més tardana de marxes prenupcials.

Pinsà mec (*Fringilla montifringilla*)

[illegible]

No observat el 2010. Darrera observació any 2004, 2005 i 2008.

Gafarró (*Serinus serinus*)

Fenologia	sedentari	x	estival	x	hivernant		de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura	x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura	x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants			1 a 10		10 a 100		Més de 100	x				
Hàbitats preferents	zones urbanes	x	rupícoles		pinedes i alzinars	x						
de cria	conreus i erms	x	màquies i garrigues	x	z. humides/bosc ribera	x						
Tendència poblacional	nidificant		disminueix		estable	x	augmenta					

El 16-4-2010 observem diversos exemplars amb actituds de zel. El 17-4-2010 ja trobem polls volanders fora del niu. El 18-5-2010 i el 2-6-2010 es troba un grup de polls volanders.

Verdum (*Carduelis chloris*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars					x
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

Durant tot l'any s'ha anat observant a bona part del Parc. El 23-7-2010 s'observa un grup familiar amb els adults que acompanyen els joves sortits fa poc del niu. A l'octubre es van observar exemplars en pas migratori.

Cadenera (*Carduelis carduelis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents	zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars					x
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 8-5-2010 hi ha una parella que construeix niu, entra d'altres materials es pot observar com hi aporten llavors d'inflorescències. El 26-7-2010 es veuen joves. El 6-8-2010 s'observa un grup familiar amb els adults que acompanyen els joves sortits fa poc del niu. A l'octubre es van observar exemplars en pas migratori.

Lluer (*Carduelis spinus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x							x	x	x			
Dates extremes hivernants	marxa	28-3-2008				Enguany			marxa	1-3-2010					
	arribada	1-10-2005							arribada	16-10-2010					

S'han produït observacions regulars de l'espècie durant els períodes hivernals.

Passerell (*Carduelis cannabina*)

[illegible]

Nidificació	Anterior	segura	x	probable		possible		no detectat	
	Enguany	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		
	conreus i erms		x	màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable		x	augmenta		

El 26-7-2010 es veuen joves. A l'hivern s'anoten en estols nombrosos per les terres de conreu. Durant l'època de cria se'ls anota sobretot per màquies i garrigues, però també en alguns erms.

Trencapinyes (*Loxia curvirostra*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x			x	x	x		x	x			

El 5-10-2010, 8-10-2010 i 16-10-2010 s'observen exemplars en vol des del Turó de les Tres Partions. Si bé és una espècie que al Parc del Foix considerem força divagant, aquest 2010 s'ha vist diverses vegades en estols que es desplaçaven per zones de muntanya, el 16-10-2010 el grup és de 11 exemplars.

Pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x				x							x	x		

El 26-11-2010 s'anota un exemplar en un bosc de ribera del riu Foix proper a l'embassament. Aquesta és una espècie que ens visita algun hivern, però amb poca regularitat.

Durbec (*Coccothraustes coccothraustes*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x						x	x	x		
Dates extremes hivernants	marxa		1-4-2006			Enguany			marxa		-			
	arribada		15-10-2005						arribada		17-12-2010			

Tan sols ha estat citat el 17-12-2010 al bosc de ribera proper a la cua de l'embassament. És una espècie que hi ha hiverns que esdevé notablement abundant i d'altres molt escassa.

Sit blanc (*Plectrophenax nivalis*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x													

No observat el 2010. Es disposa d'un registre del 15-1-2004.

Verderola (*Emberiza citrinella*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x		x							x		x			

No observat el 2010. Darreres observacions any 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 i 2007.

Gratapalles (*Emberiza cirrus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 12-6-2010 un exemplar porta becada cap al niu.

Sit negre (*Emberiza cia*)

Fenologia	sedentari	?	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x		x					x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura				probable		x	possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable			possible			no detectat		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				

S'ha citat poques vegades, sempre en període hivernal.

Hortolà (*Emberiza hortulana*)

Fenologia	sedentari		estival			?	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x					x			
Nidificació	Anterior		segura				probable		x	possible		no detectat	
	Enguany		segura				probable			possible		no detectat	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera			

El 14-10-2010 (MPMB) s'anota el cant de 2 exemplars als entorns del Turó de les Tres Partions. Es tracta d'exemplars migrants que s'aturen a fer nit en aquestes muntanyes, ja que se senten a darrera hora mentre que durant la tarda no s'havien escoltat. Aquesta citació és de gran importància, ja que l'Hortolà és una espècie que s'ha observat en comptades ocasions al Parc del Foix.

Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		28-3-2005			Enguany			marxa		20-3-2010		
	arribada		14-10-2005						arribada		18-10-2010		

El 16-2-2010 observem uns 80 exemplars que entren a una joca. La resta de l'hivern s'han anat veient al capvespre i de matinada a l'entorn de la joca i la resta del dia en terres de conreu.

Cruixidell (*Emberiza calandra*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x				x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable			augmenta			

El 16-2-2010 observem uns 100 exemplars que entren a una joca. També ha estat observat en d'altres dates durant el període hivernal, gairebé sempre a l'entorn del punt on s'ajouquen. El 17-4-2010 s'anoten un mínim de 2 mascles cantant, la qual cosa ens fa pensar en la seva reproducció probable a l'entorn d'uns conreus.

- Espècies al·lòctones -

Oca del Canadà (*Branta canadensis*)

Oca del Canadà (<i>Branta canadensis</i>)																				
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
				x																

El 17-4-2010 s'observa un exemplar a una bassa propera a les Masuques. Davant la nostra presència l'exemplar es mostra salvatge i acaba per marxar volant cap al nord-est.

L'oca del Canadà és una au pròpia d'Amèrica del Nord. Va ser introduïda a alguns països de l'Europa septentrional i a l'actualitat s'han consolidat poblacions silvestres a les illes britàniques i a la península

escandinava. Els exemplars europeus a l'hivern poden realitzar moviments migratoris cap a territoris més meridionals de la resta de continent. És la primera citació de l'espècie al Parc del Foix i també a les comarques del Penedès.

Ànec mut (*Cairina moschata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
								x	x				

El 26-8-2010 s'observa un exemplar a la zona de pesca del Fondo de l'Alzina. L'animal davant la nostra presència es dirigeix a nosaltres com si demanés menjar.

Ànec carolí (*Aix sponsa*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x									

No observat el 2010. Darreres observacions any 2002.

Ànec mandarí (*Aix galericulata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	

No observat el 2010. Darreres observacions any 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.

Ànec domèstic (*Anas peking* / *Anas platyrhynchos* var. *domestica*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Al llarg de l'any s'han anat observant diversos exemplars (fins a un màxim de 5). Sovint se'ls ha vist a la zona de pesca del fondo de l'Alzina i de la Marina.

Periquito (*Melopsittacus undulatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x									

No observat el 2010. Darreres observacions any 2005 i 2007.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
								x		x			

No observat el 2010. Darreres observacions any 2001 i 2005.

Cotorra de pit gris (*Myiopsitta monachus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x			x					

No observat el 2010. Darreres observacions any 1998 i 2000.

Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
						x		x					

No observat el 2010. Darreres observacions any 2005.

Lloro de la Patagònia (*Cyanoliseus patagonus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
							x						

No observat el 2010. Darreres observacions any 2001.

Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves (*Lamprotornis chalybaeus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
												x

No observat el 2010. Darreres observacions any 2004.

Teixidor social (*Ploceus cucullatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2010. Darreres observacions any 2004.

Bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
						x	x	x	x	x	x	

Enguany s'han produït diverses observacions de l'espècie als mesos de setembre i novembre a l'entorn de la cua de l'embassament. El 22-9-2010 s'anota un mascle cantant.

Bec de corall cuanegre (*Estrilda troglodytes*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x		x				x	x

No observat el 2010. Darreres observacions any 2005, 2006, 2007 i 2009.

Vídua de cua d'agulla (*Vidua macroura*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2010. Darreres observacions any 2007.

Gafarró de front groc (*Serinus mozambicus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2010. Darreres observacions any 2005.

Es recull un resum de les citacions del 2010 d'altres vertebrats del Parc del Foix.

PEIXOS

Anguila (*Anguilla anguilla*) – 16-8-2010.

Alburn (*Alburnus alburnus*) – 2-4-2010, 20-4-2010, 8-5-2010, 18-5-2010, 20-5-2010, 24-5-2010, 2-6-2010, 22-6-2010, 25-6-2010, 28-6-2010, 2-7-2010, 23-7-2010, 26-7-2010, 6-8-2010, 18-10-2010.

Barb comú (*Barbus graellsii*) – No observat el 2010.

Barb cua-roig (*Barbus haasi*) – 4-7-2010.

Carpí vermell (*Carassius auratus*) – 20-5-2010.

Madrilleta roja (*Chondrostoma arcasii*) – No observat el 2010.

Carpa (*Cypinus carpio*) – 26-1-2010, 4-2-2010, 1-3-2010, 20-4-2010, 8-5-2010, 2-6-2010, 22-6-2010, 25-6-2010, 28-6-2010, 2-7-2010, 23-7-2010, 26-7-2010, 6-8-2010, 8-8-2010, 16-8-2010, 6-9-2010, 22-9-2010, 1-10-2010, 18-10-2010.

Bagra comuna (*Squalius cephalus*) – No observat el 2010.

Gambúsia (*Gambusia holbrooki*) – 20-4-2010, 20-5-2010, 2-6-2010, 22-6-2010, 25-6-2010, 28-6-2010, 2-7-2010, 23-7-2010, 6-8-2010, 23-8-2010, 22-9-2010, 18-10-2010.

Peix gat (*Ameiurus melas*) – No observat el 2010.

Silur (*Silurus glanis*) – No observat el 2010.

AMFIBIS

Salamandra (*Salamandra salamandra*) – 21-1-2010, 25-2-2010, 5-4-2010, 2-5-2010, 15-5-2010, 18-5-2010, 24-5-2010.

Tòtil (*Alytes obstetricans*) – 16-3-2010, 20-3-2010, 25-3-2010, 30-3-2010.

Gripauet (*Pelodytes punctatus*) – 5-4-2010, 30-5-2010.

Gripau comú (*Bufo bufo*) – 20-2-2010, 25-2-2010, 1-3-2010, 20-3-2010, 25-3-2010.

Gripau corredor (*Bufo calamita*) – 25-3-2010, 15-4-2010, 21-8-2010, 13-10-2010, 6-11-2010.

Reineta comuna (*Hyla meridionalis*) – 8-5-2010, 18-5-2010, 30-5-2010, 17-7-2010.

Granota verda (*Rana perezi*) – 25-3-2010, 17-4-2010, 20-4-2010, 23-4-2010, 8-5-2010, 17-5-2010, 18-5-2010, 20-5-2010, 27-5-2010, 30-5-2010, 22-6-2010, 24-6-2010, 25-6-2010, 28-6-2010, 2-7-2010, 4-7-2010, 23-7-2010, 6-8-2010, 23-8-2010, 6-9-2010, 1-10-2010, 18-10-2010, 6-11-2010.

RÈPTILS

Tortuga mediterrània (*Testudo hermanni*) – No observat el 2010.

Tortuga mora (*Testudo graeca*) - No observat el 2010.

Tortuga de rierol (*Mauremys leprosa*) – 2-4-2010, 20-4-2010, 18-5-2010, 20-5-2010, 24-5-2010, 22-6-2010, 17-7-2010.

Tortuga d'estany (*Emys orbicularis*) – No observat el 2010.

Tortuga d'aigua americana (Tortuga de temples roges) (*Trachemys scripta elegans*) – 25-2-2010, 1-3-2010, 25-3-2010, 30-3-2010, 2-4-2010, 20-4-2010, 8-5-2010, 17-5-2010, 18-5-2010, 20-5-2010, 27-5-2010, 2-6-2010, 22-6-2010, 24-6-2010, 25-6-2010, 28-6-2010, 2-7-2010, 17-7-2010, 23-7-2010, 6-8-2010, 8-8-2010, 16-8-2010, 26-8-2010, 22-9-2010, 18-10-2010.

Tortuga d'aigua americana (Tortuga d'orelles grogues) (*Trachemys scripta scripta*) – 8-5-2010, 20-5-2010, 22-6-2010, 24-6-2010, 28-6-2010, 2-7-2010.

Tortuga d'aigua americana (*Trachemys scripta troostii*) – 20-4-2010, 28-6-2010.

Tortuga d'aigua de Nicaragua (*Trachemys emolli*) – No observat el 2010.

Tortuga comuna de Florida (*Pseudemys floridiana*) – No observat el 2010.

Tortuga tova xinesa (*Pelodiscus sinensis*) – No observat el 2010.

Tortuga mapa ianqui (*Graptemys pseudogeographica*) - No observat el 2010.

Dragó comú (*Tarentola mauritanica*) – 20-1-2010, 7-3-2010, 14-3-2010, 16-3-2010, 8-5-2010, 15-5-2010, 17-5-2010, 20-5-2010, 24-5-2010, 30-5-2010, 2-6-2010, 22-6-2010, 25-6-2010, 28-6-2010, 2-7-2010, 17-7-2010, 26-7-2010, 6-8-2010, 8-8-2010, 16-8-2010, 6-9-2010, 22-9-2010, 1-10-2010, 18-10-2010, 3-11-2010.

Dragó rosat (*Hemidactylus turcicus*) – No observat el 2010.

Llargandaix ocel·lat (*Lacerta lepida*) – 29-5-2010, 2-7-2010, 21-8-2010.

Sargantana ibèrica (*Podarcis hispanica*) – No observat el 2010.
Sarganter gros (*Psamodromus algirus*) – 5-4-2010, 23-4-2010, 17-5-2010, 24-5-2010, 30-5-2010, 12-6-2010, 6-8-2010, 21-8-2010, 23-8-2010, 3-9-2010, 8-9-2010.
Vidriol (*Anguis fragilis*) – 25-6-2010.
Serp de ferradura (*Coluber hippocrepis*) – 25-6-2010.
Serp blanca (*Elaphe scalaris*) – 18-5-2010.
Serp llisa meridional (*Coronella girondica*) – No observat el 2010.
Serp verda (*Malpolon monspessulanus*) – 30-5-2010.
Serp d'aigua (*Natrix maura*) – 28-6-2010, 2-7-2010, 17-7-2010.
Colobra de collar (*Natrix natrix*) – No observat el 2010.
Escorçó ibèric (*Vipera latasti*) - No observat el 2010.

MAMÍFERS

Eriçó clar (*Atelerix algirus*) – No observat el 2010.
Musaranya comuna (*Crocidura russula*) – 20-3-2010, 24-5-2010, 25-6-2010, 8-8-2010.
Musaranya nana (*Suncus etruscus*) – No observat el 2010.
Ratpenat de ferradura gros (*Rhinolophus ferrumequinum*) –
Ratpenat de ferradura petit (*Rhinolophus hipposideros*) – 5-4-2010.
Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*) -
Ratpenat d'Escalera (*Myotis escaleraei*) – 24-6-2010, 25-6-2010.
Ratpenat de musell llarg (*Myotis myotis*) – No observat el 2010.
Ratpenat d'aigua (*Myotis daubentonii*) – No observat el 2010.
Ratpenat de peus grossos (*Myotis capaccinii*) – 20-1-2010, 14-3-2010, 19-12-2010.
Ratpenat noctul petit (*Nyctalus leisleri*) – No observat el 2010.
Ratpenat comú (*Pipistrellus pipistrellus*) – 20-1-2010, 20-3-2010, 19-12-2010.
Ratpenat soprano (*Pipistrellus pygmaeus*) – 14-3-2010, 20-3-2010, 25-3-2010, 30-3-2010, 17-7-2010, 26-8-2010.
Ratpenat de vores clares (*Pipistrellus kuhli*) – 20-1-2010, 20-3-2010, 25-3-2010.
Ratpenat muntanyenc (*Hypsugo savii*) – 20-3-2010, 25-3-2010.
Ratpenat dels graners (*Eptesicus serotinus*) – 30-5-2010, 21-8-2010.
Ratpenat orellut meridional (*Plecotus austriacus*) – 20-1-2010, 25-3-2010.
Ratpenat de cova (*Miniopterus schreibersii*) - No observat el 2010.
Ratpenat de bosc (*Barbastella barbastellus*) - 14-3-2010.
Ratpenat cuallarg (*Tadarida teniotis*) – No observat el 2010.
Llebre (*Lepus europaeus*) – No observat el 2010.
Llebre ibèrica (*Lepus granatensis*) - No observat el 2010.
Conill (*Oryctolagus cuniculus*) – 18-1-2010, 26-1-2010, 2-2-2010, 20-2-2010, 25-2-2010, 4-3-2010, 7-3-2010, 25-3-2010, 30-3-2010, 5-4-2010, 7-4-2010, 15-4-2010, 16-4-2010, 17-4-2010, 19-4-2010, 29-4-2010, 2-5-2010, 8-5-2010, 17-5-2010, 18-5-2010, 20-5-2010, 24-5-2010, 27-5-2010, 30-5-2010, 2-6-2010, 12-6-2010, 22-6-2010, 24-6-2010, 25-6-2010, 2-7-2010, 23-7-2010, 26-7-2010, 2-8-2010, 6-8-2010, 8-8-2010, 16-8-2010, 23-8-2010, 8-9-2010, 19-9-2010, 18-10-2010, 19-12-2010, 23-12-2010.
Esquirol (*Sciurus vulgaris*) – 15-1-2010, 18-1-2010, 20-1-2010, 26-1-2010, 20-2-2010, 4-3-2010, 7-3-2010, 14-3-2010, 25-3-2010, 30-3-2010, 2-4-2010, 5-4-2010, 16-4-2010, 17-4-2010, 20-4-2010, 29-4-2010, 2-5-2010, 15-5-2010, 20-5-2010, 27-5-2010, 30-5-2010, 2-6-2010, 22-6-2010, 25-6-2010, 2-7-2010, 17-7-2010, 23-7-2010, 2-8-2010, 6-8-2010, 23-8-2010, 26-8-2010, 6-9-2010, 8-9-2010, 22-9-2010, 18-10-2010, 6-11-2010, 25-11-2010, 9-12-2010, 10-12-2010, 19-12-2010, 23-12-2010, 24-12-2010.
Rata cellarda (*Eliomys quercinus*) – No observat el 2010.
Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*) – 25-3-2010, 20-4-2010, 20-5-2010, 24-5-2010, 2-6-2010, 8-8-2010, 9-12-2010.
Rata negra (*Rattus rattus*) – 20-2-2010, 6-8-2010, 23-8-2010, 1-10-2010.
Rata comuna (*Rattus norvegicus*) – No observat el 2010.
Ratolí domèstic (*Mus musculus*) – 8-8-2010.
Ratolí mediterrani (*Mus spretus*) – 5-4-2010, 8-8-2010.
Rata d'aigua (*Arvicola sapidus*) – No observat el 2010.
Talpó comú (*Microtus duodecimcostatus*) – 3-1-2010, 18-1-2010, 21-1-2010, 23-1-2010, 26-1-2010, 4-2-2010, 20-2-2010, 7-3-2010, 25-3-2010, 17-4-2010, 20-4-2010, 2-6-2010, 25-6-2010, 8-8-2010, 18-10-2010, 6-11-2010, 16-11-2010.

Senglar (*Sus scrofa*) – 3-1-2010, 18-1-2010, 20-1-2010, 21-1-2010, 26-1-2010, 29-1-2010, 4-2-2010, 20-2-2010, 4-3-2010, 7-3-2010, 14-3-2010, 25-3-2010, 30-3-2010, 5-4-2010, 7-4-2010, 15-4-2010, 16-4-2010, 17-4-2010, 20-4-2010, 29-4-2010, 2-5-2010, 15-5-2010, 20-5-2010, 27-5-2010, 30-5-2010, 2-6-2010, 12-6-2010, 6-8-2010, 3-9-2010, 8-9-2010, 22-9-2010, 1-10-2010, 16-10-2010, 18-10-2010, 3-11-2010, 25-11-2010, 26-11-2010, 9-12-2010, 10-12-2010, 23-12-2010, 24-12-2010.

Guineu (*Vulpes vulpes*) – 3-1-2010, 15-1-2010, 18-1-2010, 21-1-2010, 26-1-2010, 29-1-2010, 16-2-2010, 20-2-2010, 25-2-2010, 27-5-2010, 4-3-2010, 7-3-2010, 25-3-2010, 5-4-2010, 15-4-2010, 16-4-2010, 23-4-2010, 2-5-2010, 15-5-2010, 17-5-2010, 18-5-2010, 30-5-2010, 22-6-2010, 17-7-2010, 23-7-2010, 6-8-2010, 8-8-2010, 23-8-2010, 3-9-2010, 8-9-2010, 21-9-2010, 2-10-2010, 13-10-2010, 14-10-2010, 18-10-2010, 6-11-2010, 10-12-2010, 19-12-2010, 23-12-2010, 24-12-2010.

Mostela (*Mustela nivalis*) – 29-4-2010, 29-5-2010, 6-9-2010.

Fura (*Mustela putorius*) - No observat el 2010.

Visó americà (*Mustela vison*) – No observat el 2010.

Fagina (*Martes foina*) – 15-4-2010, 24-5-2010, 30-5-2010.

Llúdriga (*Lutra lutra*) - No observat el 2010.

Toixó (*Meles meles*) – 18-1-2010, 21-1-2010, 26-1-2010, 2-2-2010, 20-2-2010, 4-3-2010, 7-3-2010, 30-3-2010, 5-4-2010, 15-4-2010, 17-4-2010, 15-5-2010, 18-5-2010, 30-5-2010, 25-6-2010, 8-9-2010, 22-9-2010, 18-10-2010, 6-11-2010, 9-12-2010, 19-12-2010, 24-12-2010.

Gat mesquer (*Genetta genetta*) – 2-2-2010, 15-4-2010, 13-10-2010.