

PARC DEL FOIX

MEMÒRIA ORNITOLÒGICA DEL 2011

Recull de dades i textos a càrrec
de Xavier Bayer, Cisco Guasch i Humbert Salvadó.



Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*) (foto C.G.)

sumari

Sortides realitzades durant l'any
Nivell de les aigües a l'embassament
Meteorologia
Acció de l'home sobre el medi
Activitats diverses
El programa SOCC
Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix
El programa PERNIS i les migracions postnupcials
Censos d'ocells aquàtics
Resum de la campanya d'anellament 2011
Els ocells del Parc del Foix el 2011
Annex 1 - Observacions d'altres vertebrats

En l'elaboració de la memòria ornitològica del 2011 han participat en alguna sortida i/o han aportat dades les següents persones (directament o a través de l'ORNITHO.CAT):

Albert Burgas Riera (ABRA)
Albert Petit Saludes (APSA)
Daniel Imbernón Vigara (DIVA)
Ivan Afonso Jordana (IAJA)
Joan Guash González (JGGF)
Josep Guasch Marlès (JGMX)
Manel Bonilla López (MBLA)
Marc Anton Recasens (MARC)
Marc Noguera Piquer (MNPA)
Marc Peris Miras (MPMB)
Martí Cardona Melgarejo (MCMF)
Rafa Jiménez Rodríguez (RJRA)
Rosa M. Alonso Garcia (RAGB)
Tomàs Pulido Enrique (TPEA)
Vittorio Pedrochi Rius (VPRA)
Xavier Parra Cuenca (XPCA)
Xavier Parellada Viladoms (XPVA)
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torrefarrussa (CRFST)

A les quals agraïm la seva col·laboració.

Entre parèntesi indiquem el codi utilitzat en el text per a cada persona.

Les observacions d'anys anteriors que es citen, apareixen al text seguides entre parèntesi de les inicials de la persona que en el seu moment ens va facilitar les dades: Antonio Somalo Alique (ASA), Eduardo Fernandez Martín (EFM), Marc Olivé Vázquez (MOVA), Pere Mestre Raventós (PMRA), Pedro Torres Expósito (PTEA), Sergi Sales Asensio (SSAA)..

Les dades i observacions que no van seguides de cap codi d'inicials, cal atribuir-les a l'equip redactor de la memòria.

* Sortides realitzades durant l'any


Durant aquest any 2011 s'ha fet un total de 145 sortides al Parc del Foix que han suposat un total de 402 hores i 40 minuts. En aquestes 145 sortides s'han recollit un total de 4.748 registres.

A més de les sortides específiques per recollir informació de camp s'han realitzat diferents actuacions per tal de completar la màxima informació sobre les aus del Parc del Foix. Per vuitè any s'han realitzat sessions d'anellament; en total s'hi ha participat en 8 jornades. També s'han recollit dades que han estat cedides per diferents col·laboradors (agents rurals, ornitòlegs, aficionats...). En total, a més dels 4.748 registres d'ocells, se n'han recollit 245 dels col·laboradors i dels anellaments. Així doncs, el total ha estat de 4.993 registres.

1er. trimestre	23 sortides	68 h. 30 min.	gener	6 sortides
			febrer	8 sortides
			març	9 sortides
2on. trimestre	36 sortides	111 h. 50 min.	abril	16 sortides
			maig	10 sortides
			juny	10 sortides
3er. trimestre	47 sortides	123 h. 50 min.	juliol	10 sortides
			agost	11 sortides
			setembre	26 sortides
4rt. trimestre	39 sortides	98 h. 30 min.	octubre	18 sortides
			novembre	11 sortides
			desembre	10 sortides
TOTAL 2011	145 sortides	402 h. 40 min.		

* Nivell de les aigües a l'embassament

El nivell de les aigües del pantà s'ha mantingut molt alt durant tot l'any. Tan sols entre meitats d'agost i meitats d'octubre es va notar una lleugera baixada del nivell que va arribar com a màxim a uns 25 centímetres per sota de la cota màxima. Així doncs, no s'han produït les baixades habituals dels darrers anys, en què es formaven platges a la cua de l'embassament durant els mesos d'estiu.



* Meteorologia

Als primers mesos de l'any, l'hivern es va moure entre els paràmetres habituals de l'època, amb episodis una mica més càlids del que calia esperar. Hi van destacar uns dies afectats per una onada de fred siberià entre el 21 i el 25 de gener. En canvi el febrer va ser càlid. Va ser un hivern sec, amb poca pluja.

La primavera va caracteritzar-se per ser molt càlida, sobretot a l'abril i al maig. El març va ser un mes molt plujós, l'abril va ser força sec i el maig va ser més aviat irregular.

Pel que fa a les temperatures els mesos d'estiu van ser força normals, encara que el juliol va destacar per la persistència de valors més baixos als habituals. Tot i que hi va haver algunes pluges, en general va ser un estiu sec.

Els mesos de setembre i octubre van ser excepcionalment secs (en contra del que calia esperar) i una mica més calorosos del que és normal. No va ser fins a la segona meitat d'octubre quan va començar a ploure i les temperatures es van normalitzar una mica. Tanmateix, les darreries de la tardor també han estat altra vegada una mica més càlides que el que calia esperar.

* Acció de l'home sobre el medi

Des de la posta en marxa del Parc del Foix s'han produït moltes millores des d'una òptica de conservació i protecció de la natura. També s'ha treballat molt per tal d'informar i conscienciar al públic que visita l'espai natural.

Com en anys anteriors hem seguit anotant accions irregulars que caldria evitar: gossos abandonats, gent pescant en zones d'accés restringit, abocament de deixalles.

El 12-1-2011 observem restes de tala de llentiscles.

El 12-2-2011 veiem 2 motos per camins on no és permès circular-hi.

El 1-3-2011 hi ha una quadrilla de gent tallant llentiscles.

El 19-6-2011 a quarts de vuit del matí ens trobem una festa "rave" a uns camps prop de St Esteve.

El 17-7-2011 observem com fa poc han aplicat herbicida als canyars del riu prop de Penyafort.

El 25-7-2011 trobem un grup de gossos assalvatjats entre mas Pigot i Torrelletes.

El 17-8-2011 hi ha anunciat en un cartell que s'ha aplicat herbicida a les vores d'un camí del Parc.



El 15-12-2011 observem que s'han obert vies d'escalada a la zona protegida de les Roques Boveres.



* Activitats diverses

1- El dijous 17-3-2011 a les 18'30 de la tarda al castell de Castellet es va presentar el llibre ***Fauna vertebrada del Parc del Foix***. Els autors són Xavier Bayer, Cisco Guasch i Humbert Salvadó. Es tracta d'un estudi que es fonamenta en un intens recull d'observacions realitzades en aquest espai natural al llarg dels darrers anys. Hi ha textos i mapes de distribució al Parc del Foix per a cadascuna de les 327 espècies silvestres observades (peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers). El volum, de 302 pàgines, té un format gros i està il·lustrat amb més d'un centenar de fotografies a color. Ha estat editat per la fundació Abertis, per bé que també havia estat promogut per la fundació Catalunya i Territori. Compta amb la col·laboració del Parc del Foix i de la Universitat de Barcelona. El llibre es podia aconseguir demanant-lo a la fundació Abertis, però a desembre de 2011 ja s'ha esgotat.



2- El dissabte 26-3-2011 a les 11 del matí a l'oficina del Parc del Foix de Castellet es va presentar el llibre ***Flora i fauna de l'espai natural Parc del Foix***. Es tracta de la primera guia d'aquestes característiques que es publica a les nostres comarques. Va destinada a un públic molt ampli, especialment a tothom que surt a la muntanya i vol conèixer una mica millor els animals i plantes que hi viuen. La guia ofereix també moltes possibilitats per a ésser emprada amb finalitats pedagògiques per instituts, escoles de natura, universitaris, etc. El format és del tipus "llibre de motxilla", de mides reduïdes, que ens permeten de prendre'l al camp per tal d'usar-lo sobre el terreny. La guia ha estat editada per Brau edicions, amb el suport del Consorci del Parc del Foix, i es pot adquirir a les principals llibreries. La guia inclou 657 espècies animals i vegetals il·lustrades. Els textos són de Xavier Bayer i Cisco Guasch i els dibuixos de Toni Llobet. Per a cadascuna de les espècies hi ha tot un seguit d'icones informatives sobre els hàbitats on viu, la freqüència o abundància amb què es pot veure i les dates en què es pot observar. A més hi ha un text breu que ajuda a reconèixer l'espècie.



3- El dissabte 16-4-2011 a les 11 del matí al castell de Penyafort es va fer una sortida pràctica amb el llibre ***Flora i fauna de l'espai natural Parc del Foix***. La presentació en aquesta ocasió va consistir en una sortida als entorns de la fortalesa; el riu Foix, els conreus i el bosc. Es va aprofitar per fer una demostració pràctica de la guia.

4- Per Televisió de Catalunya, a través del CANAL 33, s'han seguit projectant alguns dels reportatges de natura i fauna realitzats en anys anteriors amb la participació dels components de l'associació Còbit, i que tenen relació amb el Parc del Foix.

* El programa SOCC

Aquest és el desè any que participem en el programa SOCC, amb un transsecte que transcorre per l'interior del Parc del Foix. D'entre les categories establertes des de l'ICO es participa en la de "mostreig en ambients mediterranis". El recorregut té el seu inici a cal Bladet i passa per cal Semison. Transcorre per diferents ambients naturals entre els quals hi ha la pineda, la brolla i els conreus. L'itinerari es realitza per partida doble, hi participen dos ornitòlegs. Les dates en què s'ha realitzat el SOCC són:

- 1er cens SOCC època hivernal – 12-1-2011 i 20-1-2011
- 1er cens SOCC època de nidificació – 15-4-2011 - 28-4-2011
- 2n cens SOCC època de nidificació – 17-5-2011 - 24-5-2011
- 2n cens SOCC època hivernal – 7-12-2011 - 12-12-2011

Les característiques i la metodologia d'aquest programa es poden consultar a les memòries ornitològiques dels anys anteriors i també al web de l'Institut Català d'Ornitologia.

* Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix

S'ha realitzat per catorzè any la campanya "Les migracions d'ocells al Parc del Foix - 2011". A més s'han organitzat altres activitats a l'entorn de les migracions d'ocells al Parc del Foix i a l'entorn de la natura. Es va programar un alliberament de rapinyaires al castell de Penyafort i 3 sessions d'observació de les migracions des del turó de les Tres Partions.

El programa d'activitats ha estat el següent:

- 13-8-2011 – **Alliberament de rapinyaires** del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, a les 18'30 al castell de Penyafort.
- 10 de setembre 2011 – **Observació migracions** - entre 10 i 14 h. Turó de les Tres Partions.
- 17 de setembre 2011 – **Observació migracions** - entre 9 i 14 h. Turó de les Tres Partions.
- 1 d'octubre 2011 – **Observació migracions** - entre 10 i 14 h. Turó de les Tres Partions.

A més, a última hora es va programar la següent activitat.

- 1 d'octubre 2011 – **Alliberament de xots** del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, a les 17,30 h. al riu Foix i a la zona de muntanya de mas de l'Artís – Pla de les Palmeres.

Cal destacar, per l'interès que desperta i per la nombrosa participació de públic, l'activitat de l'alliberament d'ocells rapinyaires. La jornada del 13-8-2011, com en anys anteriors, va ser un èxit, l'assistència va ser molt nombrosa, des de mainada fins a gent gran.

A la tarda es va alliberar un xoriguer (*Falco tinnunculus*) als entorns del castell de Penyafort, a la zona de vinyes i camps de conreu. Més tard es va alliberar un gamarús (*Strix aluco*) en una fondalada frondosa per la zona de la font de Sant Llorenç. Tots els animals eren procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

Mercès a un oferiment del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, el dia 1-10-2011 s'alliberen 9 exemplars de xot (*Otus scops*). Els alliberaments es realitzen en caixes niu que prèviament s'havien col·locat al riu Foix i a la zona de muntanya de mas de l'Artís – Pla de les Palmeres. La participació en aquesta activitat va comptar amb diversos voluntaris que s'havien ofert i que havien participat en la jornada d'alliberaments anterior.

Per a les sessions de camp de 10-9-2011, 17-9-2011 i 1-10-2011 es va comptar amb l'assistència dels membres de l'associació "Còbit" i també d'algun altre especialista en ornitologia. També es va disposar de material òptic i bibliogràfic per tal de poder atendre les consultes dels assistents aficionats a la natura. El públic que va participar en aquestes 3 sessions d'observació del pas migratori d'aus rapinyaires va ser de 31 persones entre totes sessions. Val a dir que hi ha gent que hi passa tot el matí i d'altres que s'hi estan una estona més o menys llarga.

La sessió del 17-9-2011 va comptar amb la participació del responsable del programa PERNIS. Un programa que ja porta uns quants anys de funcionament i que ha estat creat i coordinat per

l'ICO (Institut Català d'Ornitologia). Des del mateix ICO es va fer publicitat i es va promoure la participació a la jornada d'observació de les migracions. La jornada va ser un èxit, hi van participar un total de 14 persones i es van poder realitzar observacions d'ocells migratoris força interessants; aligot vesper (*Pernis apivorus*), àliga marcenca (*Circaetus gallicus*), àliga pescadora (*Pandion haliaetus*), etc.

La inclusió del Turó de les Tres Partions i el Puig de l'Àliga en el portal ORNITHO.CAT que gestiona l'ICO, ha estat molt positiva. Mercès a les citacions penjades al portal web pels components de Còbit, s'ha produït un efecte d'atracció d'altres ornitòlegs a visitar aquestes muntanyes del Parc del Foix. La difusió de les activitats a través de l'agenda de la pàgina web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona també ha estat valuosa, i ha permès que gent de comarques més apartades participés en les activitats.

* El programa PERNIS i les migracions postnupcials

Per novè any consecutiu s'ha dut a terme aquest programa al nostre país. Es tracta d'un programa de seguiment de les migracions d'aus rapinyaires a la tardor. Des del Parc del Foix també s'hi ha participat. El programa pretén crear una xarxa de seguiment de la migració de rapinyaires a Catalunya. Es coordina des de l'ICO. L'objectiu és conèixer les característiques del pas postnupcial, determinar les rutes migratòries i les tendències poblacionals al llarg dels anys. Enguany la metodologia ha variat i ha esdevingut més flexible, de manera que totes les observacions del pas migratori realitzades des del Puig de l'Àliga o des del Turó de les Tres Partions han estat vàlides per al Pernis. Els censos s'han comptabilitzat d'hora en hora.


En els quadres següents hi ha un resum de les observacions realitzades en el programa Pernis i també s'hi resumeixen les recollides en altres dates. En total han estat 1333 els ocells rapinyaires i planadors migrants que s'han vist en el pas postnupcial del 2011.



Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*) (foto C.G.)



Grues en migració (*Grus grus*) (foto X.B.)



Lloc - PERNIS 2011	data	hores	espècies	exemplars
Turó de les Tres Partions	3/8	1:30	0	0
Turó de les Tres Partions	10/8	2:00	1	1
Turó de les Tres Partions	12/8	1:00	1	1
Turó de les Tres Partions	15/8	4:00	3	9
Turó de les Tres Partions	19/8	1:00	0	0
Turó de les Tres Partions	21/8	2:00	0	0
Turó de les Tres Partions	24/8	1:00	0	0
Turó de les Tres Partions	27/8	2:00	2	2
Turó de les Tres Partions	31/8	1:00	1	3
Turó de les Tres Partions	1/9	1:00	0	0
Turó de les Tres Partions	4/9	3:00	5	10
Turó de les Tres Partions	6/9	2:00	5	19
Turó de les Tres Partions	8/9	2:00	6	17
Turó de les Tres Partions	9/9	4:00	5	13
Turó de les Tres Partions	10/9	5:00	5	19
Turó de les Tres Partions	11/9	4:00	4	12
Turó de les Tres Partions	12/9	3:00	6	93
Turó de les Tres Partions	13/9	1:00	3	7
Turó de les Tres Partions	14/9	2:00	7	39
Turó de les Tres Partions	15/9	3:00	7	52
Turó de les Tres Partions	17/9	8:00	7	147
Turó de les Tres Partions	19/9	4:15	8	27

Turó de les Tres Partions	20/9	4:00	4	61
Turó de les Tres Partions	21/9	2:00	5	18
Turó de les Tres Partions	22/9	5:40	6	56
Turó de les Tres Partions	23/9	3:00	6	51
Turó de les Tres Partions	25/9	4:00	9	93
Turó de les Tres Partions	26/9	3:00	6	54
Turó de les Tres Partions	27/9	3:00	7	63
Turó de les Tres Partions	28/9	3:00	5	57
Turó de les Tres Partions	29/9	2:10	2	2
Turó de les Tres Partions	30/9	2:30	4	11
Turó de les Tres Partions	1/10	3:00	3	10
Turó de les Tres Partions	2/10	3:00	5	27
Turó de les Tres Partions	3/10	2:00	8	70
Turó de les Tres Partions	4/10	3:00	7	68
Turó de les Tres Partions	5/10	2:00	6	20
Turó de les Tres Partions	6/10	2:00	4	9
Turó de les Tres Partions	8/10	2:00	5	9
Turó de les Tres Partions	9/10	5:45	5	24
Turó de les Tres Partions	10/10	2:00	2	8
Turó de les Tres Partions	12/10	2:00	1	3
Turó de les Tres Partions	13/10	2:00	1	1
Turó de les Tres Partions	16/10	2:00	1	7
Turó de les Tres Partions	20/10	1:00	1	1
Turó de les Tres Partions	22/10	3:00	2	7
Turó de les Tres Partions	26/10	2:00	3	6
Turó de les Tres Partions	30/10	3:00	1	2
Turó de les Tres Partions	5/11	1:00	0	0
Turó de les Tres Partions	7/11	4:00	6	125
TOTALS	50 dies	134:30	18 (espècies)	1333

* Censos d'ocells aquàtics

** - Introducció -

Els resultats obtinguts durant el seguiment de les aus aquàtiques iniciats durant el període de tardor de 2007 i continuats durant els tres anys següents van ser molt satisfactoris i reveladors de la dinàmica dels ocells al Pantà. La metodologia seguida ens ofereix poder treballar les dades objectivament. Durant l'any 2011 ens hem proposat continuar el treball iniciat per tal de donar més robustesa als resultats ja obtinguts fins ara. Els resultats així obtinguts, de manera comparativa ens donen una nova eina per la gestió del Parc i ens mostren el potencial de l'embassament com a punt de nidificació, hivernada i migració dels ocells aquàtics.

** - Metodologia proposada -

S'ha aplicat la metodologia establerta l'any 2007. Durant cada quinzena s'ha realitzat una sortida per recollir dades. S'estableix un període entre l'1 i el 15 de cada mes per realitzar un mostreig, i un altre entre el dia 16 i el darrer dia del mes.

A cada sessió es fa la visita de vuit estacions diferents situades a les vores de punts des d'on es controla gairebé la totalitat de l'embassament. S'estableixen les vuit estacions següents:

- Aguait d'ocells
- Zona de bogues a la paret (camp d'oliveres)
- Canyissar de la cua
- Caseta d'en Segura
- La Marina
- La presa

- Fondo de l'Alzina
- Gual del Foix i Marmellar

La visita a aquestes estacions es fa sempre al matí a primera hora. Cal evitar de fer-la en dies festius o quan hi hagi massa afluència de públic als entorns de l'embassament. L'horari d'inici ha de quedar comprès entre la sortida del sol i una hora més tard. La visita a cadascuna de les estacions es fa sempre seguint el mateix ordre. A cada estació s'hi realitza un recull de dades durant 12 minuts. En aquest temps es van anotant la quantitat d'ocells de cadascuna de les espècies aquàtiques que s'observen i també la quantitat de les que hem considerat espècies a mostrejar pel fet que tenen força lligam amb el medi aquàtic. De la resta d'espècies tan sols s'anota la seva presència. La presa de dades es fa tant dels ocells que estan a la zona que s'observa, com dels que hi passen volant. En la fitxa de recollida de dades, també cal prendre nota de diversos aspectes referents a la climatologia, a l'observació visual de residus i contaminants, i el nivell de l'embassament. També s'han d'anotar tots aquells aspectes relacionats amb el comportament de les aus que puguin ser d'interès.

A la fitxa s'hi ha inclòs un seguit d'espècies indicadores entre les quals hi ha les aus aquàtiques més habituals a l'embassament i també altres ocells lligats als ambients naturals més aigualosos. S'han deixat espais en blanc on s'hi anoten altres aus aquàtiques menys habituals. A més, en un apartat final es pren nota de la diversitat d'altres espècies d'ocells observades o escoltades en el conjunt de la visita. I encara hi ha un darrer apartat on cal anotar els altres animals vertebrats (peixos, amfibis, rèptils i mamífers) que s'observen directament, s'escolten o es detecten a partir de rastres diversos.

Per tal de poder extreure i contrastar resultats entre les diferents quinzenes s'ha vetllat perquè durant la sessió hi hagi unes bones condicions que permetin el recull de les dades. Si en alguna de les estacions hi ha un factor que alteri o pugui alterar els resultats se'n pren nota. Tanmateix els dies en què les condicions ambientals han estat desfavorables (pluja o boira) hem ajornat la visita.

** - Resultats -

Durant el període de gener a desembre de 2011 s'han realitzat 24 mostreigs per recollir dades per al seguiment dels ocells aquàtics de l'embassament del Foix. Concretament s'han fet dos censos per cada mes (un mostreig cada quinzena).

De les aus indicadores previstes en la fitxa patró s'han recollit observacions del total de les 25 espècies considerades, tot i que no sempre ha estat igual, (l'any 2010 només se'n van observar 23). En concret aquest 2011 s'han observat les següents: *Anas platyrhynchos*, *Tachybaptus ruficollis*, *Phalacrocorax carbo*, *Egretta garzetta*, *Ardea cinerea*, *Circus aeruginosus*, *Pandion haliaetus*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Charadrius dubius*, *Tringa ochropus*, *Actitis hypoleucos*, *Larus ridibundus*, *Alcedo atthis*, *Motacilla cinerea*, *Motacilla alba*, *Luscinia svecica*, *Cettia cetti*, *Cisticola juncidis*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Phylloscopus collybita*, *Remiz pendulinus* i *Emberiza schoeniclus*.

A més, durant alguns dels mostreigs també s'han observat 11 espècies d'ocells aquàtics de presència poc habitual o més escassa a l'embassament. Aquest és el cas de *Anas clypeata*, *Anas crecca*, i *Porphyrio porphyrio*, que també s'observaren el 2008, 2009, y el 2010. *Anas crecca* es podria considerar com a hivernant habitual. *Porphyrio porphyrio*, a més d'haver nidificat el 2010, s'observa en poca quantitat, però de manera persistent. A més, s'observen migradors escassos a l'embassament com *Ardeola ralloides* i *Motacilla flava*, o migradors sedimentats com *Ciconia nigra*, *Himantopus himantopus* i *Larus audouinii*. També s'observa en una ocasió *Bubulcus ibis*; una espècie que havia estat habitual com a hivernant i abundant des dels 90 fins el 2008, i que ara ha esdevingut escassa. Volem fer esment de l'observació volant en migració de *Grus grus*. Dues espècies estivals (inicialment no contemplades com espècies indicadores, ja que eren força escasses) durant el 2011 han estat habituals són: *Nycticorax nycticorax* i *Ixobrychus minutus*. La primera s'ha observat en totes les estacions y la segona és un nidificant ben assentat que ha incrementat la seva presència. Ambdues les hauríem de considerar a la llista d'espècies indicadores habituals si continuen essent tan freqüents.

La taules següents mostren els resultats de les 24 visites que s'han realitzat seguint la metodologia establerta. La primera taula ens mostra les espècies indicadores i ocasionals d'ambients aquàtics de cada estació. La segona taula mostra els càlculs de manera conjunta per a cada estació de l'abundància i la riquesa d'espècies en nombre d'espècies i l'índex de diversitat de Shannon.

2011	Estació 1	Estació 2	Estació 3	Estació 4	Estació 5	Estació 6	Estació 7	Estació 8	Total Pantà
	Aguait	Paret	Canyissar	Caseta	Marina	Presa	F. Alzina	Gual	
	valors mitjans del nº d'individus								
<i>Anas platyrhynchos</i>	9,63	5,33	0,67	1,92	11,13	7,25	0,83	0,33	37,08
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	0,29	0,17	0,00	0,50	0,46	0,46	0,46	0,00	2,33
<i>Phalacrocorax carbo</i>	1,42	9,58	0,17	10,67	19,38	1,67	0,42	0,04	43,33
<i>Egretta garzetta</i>	0,38	0,25	0,08	0,38	0,04	0,25	0,00	0,71	2,08
<i>Ardea cinerea</i>	2,04	4,83	0,42	5,88	4,42	2,58	0,50	0,79	21,46
<i>Circus aeruginosus</i>	0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
<i>Pandion haliaetus</i>	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Rallus aquaticus</i>	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<i>Gallinula chloropus</i>	3,25	1,54	0,79	1,17	2,17	0,63	1,00	0,54	11,08
<i>Fulica atra</i>	0,58	0,08	0,00	0,29	2,17	0,79	0,00	0,13	4,04
<i>Charadrius dubius</i>	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Tringa ochropus</i>	0,17	0,25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58
<i>Actitis hypoleucos</i>	0,13	0,25	0,08	0,04	0,00	0,67	0,00	0,17	1,33
<i>Larus ridibundus</i>	0,25	1,08	0,04	1,75	2,33	3,96	0,08	0,00	9,50
<i>Alcedo atthis</i>	0,92	0,50	0,21	0,38	0,46	0,50	0,33	0,13	3,42
<i>Motacilla cinerea</i>	0,13	0,08	0,08	0,00	0,04	0,38	0,04	0,67	1,42
<i>Motacilla alba</i>	1,04	1,38	0,29	1,21	1,25	2,04	0,33	0,38	7,92
<i>Luscinia svecica</i>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Cettia cetti</i>	4,96	3,25	3,71	3,04	3,88	1,25	2,04	3,96	26,08
<i>Cisticola juncidis</i>	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,13
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	0,58	0,38	0,63	0,04	0,04	0,00	0,21	0,42	2,29
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	0,29	0,21	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
<i>Phylloscopus collybita</i>	0,38	0,42	0,50	0,38	0,75	1,04	1,00	0,79	5,25
<i>Remiz pendulinus</i>	1,08	0,00	0,63	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,75
<i>Emberiza schoeniclus</i>	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
espècies ocasionals									
<i>Anas clypeata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
<i>Anas crecca</i>	0,33	0,00	0,00	0,00	0,42	0,04	0,00	0,00	0,79
<i>Anas platyrhynchos var. domestica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
<i>Ardeola ralloides</i>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08
<i>Bubulcus ibis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
<i>Ciconia nigra</i>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Grus grus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
<i>Himantopus himantopus</i>	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
<i>Ixobrychus minutus</i>	0,54	0,29	0,00	0,04	0,50	0,21	0,63	0,08	2,29
<i>Larus audouinii</i>	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Motacilla flava</i>	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
<i>Nycticorax nycticorax</i>	0,50	0,08	0,13	0,04	0,04	0,08	0,04	1,13	2,04

Espècies d'ocells aquàtics observades durant els 24 censos

Aquests resultats ens mostren que les estacions de la cua de l'embassament tenen un alt interès, ja que la majoria d'espècies d'ocells aquàtics s'han observat en aquesta zona i a més hi ha espècies que tan sols s'observen en aquesta zona, com per exemple *Rallus aquaticus*, *Charadrius dubius*, *Himantopus himantopus*, *Anas crecca*, *Remiz pendulinus*, i *Acrocephalus arundinaceus*.

Per altra banda, cal fer esment un any més de l'espècie que apareix amb major quantitat; es tracta de l'hivernant *Phalacrocorax carbo*. Mentre que com el 2008, el 2009 i el 2010 entre les espècies que s'observen en un major nombre d'estacions i de manera més uniforme hi ha *Gallinula chloropus*, *Alcedo atthis*, *Motacilla alba* i *Cettia cetti*, que són les primeres espècies que colonitzen els ambients aquàtics a les comarques que hi ha als entorns de l'embassament del Foix. També s'observen a totes les estacions però amb menys regularitat *Anas platyrhynchos*, *Phalacrocorax carbo* i *Ardea cinerea*. Tant *Tachybaptus ruficollis*, *Egretta garzetta*, com *Fulica atra* s'havien observat a totes les estacions en anys anteriors, però no sempre. Aquestes aus no s'observen o són molt escasses en estacions molt pròximes al visitant (estació 3, estació 7 i estació 8). Així les estacions 3, 7 i 8, on la distància de l'observador és molt propera als ocells, el nombre d'individus observats (com el 2010) és significativament menor (menys de 12 individus promig per visita). Però aquestes estacions

són fonamentals per observar espècies que precisen de poca distància per observar-les bé com *Remiz pendulinus* o *Acrocephalus scirpaceus*.



2011	Estació 1	Estació 2	Estació 3	Estació 4	Estació 5	Estació 6	Estació 7	Estació 8	Total
	Aguait	Paret	Canyissar	Caseta	Marina	Presa	F. Alzina	Gual	Pantà
Nº d'individus promig	30,5	30,4	8,8	27,8	49,8	23,8	8,0	11,3	191,0
Nº ind màxim	59,0	78,0	16,0	130,0	324,0	73,0	17,0	27,0	564,0
Nº ind mínim	17,0	8,0	3,0	11,0	11,0	8,0	4,0	4,0	104,0
Nº d'espècies total	29,0	24,0	18,0	17,0	20,0	18,0	15,0	18,0	37,0
Nº d'espècies promig	9,6	7,1	4,3	6,3	7,8	7,0	4,8	4,1	14,9
Nº d'espècies màxim	13	11	8	11	11	11	7	7	19
Nº d'espècies mínim	6	4	2	3	3	2	2	2	11
Index diversitat Shannon H									
Valor promig	2,8	2,3	1,8	2,0	2,3	2,2	2,1	1,6	3,0
Desviació standard	0,46	0,50	0,48	0,57	0,49	0,55	0,41	0,56	0,32
Valor màxim	3,3	3,1	2,9	2,9	2,9	3,1	2,8	2,7	3,4
Valor mínim	1,5	1,3	0,9	0,9	1,0	0,8	0,9	0,7	2,2

Estacions de mostreig període gener-desembre 2011



Els resultats són molt semblants als del període desembre 2007- desembre 2010. El nombre total de 37 espècies aquàtiques creiem que és rellevant, ja que l'embassament del Foix és l'única zona humida important de les comarques del Penedès. Concretament a la primera estació, situada a l'aguait, és on s'hi ha observat més espècies (en concret 29, però foren 26 el 2010, i també 29 el 2009). Els resultats mostren que aquesta estació està ben localitzada, essent el punt de major interès per a les espècies aquàtiques, ja que és la única estació on s'hi han observat totes les espècies indicadores proposades (per exemple el 2009, encara que aquest any no s'hi ha observat *Charadrius dubius* i *Pandion haliaetus*).

En relació al promig del total d'individus per cens, el resultat és de 191, notablement inferior al 2009 (393 individus promig) o el 2008 (334 individus promig), però semblant al 2010, que fou de 227. Com en el període anterior cal considerar un cert biaix a causa de l'elevat nombre de *Phalacrocorax carbo* que hivernen a l'embassament; aquest fou notablement superior a l'hivern 2008-2009.



Les figures següents ens mostren les dinàmiques al llarg del període d'estudi 2011 i comparativament els promitjos del 2008-2011. Hi podem veure com l'evolució és afectada per un fort component estacional. Per tant, el paper de l'embassament assoleix una major rellevància a les èpoques de pas i en especial durant l'hivern. Així doncs, a l'època de reproducció de les aus és quan s'assoleixen els valors més baixos d'individus. El nombre d'espècies és força regular durant tot l'any. Tant de manera singular el 2011, com comparativa amb els promitjos de 2008-2011, la segona quinzena de juny és quan s'observen menys espècies, mentre que a la tardor i hivern hi ha un major nombre d'espècies. S'obté un màxim ample durant el període postnupcial que va d'octubre a febrer. Durant aquest any també s'ha inclòs *Anas platyrhynchos* var. *domestica*, que en ésser una subespècie no la considerem òbviament com una espècie més. L'anàlisi de l'índex de diversitat ens mostra uns màxims a les èpoques de pas prenupcial i postnupcial quan s'estudien els promitjos 2008-2011. Però el 2011, aquest índex es manté molt elevat durant tot l'any; al voltant de 3. Valor que hem de considerar elevat, i, que ens permet considerar una major qualitat i estabilitat durant el 2011 respecte anys anteriors.



Evolució de l'abundància de les aus aquàtiques. Període 2011 i promig 2008-2011



Evolució del nombre d'espècies d'aus aquàtiques. Període 2011 i promig 2008-2011



Evolució de l'índex de diversitat de les aus aquàtiques. Període 2011 i promig 2008-2011

Una altra de les informacions que s'ha recollit en les 24 visites és la presència d'altres vertebrats a les vuit estacions de mostreig o en els recorreguts que es fan per anar d'un lloc a altre. Aquestes dades també ens evidencien la forta presència d'animals que tot i no haver estat considerats indicadors en el present estudi, sí que tenen una vinculació (més o menys directa) amb l'espai estudiat i per tant amb la qualitat de les aigües. S'han observat 79 espècies d'ocells: *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Aegithalus caudatus*, *Alauda arvensis*,

Alectoris rufa, Anthus pratensis, Anthus trivialis, Apus apus, Apus melba, Athene noctua, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Certhia brachydactyla, Coccothraustes coccothraustes, Columba livia, Columba oenas, Columba palumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Delichon urbicum, Dendrocopos major, Emberiza calandra, Emberiza cia, Emberiza cirlus, Erithacus rubecula, Estrilda astrild, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Galerida cristata, Garrulus glandarius, Hippolais polyglotta, Hirundo rustica, Lanius senator, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Merops apiaster, Monticola solitarius, Muscicapa striata, Oenanthe hispanica, Oriolus oriolus, Parus ater, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus major, Passer domesticus, Passer montanus, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus trochilus, Pica pica, Picus viridis, Prunella modularis, Ptyonoprogne rupestris, Regulus ignicapilla, Regulus regulus, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Saxicola torquatus, Serinus serinus, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Sturnus unicolor, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia melanocephala, Troglodytes troglodytes, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Upupa epops

I també els peixos: *Alburnus alburnus, Cyprinus carpio, Gambusia holbrooki*, amfibis: *Bufo bufo, Pelophylax perezi*. Els rèptils: *Malpolon monspessulanus, Mauremys leprosa, Natrix maura, Tarentola mauritanica, Timon lepidus, Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta*. Els mamífers: *Lepus granatensis, Meles meles, Microtus duodecimcostatus, Oryctolagus cuniculus, Pipistrellus pygmaeus, Sciurus vulgaris, Sus scrofa, Vulpes vulpes*. Així doncs, tal i com s'observa en el llistat precedent hi ha una bona diversitat de vertebrats que viuen lligats al sistema natural format per l'embassament del Foix.



La Marina és una de les 8 estacions de cens (foto X.B.)

* Resum de la campanya d'anellament 2011 - amb dades de Manel Bonilla (ICO)

Enguany s'han fet 8 jornades d'anellament al Parc del Foix, és el vuitè any que es realitza aquesta campanya. S'han fet un total 220 captures; 208 primeres captures, 11 controls (recaptures d'ocells anellats al pantà) i 1 recuperació. En total han estat 24 les espècies capturades i alliberades. Vegem a la següent taula les dades recollides.

ESPÈCIE	02/04	18/04	19/04	07/08	16/08	04/09	30/12	31/12	TOTAL
<i>Aegithalos caudatus</i>			2						2
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			1	3	5	1			10
<i>Alcedo atthis</i>						1			1
<i>Carduelis carduelis</i>		2							2
<i>Cettia cetti</i>	1	3	3		1		2		10
<i>Certhia brachydactyla</i>		1							1
<i>Emberiza cirius</i>							21	6	27
<i>Erithacus rubecula</i>		5					6		11
<i>Falco tinnunculus</i>							1	1	2
<i>Garrulus glandarius</i>							1		1
<i>Hirundo rustica</i>		1		70	12				83
<i>Luscinia megarhynchos</i>		4	2						6
<i>Passer domesticus</i>		1							1
<i>Phylloscopus collybita</i>							1		1
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		2							2
<i>Prunella modularis</i>							1	1	2
<i>Saxicola torquatus</i>							2		2
<i>Serinus serinus</i>	1	1				1			3
<i>Sylvia atricapilla</i>	2	3		1			5		11
<i>Sylvia borin</i>		7							7
<i>Sylvia melanocephala</i>							10		10
<i>Turdus merula</i>	4	3							7
<i>Troglodytes troglodytes</i>	1								1
<i>Turdus philomelos</i>	1	2					2		5
TOTAL	10	35	8	74	18	3	52	8	208
RECUPERACIONS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CONTROLS	3	6	0	0	0	0	1	1	11
CAPTURES TOTALS	13	41	8	74	18	3	53	10	220

Destaquem la recuperació del 31-12-2011, d'un pardal de bardissa (*Prunella modularis*) amb anella de Letònia. Es tracta d'un exemplar adult. Encara no es disposa de les dades concretes del seu anellament.

També tenim notícia d'una oreneta vulgar que va ser anellada el 19-9-2010 (MOVA) al pantà de Foix i que al 6-8-2011 ha estat recapturada a Bone, Sanchen Anhalt (Alemanya). Segons les dades de la fitxa d'anellament, aquesta oreneta havia nascut el 2010, és una femella i la distància entre els dos punts on ha estat capturada és de 1430 km.

* Els ocells del Parc del Foix el 2011

Aquest any s'han observat 167 espècies d'ocells diferents. El total acumulat d'espècies d'ocells que tenim recollides al llarg dels darrers 50-60 anys al Parc del Foix ha quedat en 249.

Destaquem l'observació d'una nova espècie per al Parc del Foix. La **gralla de bec vermell** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) és una espècie fonamentalment sedentària, és a dir que no realitza migracions. A Catalunya es distribueix sobretot per la zona dels Pirineus i Prepirineus, a més de disposar de poblacions menors als ports de Beseit, Baix Camp i en algun punt de la plana de Lleida. En aquestes contrades es reproduïx a les grans cingleres, a l'entrada de coves o bé en alguns edificis abandonats. De forma ocasional pot realitzar moviments per fugir de canvis sobtats del temps. Possiblement els exemplars van realitzar una fugida de la seva zona de cria a causa de les nevades que hi havia hagut a l'alta muntanya aquells dies.

A més aquest 2011 ha aportat importants registres en espècies escasses o en relació a conductes interessants. El **martinet menut** (*Ixobrychus minutus*) s'ha reproduït amb major densitat que els anys anteriors; s'ha fet el seguiment d'un niu que ha acabat amb èxit reproductor. Es va localitzar un **bernat**

pescaire (*Ardea cinerea*) amb una anella de lectura a distància, aquest exemplar d'un any d'edat, procedent del Segrià ha restat al Parc i s'hi ha anat observant amb regularitat. Aquest 2011 s'ha produït una segona observació de **voltor negre** (*Aegypius monachus*) a la conca del Foix. En aquesta ocasió es tractava d'un animal salvatge procedent de fora de Catalunya. L'**àliga cuabarrada** (*Hieraetus fasciatus*) ha tornat a fracassar en la seva reproducció. És el segon any consecutiu que no pot criar al niu on ho havia fet els darrers anys, tanmateix, s'ha observat amb força regularitat i amb comportaments interessants. Hi ha hagut diverses observacions d'estols en migració de la **grua** (*Grus grus*), una espècie que s'observa amb força excepcionalitat. La **gavina corsa** (*Larus audouinii*) s'ha fet present al pantà en diverses ocasions, feia anys que no es citava. El major dels rapinyaires nocturs, el **duc** (*Bubo bubo*) també ha estat notícia, en el vessant positiu hi hem de destacar la troballa d'un tercer territori de cria al Parc. L'any passat es va confirmar la nidificació del **blauet** (*Alcedo atthis*) gràcies a la troballa d'un niu en plena activitat, aquest any 2011 han continuat nidificant en el mateix niu. El **picot garser petit** (*Dendrocopos minor*) s'ha observat com s'extén i la població incrementa. Aquesta espècie arribada fa pocs anys al Foix, hi ha trobat un ambient favorable i discretament va augmentant la seva població i la seva distribució. Feia anys que no es detectava la reproducció del **còbit ros** (*Oenanthe hispanica*), una espècie en marcada regressió, aquest any s'ha seguit diverses setmanes a una parella en un territori nou. També ha estat molt rellevant l'observació d'una **boscarla dels joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*), és un ocell que s'ha citat en comptades ocasions al Parc del Foix i al Penedès en general. Finalment hem de felicitar-nos per haver recuperat un petit nucli reproductor de la **gralla** (*Corvus monedula*). Feia anys que s'havien perdut les darreres parelles i l'espècie semblava haver-se extingit de la zona. Aquest 2011 s'han trobat de nou exemplars (pocs) amb comportament reproductor en una zona on ja havien criat anys enrere.



Gralla de bec vermell (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) (foto X.B.)



Gavina corsa (*Larus audouinii*) (foto C.G.)

	NOMBRE D'OBSERVACIONS I PERCENTATGES DURANT EL 2011					
PERÍODE	ANY 2011		Percentatge d'observacions			
			respecte sortides efectuades en cada període			
	Total observacions	any 2011	gener-març	abril-juny	juliol-setembre	octu.-desembre
Xarxet - Anas crecca	14	9,6%	26,1%	0,0%	0,0%	20,5%
Ànec collverd - Anas platyrhynchos	75	51,4%	69,6%	80,6%	31,3%	38,5%
Ànec culerrot - Anas clypeata	2	1,4%	4,3%	0,0%	0,0%	2,6%
Perdiu roja - Alectoris rufa	14	9,6%	17,4%	8,3%	8,3%	7,7%
Faisà - Phasianus colchicus	2	1,4%	8,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Cabusset - Tachybaptus ruficollis	41	28,1%	34,8%	47,2%	14,6%	23,1%
Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus	1	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo	51	34,9%	60,9%	38,9%	8,3%	48,7%
Martinet menut - Ixobrychus minutus	28	19,2%	0,0%	52,8%	16,7%	2,6%
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax	32	21,9%	13,0%	50,0%	22,9%	0,0%
Martinet ros - Ardeola ralloides	2	1,4%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%
Esplugabous - Bubulcus ibis	1	0,7%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Martinet blanc - Egretta garzetta	29	19,9%	26,1%	50,0%	10,4%	0,0%
Bernat pescaire - Ardea cinerea	72	49,3%	60,9%	77,8%	27,1%	43,6%
Agró roig - Ardea purpurea	3	2,1%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Cigonya negra - Ciconia nigra	3	2,1%	0,0%	0,0%	4,2%	2,6%
Cigonya blanca - Ciconia ciconia	1	0,7%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
Aligot vesper - Pernis apivorus	24	16,4%	0,0%	2,8%	35,4%	15,4%
Milà negre - Milvus migrans	1	0,7%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
Milà reial - Milvus milvus	1	0,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
Voltor negre - Aegypius monachus	1	0,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
Àliga marcenca - Circaetus gallicus	13	8,9%	8,7%	5,6%	16,7%	2,6%
Arpella vulgar - Circus aeruginosus	26	17,8%	8,7%	2,8%	35,4%	15,4%
Arpella pàl·lida - Circus cyaneus	3	2,1%	0,0%	0,0%	4,2%	2,6%
Esparver cendrós - Circus pygargus	4	2,7%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%
Astor - Accipiter gentilis	14	9,6%	17,4%	8,3%	8,3%	7,7%
Esparver vulgar - Accipiter nisus	52	35,6%	43,5%	8,3%	45,8%	43,6%
Aligot comú - Buteo buteo	42	28,8%	60,9%	19,4%	4,2%	48,7%
Àliga calçada - Hieraaetus pennatus	12	8,2%	0,0%	0,0%	14,6%	12,8%
Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus	9	6,2%	8,7%	13,9%	4,2%	0,0%
Àliga pescadora - Pandion haliaetus	6	4,1%	0,0%	0,0%	8,3%	5,1%
Xoriguer comú - Falco tinnunculus	79	54,1%	56,5%	55,6%	56,3%	48,7%
Esmerla - Falco columbarius	7	4,8%	0,0%	0,0%	4,2%	12,8%
Falcó mostatxut - Falco subbuteo	24	16,4%	0,0%	0,0%	37,5%	15,4%
Falcó de la reina - Falco eleonorae	5	3,4%	0,0%	0,0%	10,4%	0,0%
Falcó pelegrí - Falco peregrinus	2	1,4%	0,0%	0,0%	2,1%	2,6%
Rascó - Rallus acuaticus	20	13,7%	47,8%	0,0%	0,0%	23,1%
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	78	53,4%	73,9%	80,6%	31,3%	43,6%
Polla blava - Porphyrio porphyrio	15	10,3%	8,7%	5,6%	14,6%	10,3%
Fotja - Fulica atra	33	22,6%	52,2%	36,1%	0,0%	20,5%
Grua - Grus grus	2	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%
Cames llargues - Himantopus himantopus	5	3,4%	8,7%	8,3%	0,0%	0,0%
Corriol petit - Charadrius dubius	5	3,4%	0,0%	13,9%	0,0%	0,0%
Fredulega - Vanellus vanellus	4	2,7%	8,7%	0,0%	0,0%	5,1%
Becada - Scolopax rusticola	1	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%
Gamba roja pintada - Tringa erythropus	1	0,7%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
Gamba verda - Tringa nebularia	2	1,4%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
Xivita - Tringa ochropus	13	8,9%	8,7%	5,6%	10,4%	10,3%
Valona - Tringa glareola	2	1,4%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
Xivitona - Actitis hypoleucos	13	8,9%	0,0%	25,0%	8,3%	0,0%
Gavina vulgar - Larus ridibundus	37	25,3%	56,5%	16,7%	22,9%	17,9%
Gavina corsa - Larus audouinii	6	4,1%	13,0%	8,3%	0,0%	0,0%
Gavià argentat - Larus michaellis	2	1,4%	0,0%	2,8%	2,1%	0,0%
Fumarell carablanc - Chlidonias hybrida	3	2,1%	0,0%	5,6%	0,0%	2,6%
Colom roquer - Columba livia	20	13,7%	26,1%	13,9%	12,5%	7,7%
Xixella - Columba oenas	14	9,6%	4,3%	22,2%	10,4%	0,0%
Tudó - Columba palumbus	126	86,3%	100,0%	100,0%	77,1%	76,9%
Tórtora turca - Streptopelia decaocto	21	14,4%	17,4%	27,8%	8,3%	7,7%
Tórtora - Streptopelia turtur	21	14,4%	0,0%	36,1%	16,7%	0,0%
Cucut reial - Clamator glandarius	3	2,1%	0,0%	5,6%	2,1%	0,0%
Cucut - Cuculus canorus	23	15,8%	0,0%	61,1%	0,0%	2,6%

Òliba - Tyto alba	1	0,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
Xot - Otus scops	3	2,1%	0,0%	2,8%	2,1%	2,6%
Duc - Bubo bubo	6	4,1%	4,3%	8,3%	0,0%	5,1%
Mussol comú - Athene noctua	10	6,8%	0,0%	8,3%	12,5%	2,6%
Gamarús - Strix aluco	1	0,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus	1	0,7%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
Siboc - Caprimulgus ruficollis	3	2,1%	0,0%	5,6%	2,1%	0,0%
Ballester - Apus melba	51	34,9%	8,7%	38,9%	50,0%	28,2%
Falciot negre - Apus apus	55	37,7%	0,0%	97,2%	41,7%	0,0%
Falciot pàl·lid - Apus pallidus	5	3,4%	0,0%	2,8%	8,3%	0,0%
Blauet - Alcedo atthis	40	27,4%	34,8%	13,9%	25,0%	38,5%
Abellerol - Merops apiaster	57	39,0%	0,0%	80,6%	58,3%	0,0%
Gaig blau - Coracias garrulus	2	1,4%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
Puput - Upupa epops	20	13,7%	8,7%	13,9%	16,7%	12,8%
Colltort - Jynx torquilla	2	1,4%	0,0%	2,8%	2,1%	0,0%
Picot verd - Picus viridis	74	50,7%	65,2%	72,2%	39,6%	35,9%
Picot garser gros - Dendrocopos major	31	21,2%	30,4%	30,6%	16,7%	12,8%
Picot garser petit - Dendrocopos minor	4	2,7%	0,0%	2,8%	4,2%	2,6%
Cogullada vulgar - Galerida cristata	28	19,2%	17,4%	41,7%	12,5%	7,7%
Cogullada fosca - Galerida theklae	5	3,4%	0,0%	2,8%	0,0%	10,3%
Cotoliu - Lullula arborea	16	11,0%	26,1%	2,8%	2,1%	20,5%
Alosa vulgar - Alauda arvensis	8	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	20,5%
Oreneta de ribera - Riparia riparia	11	7,5%	4,3%	5,6%	14,6%	2,6%
Roquerol - Ptyonoprogne rupestris	16	11,0%	34,8%	2,8%	4,2%	12,8%
Oreneta vulgar - Hirundo rustica	104	71,2%	26,1%	102,8%	100,0%	33,3%
Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica	7	4,8%	0,0%	13,9%	4,2%	0,0%
Oreneta cuablanca - Delichon urbicum	84	57,5%	30,4%	80,6%	83,3%	20,5%
Piula dels arbres - Anthus trivialis	11	7,5%	0,0%	5,6%	16,7%	2,6%
Titella - Anthus pratensis	44	30,1%	56,5%	5,6%	0,0%	74,4%
Cuereta groga - Motacilla flava	4	2,7%	0,0%	2,8%	6,3%	0,0%
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea	43	29,5%	47,8%	8,3%	22,9%	46,2%
Cuereta blanca - Motacilla alba	93	63,7%	87,0%	83,3%	33,3%	69,2%
Cargolet - Troglodytes troglodytes	93	63,7%	78,3%	97,2%	31,3%	64,1%
Pardal de bardissa - Prunella modularis	40	27,4%	65,2%	0,0%	0,0%	64,1%
Pit-roig - Erithacus rubecula	100	68,5%	91,3%	72,2%	35,4%	92,3%
Rossinyol - Luscinia megarhynchos	50	34,2%	0,0%	91,7%	35,4%	0,0%
Cotxa blava - Luscinia svecica	2	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%
Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros	42	28,8%	69,6%	2,8%	2,1%	61,5%
Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus	6	4,1%	4,3%	2,8%	4,2%	5,1%
Bitxac rogenç - Saxicola rubetra	1	0,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
Bitxac comú - Saxicola torquatus	49	33,6%	34,8%	50,0%	18,8%	35,9%
Còbit gris - Oenanthe oenanthe	5	3,4%	0,0%	0,0%	10,4%	0,0%
Còbit ros - Oenanthe hispanica	4	2,7%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%
Merla blava - Monticola solitarius	24	16,4%	26,1%	36,1%	2,1%	10,3%
Merla de pit blanc - Turdus torquatus	3	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%
Merla - Turdus merula	109	74,7%	95,7%	97,2%	39,6%	84,6%
Griva cerdana - Turdus pilaris	1	0,7%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Tord comú - Turdus philomelos	75	51,4%	95,7%	44,4%	16,7%	74,4%
Tord ala-roig - Turdus iliacus	8	5,5%	26,1%	0,0%	0,0%	5,1%
Griva - Turdus viscivorus	65	44,5%	52,2%	61,1%	27,1%	46,2%
Rossinyol bord - Cettia cetti	88	60,3%	73,9%	94,4%	37,5%	48,7%
Trist - Cisticola juncidis	34	23,3%	4,3%	63,9%	18,8%	2,6%
Boscaler pintat gros - Locustella naevia	1	0,7%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%
Boscarla dels joncs - Acrocephalus schoenot	1	0,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpace	16	11,0%	0,0%	11,1%	16,7%	10,3%
Balquer - Acrocephalus arundinaceus	19	13,0%	0,0%	44,4%	6,3%	0,0%
Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta	32	21,9%	0,0%	55,6%	25,0%	0,0%
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	102	69,9%	78,3%	88,9%	39,6%	84,6%
Tallarol gros - Sylvia borin	5	3,4%	0,0%	2,8%	6,3%	2,6%
Tallarol emmascarat - Sylvia hortensis	2	1,4%	0,0%	2,8%	0,0%	2,6%
Tallareta cuallarga - Sylvia undata	60	41,1%	21,7%	13,9%	56,3%	59,0%
Tallarol de garriga - Sylvia cantillans	24	16,4%	0,0%	13,9%	25,0%	17,9%
Tallarol capnegre - Sylvia melanocephala	144	98,6%	100,0%	100,0%	95,8%	100,0%
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli	36	24,7%	0,0%	77,8%	16,7%	0,0%
Mosquiter xiulaira - Phylloscopus sibilatrix	2	1,4%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	60	41,1%	82,6%	25,0%	8,3%	71,8%

Mosquiter de passa - <i>Phylloscopus trochilus</i>	17	11,6%	0,0%	13,9%	20,8%	5,1%
Reietó - <i>Regulus regulus</i>	8	5,5%	34,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Bruel - <i>Regulus ignicapillus</i>	73	50,0%	69,6%	55,6%	41,7%	43,6%
Papamosques gris - <i>Muscicapa striata</i>	13	8,9%	0,0%	13,9%	16,7%	0,0%
Mastegatxes - <i>Ficedula hypoleuca</i>	11	7,5%	0,0%	5,6%	18,8%	0,0%
Mallerenga cuallarga - <i>Aegithalos caudatus</i>	102	69,9%	82,6%	86,1%	47,9%	74,4%
Mallerenga emplomallada - <i>Parus cristatus</i>	92	63,0%	82,6%	77,8%	43,8%	61,5%
Mallerenga petita - <i>Parus ater</i>	51	34,9%	34,8%	44,4%	29,2%	33,3%
Mallerenga blava - <i>Parus caeruleus</i>	78	53,4%	73,9%	77,8%	33,3%	43,6%
Mallerenga carbonera - <i>Parus major</i>	91	62,3%	87,0%	75,0%	37,5%	66,7%
Raspinell - <i>Certhia brachydactyla</i>	91	62,3%	87,0%	88,9%	43,8%	46,2%
Teixidor - <i>Remiz pendulinus</i>	18	12,3%	34,8%	0,0%	0,0%	25,6%
Oriol - <i>Oriolus oriolus</i>	33	22,6%	0,0%	55,6%	27,1%	0,0%
Botxí - <i>Lanius meridionalis</i>	11	7,5%	0,0%	2,8%	8,3%	15,4%
Capsigrany - <i>Lanius senator</i>	13	8,9%	0,0%	22,2%	10,4%	0,0%
Gaig - <i>Garrulus glandarius</i>	99	67,8%	69,6%	75,0%	50,0%	82,1%
Garsa - <i>Pica pica</i>	78	53,4%	73,9%	52,8%	47,9%	48,7%
Gralla de bec vermell - <i>Pyrrhocorax pyrrhoc</i>	1	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%
Gralla - <i>Corvus monedula</i>	2	1,4%	0,0%	2,8%	2,1%	0,0%
Corb - <i>Corvus corax</i>	8	5,5%	4,3%	2,8%	10,4%	2,6%
Estornell vulgar - <i>Sturnus vulgaris</i>	57	39,0%	78,3%	19,4%	20,8%	56,4%
Estornell negre - <i>Sturnus unicolor</i>	49	33,6%	52,2%	55,6%	10,4%	30,8%
Pardal comú - <i>Passer domesticus</i>	88	60,3%	87,0%	88,9%	37,5%	46,2%
Pardal xarrec - <i>Passer montanus</i>	47	32,2%	39,1%	44,4%	22,9%	28,2%
Pardal roquer - <i>Petronia petronia</i>	2	1,4%	4,3%	2,8%	0,0%	0,0%
Pinsà comú - <i>Fringilla coelebs</i>	54	37,0%	91,3%	0,0%	0,0%	84,6%
Gafarró - <i>Serinus serinus</i>	116	79,5%	95,7%	100,0%	56,3%	79,5%
Verdum - <i>Carduelis chloris</i>	95	65,1%	78,3%	100,0%	39,6%	56,4%
Cademera - <i>Carduelis carduelis</i>	99	67,8%	87,0%	97,2%	35,4%	69,2%
Lluer - <i>Carduelis spinus</i>	7	4,8%	4,3%	0,0%	0,0%	15,4%
Passerell - <i>Carduelis cannabina</i>	60	41,1%	43,5%	75,0%	18,8%	35,9%
Durbec - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	7	4,8%	4,3%	0,0%	0,0%	15,4%
Verderola - <i>Emberiza citrinella</i>	1	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%
Gratapalles - <i>Emberiza cirius</i>	77	52,7%	73,9%	77,8%	29,2%	46,2%
Sit negre - <i>Emberiza cia</i>	9	6,2%	13,0%	0,0%	0,0%	15,4%
Repicatalons - <i>Emberiza schoeniclus</i>	12	8,2%	17,4%	0,0%	0,0%	20,5%
Cruixidell - <i>Emberiza calandra</i>	4	2,7%	8,7%	2,8%	0,0%	2,6%
Ànec domèstic - <i>Anas peking/platyrhynchos</i>	5	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	12,8%
Cotorra de pit gris - <i>Myiopsitta monachus</i>	1	0,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
Bec de corall senegalès - <i>Estrilda astrid</i>	4	2,7%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%

En les pàgines següents, en tractar individualment cadascuna de les espècies, a l'hora d'omplir les taules sobre fenologia, migració, tendències poblacionals, etc... s'han tingut en compte fonamentalment les dades recollides al llarg dels darrers quinze anys (en el cas que les dades de referència fossin anteriors s'ha fet constar). A la fenologia de les espècies exòtiques s'hi ha posat l'abreviatura "exo" en l'apartat de divagant, atès que per ara no es poden considerar de cap altre apartat.

Oca vulgar (*Anser anser*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
												x

No observat el 2011. Darrera observació anys 1985, 2004/5 i 2010,

Ànec blanc (*Tadorna tadorna*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x				x		x					

No observat el 2011. Darrera observació anys 1987, 2006 i 2008.

Ànec xiulador (*Anas penelope*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x		

No observat el 2011. Darrera observació anys 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006 i 2007.

Ànec griset (*Anas strepera*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x					x		x	x		

No observat el 2011. Darrera observació anys 2003 i 2008.

Xarxet (*Anas crecca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		14-4-1996				Enguany		marxa		8-3-2011		
	arribada		4-7-2006						arribada		11-10-2011		

S'ha observat entre gener i març i des de l'octubre fins a finals d'any, sempre en quantitats molt baixes. Per exemple el 12-12-2011 i el 20-12-2011 es veuen 4 exemplars i el 30-12-2011 se'n veuen sis.

Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable		x	augmenta				

El 4-2-2011 la majoria d'exemplars van aparellats. El 19-4-2011 s'observa una femella amb 5 polls. El 25-4-2011 hi ha una femella amb 4 polls. El 30-4-2011 veiem una femella amb 3 polls i una altra amb 11 polls. El 29-5-2011 veiem una femella amb 4 polls. El 30-5-2011 veiem una femella amb 5 polls. S'ha anat veient tot l'any, les quantitats més altes es van observar al gener, el 3-1-2011 s'observa el màxim de 169 exemplars.

Ànec cuallarg (*Anas acuta*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x					x	x	x	x	

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1999, 2001, 2004, 2005 i 2010.

Xarrasclet (*Anas querquedula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x									

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2003, 2006 i 2007.

Ànec cullerot (*Anas clypeata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		18-4-2001			Enguany			marxa		17-3-2011		
	arribada		17-7-2006						arribada		10-11-11(DIVA)		

El 17-3-2011 s'observen 4 exemplars. Tenim notícia que el dia 10-11-2011 (DIVA-ORNITHO.CAT) es veuen 4 exemplars a l'embassament.

Xibec (*Netta rufina*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x				x		x			

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1998, 1999 i 2002.

Morell cap-roig (*Aythya ferina*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x			x					x	x	x	

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2005.

Morell xocolater (*Aythya nyroca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
									x				

No observat el 2011. Observat únicament el 17-9-1988 (PMRA).

Morell de plomall (*Aythya fuligula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
									x		x	x	

No observat el 2011. Darreres observacions any 2002.

Morell d'ulls grocs (*Bucephala clangula*)

Moren & uns grocs (Dacophaea claudia)															
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
															x

No observat el 2011. L'únic registre obtingut és del 20-12-1983.

Bec de serra mitjà (*Mergus serrator*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x									

No observat el 2011. L'únic registre obtingut és del 4-4-1966 (PMRA).

Perdiu roja (*Alectoris rufa*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

Al llarg de tot l'any s'han anat observant i escoltant exemplars a diferents territoris del Parc.

Guatlla (*Coturnix coturnix*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
									x										

No observat el 2011. Darreres observacions anys 2009 i 2010.

Faisà (*Phasianus colchicus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x		x	x	x						x	

El 10-2-2011 es troben restes d'una femella morta entre Torrelletes i el Corral de Muntanya. El 22-2-2011 s'observen 3 exemplars junts als entorns de Torrelletes.

Cabusset (*Tachybaptus ruficollis*)

Cassinet (Fen.) capus (Fen.)													
Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			

Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	x
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	

Es mantenen unes quantes parelles a l'embassament (poques) i algunes més de repartides per altres basses de certa mida, com són mas Calent i la cimentera. A l'embassament sembla que el contingent d'exemplars ha baixat una mica, i aquest 2011 rarament es superen els 10 exemplars. El 29-5-2011 als bassals de mas Calent veiem una parella al niu i una altra que ja té 2 polls. El 22-6-2011 observem fins a 3 grups familiars, un prop del fondo de l'Alzina i dos als bassals de mas Calent.

Cabussó emplomallat (*Podiceps cristatus*)

Cebasse emblemant (Cebrops emblemant)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x			x		x	x	x	

El 12-10-2011 (JGGF) s'observa un exemplar a l'embassament.

Cabussó collnegre (*Podiceps nigricollis*)

Cubasso comú (Pouterps nigricans)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
			x					x	x	x		x	x

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008 i 2010.

Corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		

El 3-1-2011 entre 50 i 60 exemplars fan pesca col·lectiva i agafen alburns. El 22-2-2011 es tornen a observar 111 exemplars fent pesca col·lectiva. El 23-1-2011 es conten 177 exemplars a les joques. La xifra màxima d'aquest any ha estat de 332 exemplars anotats el 1-3-2011. El 6-4-2011 veiem 8 exemplars migrant prop dels Monjos. Al període postnupcial s'anoten migrants els dies 6-9-2011, 20-9-2011, 3-10-2011, 26-10-2011, etc, el màxim pas és del 30-10-2011, un grup de 146 migrants

Bitó (*Botaurus stellaris*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x											x

No observat el 2011. Darreres observacions 2006.

Martinet menut (*Ixobrychus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		7-4-2010				Enguany		arribada		19-4-2011			
	marxa		6-10-2011						marxa		6-10-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta		x		

Sempre s'ha observat al pantà i al tram de riu Foix i riera de Marmellar més propers a l'embassament. Destaquem l'observació del 6-10-2011 que és la més tardana obtinguda al Parc del Foix i al Penedès (segons les nostres dades). La quantitat de parelles reproductores al Parc sembla mantenir la lleugera tendència a augmentar i calculem que gairebé podria situar-se prop de les 10 parelles.

En niu localitzat aquest any a la riba del pantà s'hi ha fet una mica de seguiment. El 6-6-2011, el 8-6-2011 i el 10-6-2011 hi ha un exemplar que està covant al niu. El 20-6-2011 hi ha un exemplar al niu que sembla covar (tot i que ja podria tenir polls petits i estar escalfant-los). El 22-6-2011 hi ha un exemplar al niu que sembla escalfar als polls petits. El 1-7-2011 al niu es veuen un mínim de 2 polls plomats. El 8-7-2011 el niu ja està buit i hi ha un poll que s'arregla les plomes a una alzina propera.

Altres observacions d'interès són: El 29-5-2011 veiem un exemplar que porta un alburn al bec. El 8-6-2011 hi ha diversos polls volanders que ja pesquen per si sols. El 20-6-2011 hi ha una parella que té territori a uns 20 metres del niu localitzat. I encara a un altre lloc, s'escolten veus d'un exemplar que possiblement està al niu.

Martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Nidificació	Anterior		segura			probable			possible		x	no detectat	
	Enguany		segura			probable			possible		x	no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		
											x		

Malgrat que la majoria d'observacions corresponen a exemplars estivals, es continua anotant algun exemplar hivernant, com per exemple els 2 martinets de nit vistos el 23-1-2011. És molt possible que aquests exemplars estivals nidifiquin a l'embassament; hi ha diferents evidències que ens hi fan pensar. Tanmateix no hem pogut observar nius amb activitat, i els que hem localitzat com a possibles nius d'aquesta espècie són molt difícils de controlar perquè estan situats en arbres molt tapats. El 13-2-2011 censem un total de 5 o 6 nius vells que podrien ser de martinet de nit, ja que a més estan a un lloc on els darrers anys s'hi han observat exemplars regularment. La presència de pescadors furtius en zones on no és permesa la pesca, ha fet que aquest sector de nius vells hagi vist la tranquil·litat pertorbada i la presència dels martinets de nit se n'hagi vist afectada.

Martinet ros (*Ardeola ralloides*)

Mullinet 105 (Mullia Funicularis)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes migrants	pr. citació	29-3-05(PTEA)				Enguany	pr. citació	-				
	últ. citació	1-6-1999					últ. citació	-				
	pr. citació	31-7-2007					pr. citació	1-8-2011				
	últ. citació	27-9-2005					últ. citació	5-9-2011(XPCA)				

El 1-8-2011 s'observen 2 exemplars a l'embassament. Tenim notícia que el 5-9-2011 (XPCA-ORNITHO.CAT) es veu un exemplar a l'embassament.

Esplugabous (*Bubulcus ibis*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII					
	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x					

El 3-1-2011 s'observa un exemplar en zona agrícola propera a l'embassament.

Martinet blanc (*Egretta garzetta*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Observacions més o menys regulars durant pràcticament tot l'any, amb màxims d'uns 15 exemplars a l'abril, en ple període de pas prenupcial.

Agró blanc (*Casmerodius albus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x			x	x	x	x	x	x

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.

Bernat pescaire (*Ardea cinerea*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant	x	de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

El 3-1-2011 observem un juvenil amb anella de lectura a distància H70 de color groc i lletres negres, que va ser anellat el 28-4-2010 de poll al Sot del Fuster a Vilanova de la Barca. El 22-6-2011, el 6-9-2011, 16-9-2011 i el 2-11-2011 observem l'exemplar marcat i podem llegir de nou l'anella H70. El 5-6-2011 observem un exemplar que menja una cria de tortuga. El 29-11-2011 un exemplar surt dels canyissars amb una rata comuna al bec.

Agró roig (*Ardea purpurea*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		?	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	pr. citació	14-3-1998				Enguany			pr. citació	15-4-2011				
	últ. citació	30-9-2004							últ. citació	-				

Es va observar un exemplar els dies 15-4-2011, 16-4-2011 i 19-4-2011, sempre a l'embassament

Cigonya negra (*Ciconia nigra*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
				x				x	x	x			

El 20-9-2001 de matinada, hi ha un exemplar a la cua de l'embassament, probablement hi ha fet nit. Tenim notícia que el 5-8-2011 (RJRA) als entorns d'Espitlles s'observa un exemplar en vol. També ens informen del pas de 2 exemplars el 9-10-2011 (MPMB) al Turó de les Tres Partions.

Cigonya blanca (*Ciconia ciconia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x			

El 20-5-2011 s'observen 2 exemplars prop de les Masuques migrant cap al nord. La citació és força interessant, ja que en pas prenupcial sempre s'havien obtingut registres més primerencs.

Becplaner (*Platalea leucorodia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x								

No observat el 2011. L'únic registre obtingut és del 12-4-2003.

Aligot vesper (*Pernis apivorus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x	x	x	
Dates extremes migrants	pr. citació		24-3-2003			Enguany		pr. citació		25-4-2011		
	últ. citació		15-5-2010					últ. citació		-		
	pr. citació		15-8-2009					pr. citació		8-9-2011		
	últ. citació		23-10-2003					últ. citació		5-10-2011		

S'observa amb bona freqüència durant el pas de tardor. Al pas prenupcial les observacions són més escasses.

Esparver d'espallles negres (*Elanus caeruleus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
								x									

No observat el 2011. Observat en una ocasió el 13-8-2002 (DIVA).

Milà negre (*Milvus migrans*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x	x		

El 12-4-2011 s'observa un exemplar migrant durant el pas prenupcial.

Milà reial (*Milvus milvus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x	x		

El 7-9-2011 (MPMB) des del Turó de les Tres Partions es veu un exemplar que migra.

Aufrany (*Neophron percnopterus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
									x					

No observat el 2011. Observat únicament el 16-9-2006.

Voltor comú (*Gyps fulvus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2011. Darreres observacions any 2003 i 2005.

Volter negre (*Aegypius monachus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
					x				x					

El 20-9-2011 (CRFST) (RJRA) es va recollir un exemplar fatigat a la conca del riu Foix, a la zona de Font-fregona, prop de Torrelles de Foix (a uns quants quilòmetres del Parc del Foix). L'exemplar es va traslladar al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torrefarrussa.

Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		4-3-2005				Enguany		arribada		6-3-2011			
	marxa		17-11-2005						marxa		5-10-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant			disminueix					estable		x	augmenta			

Es manté la població d'aquest ocell rapinyaire al Parc. El 6-3-2011 ja es va detectar l'arribada de la primera parella del Parc. A partir del setembre tant s'anoten els exemplars que tenen el territori de cria a les muntanyes del Parc com els exemplars migrants que travessen l'espai natural.

Arpella vulgar (*Circus aeruginosus*)

Fenologia		sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x			x	x	x	x	
Dates extremes migrants	pr. citació	6-3-2002					Enguany	pr. citació	17-3-2011				
	últ. citació	2-5-1999						últ. citació	19-4-2011				
	pr. citació	21-8-1998						pr. citació	27-8-2011				
	últ. citació	21-10-2006						últ. citació	7-11-2011				

S'ha anotat durant els dos passos migratoris. Destaquem la segona i la tercera desena de setembre com a període en què els migrants han estat més abundants, amb uns màxims observats el 12-9-2011, el 22-9-2011 i el 27-9-2011, en què passen 17, 23 i 15 exemplars respectivament.

Arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*)

Appendix 10a (Circus cyaneus)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x					x	x	x	x
Dates extremes	marxa		19-4-2007			Enguany		marxa		-		
hivernants	arribada		2-9-2007					arribada		14-9-2011		

S'ha observat diverses vegades al pas postnupcial; el 14-9-2011, 19-9-2011 i 5-10-2011.

Arpella pàl·lida russa (*Circus macrourus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
										x					

No observat el 2011. Observada únicament el 6-10-2010.

Esparver cendrós (*Circus pygargus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x			x	x	x				

S'ha observat diverses vegades al pas postnupcial; el 4-9-2011 i el 6-9-2011. Mentre que l'observació del 24-7-2011 als entorns del castell de Penyafort podria correspondre a un exemplar en dispersió postnupcial.

Astor (*Accipiter gentilis*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Nidificació	Anterior			segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany			segura		x	probable			possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants	1 a 10	x	10 a 100		Més de 100	
Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	x
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	

El 17-5-2011 un astor caça un ocell tipus estornell o merla als entorns de cal Semison i se l'endú cap a l'obaga de cal Bladet. El 1-8-2011 un exemplar juvenil es llança a caçar a la cua de l'embassament. El 6-8-2011 s'observa un exemplar juvenil per la mateixa zona. El 20-9-2011 s'observa un juvenil. El 2-10-2011 veiem un exemplar juvenil en migració i el 3-10-2011 un adult que migra.

Esparver vulgar (*Accipiter nisus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 30-4-2011 un exemplar marca territori prop del Pla de les Palmeres. La presència d'exemplars hivernants i migradors ha estat habitual. El pas de primavera és poc evident, tot i això, el 19-3-2011 s'observa un exemplar amb conducta típicament migradora. El pas migratori postnupcial és molt marcat i ample; les observacions de migrants s'inicien el 15-8-2011 i s'allarguen fins el 9-11-2011.

Aligot comú (*Buteo buteo*)

Fenologia	sedentari		x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x			
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta					

El 19-3-2011 tres exemplars a Santa Maria de Muntanyans (límits del parc) s'estan perseguint i empaitant, en clara defensa del territori. A prop de cal Semison, el 24-5-2011, veiem un exemplar que porta una presa (sembla un conill de mida mitjana), probablement va cap el niu. El 29-5-2011 prop de cal Semison veiem un exemplar que porta una presa a les potes i sembla dirigir-se cap al niu. El mateix dia 29-5-2011 s'observa un altre exemplar corresponent a un altre territori de cria. Durant la migració postnupcial s'anoten exemplars entre el 28-9-2011 i el 7-11-2011. El 19-12-2011 s'observa un exemplar de fase clara, molt blanc, al fondo de Borroleres.

Àliga cridanera (*Aquila clanga*)

Anguilla anguilla (Anguilla orange)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
										x	x		

No observat el 2011. Es disposa de registres dels anys 2008 i 2009.

Àliga daurada (*Aquila chrysaetos*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x							x						

No observat el 2011. Observada únicament els anys 2000 i 2005.

Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*)

Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x		x	x	x	x		x	x	x			x			
Nidificació	Anterior		segura			probable		x	possible			no detectat				
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat			x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars					x
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					

Des del 8-9-2011 i fins el 7-11-2011 s'observen exemplars migrant als cims del Puig de l'àliga i el Turó de les Tres Partions. En algunes dates es veuen en migració inversa, per exemple el 8-10-2011 s'hi observen 3

exemplars. Els registres d'exemplars hivernants fins ara han estat una raresa al Parc del Foix; el 7-12-2011 s'observa un exemplar hivernant prop de cal Semison i un altre als entorns de la Ràpita.

Àliga cuabarrada (*Hieraetus fasciatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		x		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					x		pinedes i alzinars			
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta		

Hem recollit informacions interessants de les àligues cuabarrades del Parc:

En primer lloc el 17-2-2011 (XPVA) observa molta estona (unes dues hores) una femella subadult a turada al cingle de la Bovera i movent-se després per l'entorn del poble de Torrelletes a la recerca d'alguna presa. Aquesta àliga duia una anella vermella a la pota dreta, pel que era un dels polls anellats el 2008 per la UB. Més tard vola cap a la Pòpia i allà es troba amb un mascle adult i claret amb qui va fer alguns picats i xocs. Més tard apareix una tercera àliga: una femella adulta, fins que finalment es perden tots tres exemplars per darrera el serrat de la línia elèctrica.

El 22-2-2011 observem la parella de cuabarrades. L'observació ha estat a partir de les 13,45 del migdia a Torrelletes. De primer un adult (semblava el mascle) volava lent i encarat al vent per gairebé aturar-se a l'aire. Tot semblava indicar que estava buscant cacera. S'ha desplaçat cap a mas Pigot i com que ja es perdia ens hem acostat fins a prop de les Masuques. Allà l'hem localitzat de nou agafant alçada, eren gairebé les 14h. Tot seguit hem vist també a la femella. Els dos adults (tots 2 plomatge ben blanc d'adult) han estat volant més a prop entre ells i han agafat alçada. S'han desplaçat fins a la banda de St Esteve. Un dels exemplars ha agafat més alçada i l'altre semblava que baixava a caçar. Es va seguint a aquest darrer. Finalment ha tornat a agafar alçada i s'ha retrobat amb l'altre. Al final, s'han separat de nou, el que s'observava ha marxat cap a la banda de Corral de Muntanya (cap a les 14,20h s'ha deixat d'observar). En tota l'observació (d'uns 35 minuts) ha semblat que el vol era per caçar. El que sembla clar és que si cacen els 2 exemplars no han fet la posta.

El 6-3-2011 s'observa un exemplar adult solitari, que sembla el mascle. Durant uns 15 a 20 minuts se'l veu en vol alt des de la Serra Curta, prop de cal Cassanyes.

El 22-3-2011 al migdia s'observa a l'àliga cuabarrada (ens va semblar el mascle) a prop de l'estació de l'Arboç. De primer va aixecar força enrenou en un grup de tudons d'un bosquet per la banda de Banyeres. Després es va deixar caure en picat a un camp, creiem que es va tirar sobre un conill, perquè per la zona hi abunda.

El 6-4-2011, el 7-4-2011 i el 30-4-2011 s'observa un exemplar sol. El 5-6-2011 s'observa la parella.

El 9-6-2011, durant una bona estona, la parella de cuabarrades sobrevola a poca alçada les vinyes de sota cal Cassanyes, una zona a on es veuen molts rastres de conill.

El 1-9-2011 i el 30-9-2011 s'observa un exemplar sol.

A l'estiu de 2011 ens informen d'un parell d'observacions puntuals de dos exemplars joves al territori de les àligues cuabarrades del Parc del Foix. Podria tractar-se d'exemplars en dispersió procedents d'altres territoris. Tanmateix no es pot descartar la remota possibilitat que la parella s'hagués reproduït en un punt desconegut. En d'altres cingleres del Parc no s'hi han trobat niu, però excepcionalment la cuabarrada pot fer niu en arbres. Creiem que no ha estat el cas, però tampoc ho podem descartar. D'acord amb les nostres observacions de les cuabarrades d'aquest 2011 al Parc, el 18 i 22 de febrer es va observar la parella. D'aleshores en endavant tenim citacions d'un exemplar, i a primers de juny tornem a tenir observacions de la parella. Per les nostres dades i pel que s'ha anat veient a la càmera i en les sortides de camp, pensem que aquest any no han criat. De tota manera, no podem descartar una petita possibilitat que sí que ho haguessin fet. Hi ha un niu on fa anys que no hi crien (hi ha un camí bastant transitat), s'hi van veure, però de forma esporàdica. Al niu on es va posar la càmera no hi van pondre (potser van trobar l'entorn alterat per la càmera, la placa solar,...).

Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x			x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació	16-3-2004				Enguany	pr. citació	-				
	últ. citació	9-5-2001					últ. citació	-				
	pr. citació	14-8-2010					pr. citació	7-9-2011(XPCA)				
	últ. citació	21-10-2006					últ. citació	6-10-2011				

El 17-9-2011 al matí s'observen dos exemplars migrants i a la tarda dos exemplars més. El 23-9-2011 es veu un migrant. El 4-10-2011 s'anoten dos exemplars que migren. L'observació del 6-10-2011 correspon a un exemplar que ha dormit a l'embassament, ja que a trenc d'alba s'observa dormint a un arbre i més tard se'l veu caçant pel pantà. El 7-9-2011 (XPCA-ORNITHO.CAT) al Turó de les Tres Partions es veu un migrant.

Xoriguer petit (*Falco naumanni*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2011. Darreres observacions any 2000.

Xoriguer comú (*Falco tinnunculus*)

Nidificació com a (1 a 12 nidificants)												
Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars		
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta	

El 17-3-2011 observem una parella amb actituds de festeig. El 12-4-2011 a prop del castell de Penyafort observem una parella que realitza la còpula. El 5-6-2011 observem una parella que intervé al niu a la zona de Clariana. El 19-6-2011 veiem 2 polls volanders a la teulada de Sant Esteve. El 13-8-2011 en zona de conreus al entorns del castell de Penyafort, s'allibera un exemplar procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. Entre el 31-8-2011 i el 20-10-2011 s'anoten exemplars en pas migratori des dels cims on es realitza el Pernis. El màxim registre de pas és del dia 3-10-2011 que s'anota un mínim de 44 exemplars.

Falcó cama-roig (*Falco vespertinus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
									x	x			

No observat el 2011. Darrera observació any 1998, 2004, 2005, 2007 i 2009.

Esmerla (*Falco columbarius*)

Esmerla (Fates colombarius)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x		x	x					x	x	x	x
Dates extremes	marxa		14-3-2004			Enguany			marxa		-	
hivernants	arribada		27-9-2011						arribada		25-9-11(MPMB)	

La primera observació del pas postnupcial, realitzada el 27-9-2011 passa a ser la data més primerenca per a les arribades de tardor al Parc. S'anoten exemplars en migració fins el 7-11-2011, tot i això cal recordar que és una espècie escassa. El 21-11-2011 en veu un exemplar que caça per l'embassament. El 25-9-2011 (MPMB) al Turó de les Tres Partions es veu una esmerla que migra.

Falcó mostatxut (*Falco subbuteo*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		5-4-1996				Enguany		arribada		-			
	marxa		23-10-2004						marxa					10-10-2011
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional		nidificant			disminueix			estable		x	augmenta			

Entre el 6-9-2011 i el 10-10-2011 s'anoten exemplars en pas migratori des dels cims més alts del Parc, amb màxims de 9 exemplars els dies 17-9-2011 i 27-9-2011, i 8 exemplars el 4-10-2011.

Falcó de la reina (*Falco eleonora*)

Fenologia de la fema (Fenologia cronològica)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x	x	x		

Els dies 15-8-2011, 4-9-2011 i 14-9-2011 s'observa un exemplar i el dia 6-9-2011 se n'observen dos, en tots els casos es veuen des del Turó de les Tres Partions.

El 10-8-2011 (MPMB) es veu un adult de fase clara des del Turó de les Tres Partions. El 17-9-2011 (RAGB-ORNITHO.CAT) s'observa un exemplar a l'embassament.

Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant			de pas		x	divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	

El 26-9-2011 s'observa un exemplar en migració des del Turó de les Tres Partions. El 21-11-2011 entre Castellet i les Masuques veiem un exemplar aturat a un arbre del bosc, proper als cultius. Hi està reposant, en adonar-se de la nostra presència es desplaça cap una zona propera en direcció a Torrelletes.

Rascló (*Rallus aquaticus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible			no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars					
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x	

Durant els mesos freds de l'any s'han observat i escoltat exemplars hivernants. Tot i que no descartem la seva nidificació (com ha fet en alguns anys anteriors),enguany no l'hem anotat en període de cria. S'hauria de fer un seguiment més intens d'aquesta au per veure com evoluciona la seva població.

Polla pintada (*Porzana porzana*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
			x	x									

No observat el 2011. Darrera observació any 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 i 2010.

Rascletó (*Porzana parva*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		x	x												

No observat el 2011. Es disposa de registres dels anys 1998 i 2005.

Rasclet (*Porzana pusilla*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x					x						

No observat el 2011. Es disposa de registres dels anys 1978 i 1998.

Guatlla maresa (*Crex crex*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
													x		

No observat el 2011. Darrera observació 13-12-1967 (PMRA).

Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable		x	augmenta				

El 19-4-2011 s'observa un niu actiu a mas Calent. El 5-6-2011 al pantà observem una parella amb 4 polls menuts. El 6-6-2011, el 10-6-2011, el 20-6-2011 i el 22-6-2011 a l'embassament s'observen diversos grups familiars amb polls petits. El 11-10-2011 veiem un exemplar atropellat a la carretera de l'Arboç prop de la cua de l'embassament.

Polla blava (*Porphyrio porphyrio*)

Fenologia													
sedentari		x	estival			hivernant			de pas		divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		x
		Enguany		segura			probable		possible		x	no detectat	
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
								x					

El 4-2-2011 trobem les restes d'un exemplar que sembla depredat per un rapinyaire, el mateix dia s'anota un altre exemplar viu. Al llarg de l'any s'ha anat detectant amb certa regularitat, en general un exemplar, però en algunes ocasions, com el 2-11-2011 dos exemplars. La vegetació de canyissos i bogues ha crescut molt i s'ha estès tot colonitzant noves àrees, això dificulta l'observació d'aquesta espècie. La majoria de vegades es detecta per la veu.



Polla blava trobada morta (*Porphyrio porphyrio*) (foto C.G.)

Fotja (*Fulica atra*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat					
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat					
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable				augmenta				

El 22-5-2011 veiem una femella amb 2 polls. El 20-6-2011 a la Marina, veiem un grup familiar amb dos polls bastant grans. Com en anys anteriors sembla que es manté la tendència a la disminució dels efectius de la fotja a l'embassament. Un cop acaben la reproducció comencen a minvar, possiblement per falta d'aliment i de retruc també per l'augment de la concentració de contaminants i d'anòxia al pantà.

Fotja banyuda (*Fulica cristata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x										

No observat el 2011. Sols tenim notícia d'una observació del 9-2-2004 (ASA, EFM).

Grua (*Grus grus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x									x	x

El 2-11-2011 prop de Castellet observem dos grups en migració, amb un total de 21 exemplars, que volen en direcció sud-oest-oest. Els dos grups volen bastant a prop l'un de l'altre. El 7-11-2011 des del Turó de les Tres Partions veiem un grup amb 33 exemplars i aproximadament al cap d'una hora un altre grup amb 78 exemplars. Es desplacen en vol migratori cap al sud-est, orientats cap a la costa, ja que a l'interior del país hi ha mal temps.

Sisó (*Tetrax tetrax*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
			x	x															

No observat el 2011. Es disposa de registres del 26-4-1972 (PMRA) i 9-3-2008 (MPMB).

Cames llargues (*Himantopus himantopus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		6-3-2002			Enguany			arribada		26-3-2011			
	marxa		3-10-2008						marxa		20-6-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat		x

S'han anotat diversos grups de migrants sedimentats a l'embassament; els dies 26-3-2011 sis exemplars, i els dies 6-6-2011 i 20-6-2011 cinc exemplars.

Torlit (*Burhinus oedicnemus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
										x					

No observat el 2011. Darrera observació anys 1950/60 i 2008.

Corriol petit (*Charadrius dubius*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		13-3-2002			Enguany		arribada		19-4-2011			
	marxa		28-9-2001					marxa		20-6-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta		

El 29-5-2011 prop de mas Calent veiem un grup familiar que ha criat als entorns dels bassals. A l'embassament no hi ha niat perquè el nivell de l'aigua és alt i no hi ha platges.

Corriol gros (*Charadrius hiaticula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
									x					

No observat el 2011. Es disposa d'un registre del 8-9-2006 (XPCA).

Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
												x		x

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1985 i 2001.

Fredulega (*Vanellus vanellus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x								x	x		
Dates extremes hivernants	marxa		4-3-2005				Enguany			marxa		11-2-2011		
	arribada		5-11-2007							arribada		20-12-2011		

El 7-2-2011 es van observar una trentena d'exemplars prop de les Masuques. El 11-2-2011 al mateix lloc hi havia 11 exemplars. El 20-12-2011 als entorns de mas Calent hi ha 8 exemplars, el 27-12-2011 al mateix lloc, se'n veuen un mínim de 3.

Territ menut (*Calidris minuta*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
							x	x	x										

No observat el 2011. Darreres observacions any 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006 i 2009.

Territ de Temminck (*Calidris Temminckii*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2011. Únicament es va observar l'agost de l'any 1998.

Territ beclarg (*Calidris ferruginea*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x			x				

No observat el 2011. Darreres observacions any 2001.

Territ variant (*Calidris alpina*)

Forma variant (Catalans alpina)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x	x			

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1999 i 2001.

Becadell sord (*Limnocyrtus minimus*)

Decaden 50a (<i>Eumecurus minutus</i>)																			
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
	x	x	x																

No observat el 2011. Darreres observacions any 1998, 2008 i 2009.

Becadell comú (*Gallinago gallinago*)

Decadenes com a (Guanyat guanyat)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x						x	x	x
Dates extremes hivernants	marxa		26-4-2005			Enguany			marxa		-	
	arribada		7-10-2004						arribada		-	

No observat el 2011. Darreres observacions any 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.

Becada (*Scolopax rusticola*)

Becard (Sceloporus vastator)														
Fenologia	sedentari			estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x							x	x	x		
Dates extremes hivernants	marxa		14-3-2004				Enguany			marxa		-		
	arribada		27-10-1996							arribada		7-12-2011		

El 7-12-2011 s'observa un exemplar a la riera de Llitrà.

Tètol cuanegre (*Limosa limosa*)

Fenologia (Zimosa zimosa)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x		x							

No observat el 2011. Es disposa de registres dels anys 1973 i 1985.

Tètol cuabarrat (*Limosa lapponica*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	x
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	---

No observat el 2011. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu col·lecció ornitològica Museu de Vilafranca).

Gamba roja pintada (*Tringa erythropus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x			x					

El 26-4-2011 (XPCA) s'observa un exemplar a les basses de mas Calent.

Gamba roja vulgar (*Tringa totanus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x			x	x	x			

No observat el 2011. Darrera observació anys 2004, 2005, 2006 i 2008.

Gamba verda (*Tringa nebularia*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x		x	x	x	x		

Els dies 15-4-2011 i 28-4-2011 s'observa un exemplar als bassals de mas Calent.

Xivita (*Tringa ochropus*)

Fenologia		sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		22-4-2003				Enguany			marxa		1-4-2011		
	arribada		14-6-2005							arribada		20-6-2011		

Aquest 2011 s'observen exemplars durant l'hivern i a les èpoques de pas. El pas postnupcial com sempre, es produeix molt aviat, a partir del 20-6-2011. Habitualment s'observen un o dos exemplars, els màxims han estat de 5 exemplars el 1-4-2011 i de 4 exemplars el 6-10-2011.

Valona (*Tringa glareola*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x	x	x	x	x		

El 15-4-2011 s'observen 2 exemplars a mas Calent i el 19-4-2011 s'observa un exemplar a mas Calent i un altre a l'embassament.

Xivitona (*Actitis hypoleucos*)

Xivrons (<i>Pectus hypoleucos</i>)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dates extremes migrants	pr. citació		5-3-1999			Enguany			pr. citació		15-4-2011	
	últ. citació		24-5-1980						últ. citació		17-5-2011	
	pr. citació		21-6-2007(PTEA)						pr. citació		21-7-2011	
	últ. citació		19-11-1999						últ. citació		12-8-2011	

El 28-4-2011 es veuen 8 exemplars i el 5-5-2011 es contenen fins a 21 exemplars. En d'altres dates les observacions han estat d'exemplars solitaris o en grups petits.

Gavina capnegra (*Larus melanocephalus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
							x	x			x	

No observat el 2011. Darreres observacions any 2005, 2007, 2008 i 2009.

Gavina menuda (*Larus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x									

No observat el 2011. Es disposa de registres de l'any 1999.

Gavina vulgar (*Larus ridibundus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

En algunes dates dels darrers mesos de l'any, 6-12-2011 o 7-12-2011 per exemple, hem observat una vintena de gavines a primera hora del matí, que ben aviat marxen del pantà. Just en aquestes hores del matí, quan hi havia gavines, hem pogut observar alguns peixos (alburns) que saltaven fora de l'aigua. Una estona més tard els peixos ja no salten fora l'aigua i les gavines abandonen l'embassament. Aquest comportament dels alburns l'atribuïm a què potser són perseguits per depredadors que com els silurs cacen de nit. En tot cas les gavines aprofiten per capturar alburns i quan els peixos resten menys actius marxen cap a mar.

Els registres més nombrosos d'enguany han estat el 12-1-2011, que es veuen 39 exemplars i el 1-3-2011 que se n'arriben a contar una cinquantena.

Gavina corsa (*Larus audouinii*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x		x			x	

El 26-3-2011 a primera hora del matí s'observen 2 exemplars a l'embassament, al migdia encara hi són. El 25-4-2011 s'observa un exemplar que es mou molt tranquil pel pantà; es para a una fusta que sura damunt l'aigua, i fins i tot es deixa fotografiar. El 20-6-2011 s'observa un exemplar a l'embassament. Tenim notícia que el 10-5-2011 (ABRA-ORNITHO.CAT) es veu un exemplar adult a l'embassament.

Gavià fosc (*Larus fuscus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2011. Observat únicament l'any 2001.

Gavià argentat (*Larus michaellis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x		x	x	x	x			x				

Els 22-4-2011 prop dels Monjos s'observen 3 exemplars que volen cap al nord.

Xatrac gros (*Sterna caspia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x								

No observat el 2011. Darreres observacions anys 2002, 2005 i 2006.

Fumarell carablanc (*Chlidonias hybrida*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x	x		

El 16-4-2011 es veuen 3 exemplars a l'embassament. El 25-4-2011 es veuen 2 exemplars a l'embassament. El 11-10-2011 s'observen 2 exemplars que durant molta estona estan pescant pel pantà.

Fumarell negre (*Chlidonias niger*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x		x	x	x				

No observat el 2011. Darreres observacions any 1980, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2009.

Fumarell alablanc (*Chlidonias leucopterus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2011. Observat sols en una ocasió el 19-9-2008 (XPCA).

Colom roquer (*Columba livia*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta						

El 6-3-2011 des de la Serra Curta, prop de cal Cassanyes, s'observa un centenar d'exemplars que migren cap al nord.

Xixella (*Columba oenas*)

Anell (Columba ocellus)													
Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			

Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		x	pinedes i alzinars	
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable		x	augmenta	

Se segueixen observant a diferents zones del Parc en quantitats baixes, el màxim és del 17-3-2011 que es veuen 5 exemplars prop de Penyafort. El 21-9-2011 des del Turó de les Tres Partions s'observen 2 exemplars en migració.

Tudó (*Columba palumbus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x	
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x			
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional		nidificant			disminueix			estable			x	augmenta		

El 6-3-2011 al fondo de les Boveres un exemplar s'alça del niu on sembla que estava covant. El 17-3-2011 observem una parella amb actituds de zel. El 25-4-2011 s'observa un exemplar en zel. A la tardor s'observen uns quants grups de migrants, per exemple el 22-10-2011 un grup de 61 exemplars, o el 7-11-2011 un estol d'aproximadament 70 exemplars.

Tórtora turca (*Streptopelia decaocto*)

Fenologia													
sedentari		x	estival			hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat	
		Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta		x	

El 8-3-2011 s'observa alguna parella amb actituds de zel.

Tórtora (*Streptopelia turtur*)

Fenologia														sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant									
Mesos observació														I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
																				x		x		x		x		x		x							
Dates extremes estivals				arribada				2-4-2005				Enguany				arribada				28-4-2011																	
				marxa				11-10-2009								marxa				20-9-2011																	
Nidificació				Anterior				segura				x		probable						possible						no detectat											
				Enguany				segura				x		probable						possible						no detectat											
Estimació de parelles nidificants								1 a 10								10 a 100				x		Més de 100															
Hàbitats preferents de cria				zones urbanes								rupícoles								pinedes i alzinars				x													
				conreus i erms				x				màquies i garrigues								z. humides/bosc ribera																	
Tendència poblacional nidificant								disminueix				x		estable						augmenta																	

A finals d'abril i al maig se senten exemplars que ja s'han establert al territori i el marquen cantant. El 8-7-2011 una parella marca territori, en aquest cas, per les dates, sembla correspondre a una segona posta.

Cucut reial (*Clamator glandarius*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		5-2-2009			Enguany		arribada		6-4-2011			
	marxa		24-7-2011					marxa		24-7-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		
	conreus i erms			x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		

El 6-4-2011 a la riera de Llitrà, prop dels Monjos, observem un exemplar que és empaitat per una garsa. El 19-6-2011 veiem un exemplar adult a Sant Esteve. El 24-7-2011 s'observen 2 exemplars joves que demanen menjar a les garses.

Cucut (*Cuculus canorus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		25-3-2010				Enguany		arribada		1-4-2011			
	marxa		8-10-2011						marxa		8-10-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura			probable		x	possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				pinedes i alzinars				x
	conreus i erms				x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

Hem de destacar l'observació del 8-10-2011, ja que mai s'havia vist aquesta espècie tan tard. L'exemplar es va veure en una jornada d'observació de les migracions des del Turó de les Tres Partions.

Òliba (*Tyto alba*)

Onada (1970-1984)														
Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x		x	x	x		x	x			
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
		Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

El 17-6-2011 es fa hacking amb exemplars joves a Penyaafel. Més endavant es fa hacking amb exemplars joves al castell de Penyaafort. El 13-9-2011 se senten a cridar diversos exemplars en masies properes a Penyaafort; algun fuig de cal Pere Joan i es desplaça a la zona de cal Vicari. Possiblement es tracta d'alguns dels exemplars alliberats en hacking.

Xot (*Otus scops*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant					
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI		XII			
						x		x	x	x				x						
Dates extremes		arribada		5-4-1980					Enguany			arribada		28-4-2011						
estivals		marxa		11-7-2001								marxa		-						
Nidificació		Anterior			segura			x	probable			possible			no detectat					
		Enguany			segura				probable			possible			x	no detectat				
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			x	10 a 100						Més de 100					
Hàbitats preferents		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars				x		
de cria		conreus i erms				x		màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera				x		
Tendència poblacional		nidificant				disminueix		x		estable					augmenta					

El 28-4-2011 se sent a cantar un exemplar als entorns de l'aiguabarreig del Foix i el Marmellar. El dia 1-10-2011 s'alliberen 9 exemplars procedents de Torreferrussa. Els alliberaments es realitzen en caixes niu col·locades al riu Foix i a la zona de muntanya de mas de l'Artís – Pla de les Palmeres.

Duc (*Bubo bubo*)

Fenologia		sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			
Nidificació		Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
		Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable		x	augmenta				

El 12-2-2011 un exemplar canta als entorns de Torrelletes. Entre finals de març i primers d'abril (RJRA) es troba un duc mort prop d'una línia elèctrica per la zona de Torrelletes. L'exemplar és recollit pels agents rurals. A finals d'any, el 27-12-2011 a la tarda s'observa el duc d'aquest territori aturat a un cingle, en fosquejar se'l sent a cantar durant bastanta estona. Pensem que malgrat la mort d'un exemplar, l'adult que va quedar desparellat ja ha trobat nova parella i per tant el territori es manté.

El 5-6-2011 es localitza una tercera parella de duc “*Bubo bubo*” que té el territori a les muntanyes del Parc del Foix. El 27-12-2011 es localitza un quart territori en una zona de muntanya apartada dels territoris restants. A més, aquest mateix dia, pràcticament a la mateixa hora s’anota activitat al territori més proper.

Des de fa molts anys es coneixia una única parella de duc establerta a la part alta del Parc del Foix. Fa un parell d’anys es va trobar un segon territori ocupat en una zona propera al riu Foix, i aquest 2011 s’ha comprovat l’existència d’una tercera i una quarta parelles en zones diferents de l’espai natural. La presència del duc és un senyal del bon equilibri natural que hi ha en terres del Foix, ja que aquesta espècie se situa al cim de les piràmides tròfiques juntament amb altres depredadors nocturns i diürns.

El 9-6-2011 trobem una egagròpila de duc entre el fondo de la Garsosa i el Pla de les Palmeres. El 19-12-2011 trobem una egragròpila de duc al fondo de Borrolleres.

Mussol comú (*Athene noctua*)

Fenologia	sedentari		x	estival		hivernant		de pas		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms		x	màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

Ha estat vist al llarg de tot l’any en diferents zones, sobretot en entorns agrícoles.

Gamarús (*Strix aluco*)

Fenologia	sedentari		x	estival		hivernant		de pas		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars			
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

El 13-8-2011 als entorns de la font de Sant Llorenç s’allibera un exemplar procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

Mussol banyut (*Asio otus*)

Fenologia	sedentari		x	estival		hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x		x						
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		

No observat el 2011. Darreres observacions anys 2004 i 2005.

Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		19-4-2002				Enguany		arribada		22-5-2011		
	marxa		1-10-2003						marxa		-		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms				x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 22-5-2011 trobem 3 territoris diferents a les muntanyes del Parc.

Siboc (*Caprimulqus ruficollis*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x	x	x	x	x			
Dates extremes	arribada		5-5-2011			Enguany			arribada		5-5-2011	
estivals	marxa		27-9-2007						marxa		-	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars	
de cria	conreus i erms			x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional	nidificant			disminueix				estable		x	augmenta	

L'observació del 5-5-2011 d'un exemplar cantant a la zona propera a la Marsera passa a ser la més primerenca obtinguda al Parc del Foix.

Ballester (*Apus melba*)

Fenologia														sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant			
Mesos observació				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
								x		x		x		x		x		x		x		x					
Dates extremes estivals				arribada				8-3-2011				Enguany				arribada				8-3-2011							
				marxa				7-11-2011								marxa				7-11-2011							
Nidificació				Anterior				segura				x		probable				possible				no detectat					
				Enguany				segura				x		probable				possible				no detectat					
Estimació de parelles nidificants								1 a 10				x		10 a 100						Més de 100							
Hàbitats preferents de cria				zones urbanes				x		rupícoles				x		pinedes i alzinars											
				conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera											
Tendència poblacional nidificant								disminueix						estable						augmenta				x			

El 8-3-2011 s'observa un grup de 8 exemplars que volen en migració cap al nord. Aquesta citació és la més primerenca obtinguda fins ara. El 11-10-2011 veiem un estol d'uns 300 exemplars que baixa a beure aigua a l'embassament. A la tardor s'observen molts migrants des del Turó de les Tres Partions, destaquem el 17-9-2011 que s'arriben a contar un mínim de 293 exemplars. Aquest any les condicions meteorològiques han afavorit que la presència dels ballesters s'allargués excepcionalment fins a primers de novembre, quan el més habitual era que a l'octubre es veiessin els darrers. Destaquem, doncs, les observacions del 5-11-2011 de 56 exemplars i del 7-11-2011 d'un grup de 4 i un altre de 20 exemplars. Per tant, s'eixampla el període d'observació tant pel que fa a les dades prenupcials com les postnupcials, respecte les citacions obtingudes fins avui.

Falciot negre (*Apus apus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes	arribada		25-3-2010			Enguany			arribada		3-4-2011		
estivals	marxa		3-10-2004						marxa		19-9-2011		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x
Hàbitats preferents		zones urbanes		x	rupícoles				x	pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

Un cop acabada la reproducció entre el 24-7-2011 i el 19-9-2011 s'observen exemplars en pas migratori cap al sud.

Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x		x	x	x	x			

El 30-4-2011 s'observen 2 exemplars a la zona del Pla de les Palmeres. El 27-8-2011, el 31-8-2011 i el 20-9-2011 es veu un exemplar al Turó de les Tres Partions.

Blauet (*Alcedo atthis*)

[illegible]

Nidificació	Anterior	segura	x	probable		possible		no detectat	
	Enguany	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10		x	10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera		

Per segon any consecutiu s'observa la nidificació de l'espècie, que té niu en el mateix talús que l'any passat. La resta de l'any també s'observa amb regularitat amb un màxim d'efectius durant el pas postnupcial.

Abellerol (*Merops apiaster*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant		de pas	x	divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada	6-4-2011				Enguany		arribada	6-4-2011				
	marxa	29-9-2001						marxa	19-9-2011				
Nidificació	Anterior	segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany	segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 5-6-2011 s'observen alguns exemplars a la cua de l'embassament que semblen pescar peixets. La primera data d'observació d'enguany, el 6-4-2011 a la zona del castell de Penyafort, passa a ser el registre més primerenc de l'espècie al Parc.

Gaig blau (*Coracias garrulus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x						

El 10-6-2011 s'observa un exemplar prop de l'ermita de Sant Esteve. També tenim notícia que el 13-5-2011 (XPCA-ORNITHO.CAT) es veu un exemplar a la zona del Corral d'en Rafeques.

Puput (*Upupa epops*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes		x	rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms		x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

Hi ha diverses parelles establertes a les zones més rurals del Parc, moltes de les quals migren un cop han acabat la reproducció. Tanmateix, aleshores arriben exemplars procedents de zones més fredes que resten aquí a passar-hi l'hivern. Així doncs la puput al Parc del Foix s'hi observa tot l'any.

Colltort (*Jynx torquilla*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant	?	de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x	x	x	x		x	x
Dates extremes estivals	arribada	4-3-2010				Enguany		arribada	-			
	marxa	19-9-2009(JGGF)						marxa	8-7-2011			
Nidificació	Anterior	segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany	segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				x
	conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

El 19-6-2011, a Sant Esteve, hi escoltem un exemplar que canta. El 8-7-2011 se sent un exemplar per la zona de la Marsera. Es tracta de registres de notable interès, puix que evidencien que s'hi manté una població reproductora.

Picot verd (*Picus viridis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				x

Aquesta és una espècie molt territorial, que habitualment no s'allunya de la seva zona de cria i d'alimentació. De la mateixa manera que l'any passat hem seguit notant una sensible expansió envers nous territoris (per això hem assenyalat la tendència poblacional nidificant com a estable, però amb un lleuger augment). Els El 17-3-2011 hi ha un picot verd que empaita insistentment a un estornell negre per dins d'un bosc de ribera. Possiblement el vol foragitar, ja que els estornells poden ocupar nius de picot, i el picot es deu disposar a criar. El 22-5-2011 a la cua de l'embassament veiem un grup familiar de picots amb els polls sortits fa pocs dies del niu que segueixen els adults.

Picot garser gros (*Dendrocopos major*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant			de pas		divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable				augmenta				x

El picot garser gros se segueix observant amb regularitat tot l'any, per bé que en determinades èpoques esdevé molt discret. El 29-5-2011 veiem un grup familiar que ha criat als entorns de la Timba.

Picot garser petit (*Dendrocopos minor*)

Fenologia															
sedentari			x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x			x	x		x			
Nidificació		Anterior			segura			x	probable		possible		no detectat		
		Enguany			segura			x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable			augmenta				x

El 6-4-2011 als entorns de la riera de Llitrà veiem una femella que emet algun cant. El 30-7-2011 a la mateixa zona de la riera de Llitrà li tornem a escoltar, a més també localitzem un exemplar a un altre espai de la mateixa riera. El 6-8-2011 al riu Foix, prop de l'embassament, observem un exemplar que sembla en dispersió postnupcial, ja que va resseguint el bosc de ribera. El 1-10-2011 escoltem un exemplar al bosc de ribera del riu Foix, a l'entorn de les Masuques. Considerem la tendència poblacional nidificant en un sensible augment, ja que des de la primera observació de l'espècie el 2008 fins ara hem apreciat un augment dels boscos de ribera que ocupa.

Terrerola vulgar (*Calandrella brachydactyla*)

Fenologia														
sedentari			estival				hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
						x								

No observat el 2011. Es disposa d'un registre del 22-5-2002 (PTEA).

Cogullada vulgar (*Galerida cristata*)

Cognada vulgar (Cortada curta)													
Fenologia	sedentari		x	estival		hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x		Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms		x		màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable		augmenta			

Tot i que la seva tendència poblacional del conjunt dels darrers 10 anys es considera en disminució, pensem que últimament s'ha estabilitzat una mica. Es manté amb una densitat baixa a les terres de conreu.

Cogullada fosca (*Galerida theklae*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta		

A la primavera es va detectar a la zona de cria propera a la Plana Morta, el 25-4-2011. A la tardor, com en anys anteriors, es deixa veure pels cims més alts. Es manté la població del Parc que segons les nostres observacions és de dues parelles.

Cotoliu (*Lullula arborea*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

A la primavera i estiu es detecten unes poques parelles reproductores. El 19-3-2011 ja se'n veu alguna de formada, el 20-4-2011 canten al territori on fan niu i el 24-7-2011 ja s'observa algun grup familiar. A la tardor arriben exemplars que travessen el Parc en pas migratori o bé que s'hi queden com a hivernants. El 13-10-2011 s'anota l'arribada dels primers exemplars en pas. A l'hivern esdevenen més abundants i es reparteixen sobretot per zones agrícoles.

Alosa vulgar (*Alauda arvensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
	x	x	x							x		x	x
Dates extremes hivernants	marxa		12-3-2005			Enguany			marxa		-		
	arribada		7-10-2006						arribada		8-10-2011		

El 8-10-2011 al Turó de les Tres Partions s'anota l'arribada dels primers exemplars hivernants.

Oreneta de ribera (*Riparia riparia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació	26-2-2007				Enguany			pr. citació	26-3-2011		
	últ. citació	11-6-1998							últ. citació	22-5-2011		
	pr. citació	31-7-2011							pr. citació	31-7-2011		
	últ. citació	15-10-2000							últ. citació	6-10-2011		

S'ha observat durant el pas migratori de primavera i també al postnupcial. Destaquem l'observació del 31-7-2011, ja que passa a ser la més avançada del pas migratori postnupcial.

Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable			possible		x	no detectat		
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars			
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant			disminueix		x	estable				augmenta				

Sobretot s'observa a l'hivern, que a més és quan es pot trobar en quantitats més altes. L'observació d'una parella en parets prop dels Monjos el 22-4-2011 és interessant, ja que mostra la possibilitat de nidificació de l'espècie, tal i com ho feia anys enrere. Al pas de tardor, des del Turó de les Tres Partions es van veure roquerols entre el 26-9-2011 i el 30-10-2011.

Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		17-2-1979				Enguany		arribada		1-3-2011			
	Enguany		15-11-1998						marxa		22-10-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100			x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable				augmenta			

El 30-4-2011 observem exemplars que estan construint niu. El 22-5-2011 observem un adult que alimenta polls volanders. El 29-5-2011 veiem exemplars que agafen fang per fer niu i altres exemplars peixent els polls en vol. Al pas de tardor hi ha dies que són força abundants; per exemple el 8-9-2011 en 2 hores es conten 603 exemplars migrant. Tenim notícia d'una oreneta vulgar que va ser anellada el 19-9-2010 (MOVA) al pantà de Foix i que al 6-8-2011 ha estat recapturada a Bone, Sanchen Anhalt (Alemanya). Segons les dades de la fitxa d'anellament, aquesta oreneta havia nascut el 2010, és una femella i la distància entre els dos punts on ha estat capturada és de 1430 km.

Oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII			
				x		x		x	x	x	x	x	x						
Dates extremes		arribada		7-3-2008				Enguany				arribada		6-4-2011					
estivals		marxa		3-10-2008								marxa		15-8-2011					
Nidificació		Anterior		segura		x		probable				possible				no detectat			
		Enguany		segura		x		probable				possible				no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100					Més de 100					
Hàbitats preferents		zones urbanes						rupícoles				x		pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera					

El 6-4-2011 veiem una parella que marca territori a l'església de Santa Margarida, en estar tancat l'edifici no es pot comprovar si hi tenen niu. El mateix dia observem una altra parella que agafa fang al torrent de Mata-rectors. En dates posteriors també s'han observat evidències de reproducció.

Oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dates extremes estivals	arribada		19-2-2004			Enguany		arribada		1-3-2011			
	marxa		4-11-2009					marxa		12-10-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 30-4-2011 observem exemplars que estan construint niu. El 29-5-2011 veiem exemplars que agafen fang per fer niu. Durant el pas migratori postnupcial, en general s'ha anotat en quantitats més baixes que als anys anteriors.

Trobat (*Anthus campestris*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes	arribada		11-4-2004				Enguany		arribada		-			
estivals	marxa		27-9-2008						marxa		-			

Nidificació	Anterior	segura	x	probable		possible		no detectat	
	Enguany	segura		probable		possible		no detectat	x
Estimació de parelles nidificants		1 a 10		x	10 a 100			Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		
	conreus i erms			màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		

No observat el 2011. Darreres observacions any 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2010.

Piula dels arbres (*Anthus trivialis*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x				x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		26-3-1999			Enguany			pr. citació		12-4-2011				
	últ. citació		29-4-2010						últ. citació		28-4-2011				
	pr. citació		15-8-2002						pr. citació		4-9-2011				
	últ. citació		18-10-2003						últ. citació		12-10-2011				

S'observa durant els passos migratoris entre les dates assenyalades a la taula.

Titella (*Anthus pratensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x					x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		12-4-2011			Enguany			marxa		12-4-2011		
	arribada		13-9-2005						arribada		8-10-2011		

El 12-2-2011 almenys 30 exemplars entren a ajocar-se des dels conreus cap als boscos de Torrelletes. La citació del 12-4-2011 passa a ser el registre més tardà de les marxes prenupcials recollit al Parc fins ara.

Grasset de muntanya (*Anthus spinoletta*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
			x							x			

No observat el 2011. Darreres observacions any 2008 i 2010.

Grasset de costa (*Anthus petrosus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x											

No observat el 2011. Es disposa de registres de l'any 1998.

Cuereta groga (*Motacilla flava*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x				x	x			
Dates extremes migrants	arribada		22-3-1998			Enguany			arribada		12-4-2011		
	marxa		1-5-2004						marxa		-		
	arribada		5-9-2001						arribada		10-9-2011		
	marxa		25-10-2003						marxa		20-9-2011		

S'observen exemplars en pas migratori prenupcial i postnupcial; el 12-4-2001 als entorns del castell de Penyafort, els dies 10-9-2011 i 13-9-2011 al Turó de les Tres Partions, i el 20-9-2011 al pantà de Foix.

Cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta					

Al mes d'abril 3-4-2011, 12-4-2011 i 16-4-2011) s'observa alguna parella formada i establerta al territori de cria, al riu Foix prop del castell de Penyafort. Fora de l'època reproductora és una espècie més abundant. Entre el 17-9-2011 i el 30-10-2011 s'observen exemplars en pas migratori actiu.

Cuereta blanca (*Motacilla alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars				
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

El 5-5-2011 observem un grup de joves volanders. El 22-5-2011 a la cua de l'embassament, veiem un grup familiar amb dos polls volanders. El 30-7-2011 veiem un poll volander. Entre el 8-10-2011 i el 30-10-2011 s'observen exemplars en pas migratori actiu al Turó de les Tres Partions. Durant l'hivern s'observen agrupacions importants a l'hora d'ajocar-se, per exemple el 30-12-2011 a la cua de l'embassament hi entren més de 50 exemplars.

Merla d'aigua (*Cinclus cinclus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
											x	

No observat el 2011. Es disposa d'un registre del 26-11-2010 (XPCA-ORNITHO.CAT).

Cargolet (*Troglodytes troglodytes*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				x	pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 28-6-2001 es veu un poll volander a la font d'Horta.

Pardal de bardissa (*Prunella modularis*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x							x	x	x
Dates extremes	marxa		28-3-2003			Enguany		marxa		13-3-2011		
	arribada		8-10-2005					arribada		8-10-2011		

Destaquem l'observació del 8-10-2011 en què al Turó de les Tres Partions es detecten els primers exemplars migrants postnupcials. Des d'aleshores i fins el 30-10-2011 en aquest mateix indret s'hi anoten exemplars en pas actiu.

Pit-roig (*Erithacus rubecula*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars				x	
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		augmenta		x				

El 30-7-2011 veiem un poll volander.

Rossinyol (*Luscinia megarhynchos*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x	x		
Dates extremes	arribada		2-4-2010			Enguany		arribada		12-4-2011		
	marxa		1-10-1999					marxa		6-9-2011		

Nidificació	Anterior	segura	x	probable		possible		no detectat	
	Enguany	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants		1 a 10			10 a 100			Més de 100	x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		x
	conreus i erms		x	màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		x
Tendència poblacional nidificant		disminueix			estable		x	augmenta	

El 8-7-2011 s'observa un adult que porta becada i en un altre indret hi ha un poll volander.

Cotxa blava (*Luscinia svecica*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x					x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		12-3-1998			Enguany			pr. citació		-				
	últ. citació		15-3-1998						últ. citació		-				
	pr. citació		28-8-05 (JGGF)						pr. citació		6-10-2011				
	últ. citació		31-10-1998						últ. citació		11-10-2011				

És una espècie difícil de detectar, ja que s'amaga molt entre la vegetació. Ha estat observada durant el període de pas postnupcial, els dies 6-10-2011 i 11-10-2011 a la cua de l'embassament.

Cotxa fumada (*Phoenicurus ochrurus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x		x		x		x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles			x		pinedes i alzinars			
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

A l'època reproductora sols s'observa de forma molt localitzada i puntual, ja que al Parc del Foix hi crien poquíssimes parelles. A l'hivern és un ocell molt comú. L'arribada dels primers hivernants i el pas d'exemplars migrants és un fenomen de certa rellevància, que enguany al Turó de les Tres Partions s'ha detectat entre els dies 3-10-2011 i 7-11-2011. En destaquem el 30-10-2011, en aquest indret es va anotar el pas de 121 exemplars en 3 hores.

Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		25-3-2010			Enguany			pr. citació		26-3-2011				
	últ. citació		14-5-2002						últ. citació		3-4-2011				
	pr. citació		14-8-2010						pr. citació		27-9-2011				
	últ. citació		23-10-2004						últ. citació		3-10-2011				

Ha estat observat durant els dos períodes migratoris, el prenupcial i el postnupcial, amb les dates extremes que s'anoten a la taula.

Bitxac rogenic (*Saxicola rubetra*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x				x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació		16-4-2002			Enguany			pr. citació		-				
	últ. citació		7-5-2000						últ. citació		-				
	pr. citació		6-9-2011						pr. citació		6-9-2011				
	últ. citació		8-10-73 (PMRA)						últ. citació		-				

La citació del 6-9-2011 a l'embassament del Foix, avança el registre més primerenc per al pas postnupcial de l'espècie al Parc del Foix.

Bitxac comú (*Saxicola torquatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			

Nidificació	Anterior	segura	x	probable		possible		no detectat	
	Enguany	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes		x	rupícoles		x	pinedes i alzinars		
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant	disminueix			estable		x	augmenta		

S'ha observat en zones rocoses amb una densitat baixa, però considerem que manté les poblacions del Parc estables.

Merla de pit blanc (*Turdus torquatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
									x	x		x	
Dates extremes migrants	pr. citació	-				Enguany			pr. citació	-			
	últ. citació	-							últ. citació	-			
	pr. citació	26-9-2010							pr. citació	1-10-2011			
	últ. citació	3-11-2008							últ. citació	20-10-2011			

S'ha observat els dies 1-10-2011, 13-10-2011 i 20-10-2011 des del Turó de les Tres Partions, el primer dia 2 exemplars i els altres dies un exemplar. En alguna ocasió es veuen els exemplars en vol migratori, en d'altres es tracta de migrants que s'aturen a les muntanyes del Parc a reposar.

Merla (*Turdus merula*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x		
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 22-5-2011 trobem una merla atropellada a la carretera de l'Arboç. El 29-5-2011 veiem un grup familiar amb polls volanders. El 5-6-2011 trobem una merla atropellada. El 5-6-2011 veiem un exemplar amb becada a la cua de l'embassament. El 19-6-2011 prop de Sant Esteve anotem un poll volander. El 20-6-2011 al fondo de l'Alzina, s'escolten veus de polls volanders. El 8-7-2011 s'observa un poll volander.

Griva cerdana (*Turdus pilaris*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x										x	x		

Destaquem l'observació d'un exemplar el 12-2-2011 als entorns de la zona de mas Pigot.

Tord comú (*Turdus philomelos*)

Tota col·la (Parus phenomeros)														
Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable				augmenta		x

El 29-5-2011 veiem un grup familiar amb polls volanders als boscos de la Timba. A la tardor, des del Turó de les Tres Partions s'anota pas de migrants entre el 12-10-2011 i el 30-10-2011.

Tord ala-roig (*Turdus iliacus*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			x	de pas			x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
	x	x	x							x	x	x					
Dates extremes hivernants	marxa		19-3-2011			Enguany			marxa		19-3-2011						
	arribada		1-10-2011						arribada		1-10-2011						

Ambdues dates extremes, la de les marxes dels hivernants i la de les arribades postnupcials, han eixamplat el període d'observació respecte els registres que teníem fins ara al Parc. Va ser més abundant a principis d'any que no pas a finals.

Griva (*Turdus viscivorus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100					
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x					
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			x				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			x	augmenta					

El 29-5-2011, a la Timba, veiem un exemplar que porta becada. Des del Turó de les Tres Partions el 10-9-2011 s'observen 2 exemplars en migració activa, el 1-10-2011 un migrant, el 22-10-2011 veiem 5 migrants i el 30-10-2011 en passen 15.

Rossinyol bord (*Cettia cetti*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

Durant tot l'any s'observa al riu, embassament i en d'altres zones amb aigua.

Trist (*Cisticola juncidis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 30-4-2011 observem una parella d'exemplars que estan construint niu. Destaquem la jornada del 19-6-2011 en què en un recorregut pels entorns de Sant Esteve es localitzen uns 12 territoris.

Boscaler pintat gros (*Locustella naevia*)

Boscals primar gros (Boscals de la riera)														
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x				x	x					

El 30-4-2011 s'anota un exemplar cantant en zona de conreus prop de l'embassament.

Boscaler comú (*Locustella luscinioides*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
					x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		2-5-1999				Enguany		arribada						
	marxa		19-10-1999						marxa						
Nidificació	Anterior		segura				probable		x	possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable			possible			no detectat		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x

No observat el 2011. Darreres observacions any 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Boscarla d'aigua (*Acrocephalus paludicola*)

<i>Boscana d'aigua (Pterocarpatus paludicola)</i>															
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
								x							

No observat el 2011. Darreres observacions any 1998.

Boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
					x			x	x										

El 6-8-2011 s'observa un exemplar en uns canyars a la riba del riu Foix, poc abans de la seva arribada a Castellet.

Boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes		arribada		9-4-2009			Enguany		arribada		19-4-11(MBLA)			
estivals		marxa		4-11-2004					marxa		22-10-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	

Enguany no s'han observat evidències de reproducció segures com les del passat 2010. Tanmateix sí que ha estat present en ambients adequats per a la reproducció i se l'ha vist cantant.

Boscarla menjamosquits (*Acrocephalus palustris*)

<i>Boscana micranthos (Xerocépharus parvulus)</i>															
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
								x							

No observat el 2011. Es disposa de registres de l'any 1999.

Balquer (*Acrocephalus arundinaceus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		10-4-06(MBLA)			Enguany			arribada		19-4-2011	
	marxa		24-9-09(MOVA)						marxa		21-7-2011	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars	
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta	

El 1-7-2011 s'observa un grup familiar. Com en anys anteriors s'han observat entre 2 i 4 territoris amb parelles reproductores.

Bosqueta pàl·lida (*Hippolais opaca*)

Esquema per l'au (Hippoboscidae)															
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
								x							

No observat el 2011. Darreres observacions any 1973 (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Bosqueta vulgar (*Hippolais polyglotta*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		17-4-2010				Enguany		arribada		20-4-2011			
	marxa		24-9-2009						marxa		19-8-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100				x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 19-6-2011 prop de Sant Esteve anotem un adult amb becada. El 1-7-2011 i el 1-8-2011 s'observa un grup familiar.

Tallarol de casquet (*Sylvia atricapilla*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			x		

El 19-6-2011 prop de Sant Esteve anotem un adult amb becada. Entre el 3-10-2011 i el 30-10-2011 s'observen exemplars en migració activa des del Turó de les Tres Partions.

Tallarol gros (*Sylvia borin*)

Fenologia	sedentari		estival			?	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
				x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		18-4-11(MBLA)				Enguany		arribada		18-4-11(MBLA)		
	marxa		23-10-2001						marxa		13-10-2011		

Enguany s'ha observat sobretot al pas postnupcial; entre el 6-9-2011 al pantà i el 13-10-2011 al Turó de les Tres Partions. Destaquem l'anellament de 7 exemplars el 18-4-2011(MBLA) prop de l'embassament, aquesta data passa a ser el registre més primerenc del pas prenupcial.

Tallarol emmascarat (*Sylvia hortensis*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x		x		x			x				

S'anota un exemplar cantant el 17-5-2011 prop de l'embassament. També en informen d'una citació del 6-10-2011 (MPMB) d'un exemplar al Turó de les Tres Partions.

Tallareta vulgar (*Sylvia communis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x			x	x	x		
Dates extremes migrants	pr. citació	17-4-2004				Enguany	pr. citació	-				
	últ. citació	12-5-1999					últ. citació	-				
	pr. citació	22-8-2000					pr. citació	-				
	últ. citació	12-10-1998					últ. citació	-				

No observat el 2011. Darrera observació any 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2009 i 2010.

Tallareta cuallarga (*Sylvia undata*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x				
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta					

El 25-4-2011 s'observa un exemplar amb becada a la Plana Morta.

Tallarol de garriga (*Sylvia cantillans*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant						
Mesos observació	I		II		III		IV	V		VI		VII	VIII		IX	X	XI		XII		
				x		x		x		x				x		x	x				
Dates extremes estivals		arribada		29-3-2003					Enguany			arribada		12-4-2011							
		marxa		9-10-2001								marxa		8-10-2011							
Nidificació		Anterior			segura			x	probable			possible			no detectat						
		Enguany			segura				probable			possible			no detectat			x			
Estimació de parelles nidificants						1 a 10			x		10 a 100					Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles							pinedes i alzinars					x	
		conreus i erms						màquies i garrigues					x		z. humides/bosc ribera						

La nidificació excepcional detectada el passat 2010, enguany no s'ha observat. En tot cas, la densitat de parelles reproductores seria molt baixa.

Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*)

Fenologia	sedentari		x	estival		hivernant		de pas		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x		
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

El 6-8-2011 s'observa un exemplar amb becada. El 29-11-2011 trobem un exemplar atropellat a prop del poble de Castellet.

Mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		23-3-2006			Enguany		arribada		1-4-2011			
	marxa		11-9-2003					marxa		10-9-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars				x
	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 28-6-2011 a prop de cal Bladet, una parella marca territori insistentment (possiblement tenien polls al niu). El 24-7-2011 s'observen joves i adults en un grup familiar.

Mosquiter xiulaire (*Phylloscopus sibilatrix*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x				x				

El 15-4-2011 prop de l'embassament s'observen dos exemplars, un dels quals a més canta. El 18-4-2011 (MBLA) s'anelles 2 exemplars prop de l'embassament.

Mosquiter ibèric (*Phylloscopus ibericus*)

Mosquiter ibèr (F) <i>Moscopus ibereus</i>																			
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
			x		x														

No observat el 2011. Darrera observació any 2009 i 2010.

Mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*)

Mosquer comú (<i>Phrynoscopus collybita</i>)														
Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior			segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany			segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix		estable		x	augmenta				

S'ha observat durant tot l'any. Entre el 3-10-2011 i el 30-10-2011 s'observen exemplars en migració activa.

Mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*)

Mosquer de passa (<i>Nyctoscopus aeneus</i>)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x		x	x	x	x		
Dates extremes		pr. citació		25-3-2010			Enguany		pr. citació		1-4-2011	
migrants		últ. citació		12-5-2003					últ. citació		28-4-2011	

	pr. citació	28-7-2007		pr. citació	19-8-2011
	últ. citació	15-10-2000		últ. citació	2-10-2011

Ha estat observat durant els dos períodes migratoris, el prenupcial i el postnupcial, amb les dates extremes que s'anoten a la taula.

Reietó (*Regulus regulus*)

Fenologia	sedentari	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes	marxa	25-3-2004				Enguany			marxa		13-7-2011		
hivernants	arribada	20-10-1998							arribada		-		

Es tracta d'una espècie hivernant que d'un hivern a l'altre mostra fluctuacions més o menys acusades; aquest 2011 ha estat molt abundant a primers d'any, en canvi els darrers mesos del 2011 no s'ha vist.

Bruel (*Regulus ignicapillus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 22-5-2011 observem un grup familiar, en què un adult alimenta polls volanders. El 22-6-2011 se n'observa un altre. El 9-7-2011 s'observa un grup familiar amb 2 polls volanders. Entre el 17-9-2011 i el 30-10-2011 s'observen alguns exemplars migrants.

Papamosques gris (*Muscicapa striata*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant			de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
				x	x	x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		9-4-2000			Enguany			arribada		28-4-2011					
	marxa		8-10-1999						marxa		6-9-2011					
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x	augmenta				

El 20-6-2011 al fondo de l'Alzina s'observa un grup familiar, amb dos adults i dos polls volanders. El 6-8-2011 s'observa un altre grup familiar.

Mastegatxes (*Ficedula hypoleuca*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	pr. citació	30-3-2010				Enguany			pr. citació		15-4-2011				
	últ. citació	13-5-2001							últ. citació		20-4-2011				
	pr. citació	4-8-2009							pr. citació		19-8-2011				
	últ. citació	9-10-1998							últ. citació		26-9-2011				

Ha estat observat durant els dos períodes migratoris, el prenupcial i el postnupcial, amb les dates extremes que s'anoten a la taula.

Mallerenga cuallarga (*Aegithalos caudatus*)

Fenologia	sedentari	x		estival			hivernant	x		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Anterior			segura	x		probable			possible			no detectat	
	Enguany			segura	x		probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes							rupícoles			pinedes i alzinars			x
de cria	conreus i erms							màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			x

Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	
----------------------------------	------------	--	---------	---	----------	--

El 17-3-2011 s'observen les baralles territorials de dues parelles. El 5-5-2011 veiem un grup d'uns 10 polls sortits recentment del niu.

Mallerenga emplomallada (*Parus cristatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x
		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 18-5-2011 a la caseta d'en Segura veiem un grup de polls volanders peixats pels pares. El 1-8-2011 s'observa un grup familiar.

Mallerenga petita (*Parus ater*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta		x		

El 24-7-2011 s'observa un grup familiar. La tendència poblacional de nidificants segueix en lleuger augment.

Mallerenga blava (*Parus caeruleus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x	augmenta			

El 29-5-2011 veiem un grup familiar amb polls volanders. El 8-6-2011 s'observen polls volanders alimentats pels adults. El 24-7-2011 s'observa un grup familiar.

Mallerenga carbonera (*Parus major*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				x
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable			x		augmenta		

El 18-5-2011 al fondo de l'Alzina trobem restes de plomes d'un exemplar jove depredat per un carnívor. El 19-6-2011 prop de Sant Esteve anotem un grup familiar. El 24-7-2011 s'observa un exemplar jove que fa poc ha sortit del niu. El 30-7-2011 veiem un grup familiar.

Pela-roques (*Tichodroma muraria*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
	x	x																	

No observat el 2011. Es disposa de registres de l'any 2004 (SSAA, VPRA).

Raspinell (*Certhia brachydactyla*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional		nidificant			disminueix		estable		x	augmenta			

El 18-5-2011 observem un grup familiar a la Marina. El 30-7-2011 veiem un grup familiar. El 6-8-2011 s'observa un grup familiar.

Teixidor (*Remiz pendulinus*)

Fenologia	sedentari		estival			?	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		
Dates extremes	marxa		4-4-2007			Enguany			marxa		17-3-2011			
hivernants	arribada		26-8-2008						arribada		6-10-2011			

Ha estat observat a l'hivern, amb les dates extremes del 17-3-2011 i el 6-10-2011, sempre a la cua de l'embassament.

Oriol (*oriolus oriolus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes	arribada		16-4-2006				Enguany		arribada		28-4-2011			
	marxa		11-9-2004						marxa		6-9-2011			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat				
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				pinedes i alzinars				x
	conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 8-7-2011 s'observa un grup familiar amb 3 polls volanders. El 6-8-2011 s'observa un grup familiar. El 12-8-2011 s'observa un grup familiar.

Botxí (*Lanius meridionalis*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I		II	III		IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII
	x		x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
Nidificació	Anterior			segura			x	probable			possible			no detectat	
	Enguany			segura			x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				x		10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars	
de cria		conreus i erms				x		màquies i garrigues				x		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				x		estable				augmenta	

El 19-6-2011 observem un juvenil a Puigverdí. El 12-10-2011 des del Turó de les Tres Partions s'observa un exemplar que durant més d'una hora emet reclams insistentment.

Capsigrany (*Lanius senator*)

Capgrany (Lluís Senador)																											
Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant												
Mesos observació			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		
									x		x		x		x		x										
Dates extremes		arribada		6-4-2011						Enguany				arribada		6-4-2011											
		marxa		28-8-2002										marxa		12-8-2011											
Nidificació		Anterior				segura				x	probable				possible				no detectat								
		Enguany				segura				x	probable				possible				no detectat								
Estimació de parelles nidificants						1 a 10										10 a 100				x		Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes								rupícoles								pinedes i alzinars									
		conreus i erms						x		màquies i garrigues						x		z. humides/bosc ribera									
Tendència poblacional nidificant						disminueix						x		estable								augmenta					

El 29-5-2011 prop dels boscos de la Timba veiem un exemplar amb becada. El 20-6-2011 a la mateixa zona hi ha una parella molt alarmada (possiblement amb polls al niu). El 8-7-2011 s'observa un exemplar amb becada i en un altre indret es veu un grup familiar amb 2 polls volanders. El 12-8-2011 s'observa un grup familiar. La citació del 6-4-2011 avança el registre més primerenc que fins ara teníem al Parc.

Gaig (*Garrulus glandarius*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II		III	IV	V	VI	VII		VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior			segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany			segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

Aquesta és una espècie que es manté ben distribuïda per tot el Parc del Foix.

Garsa (*Pica pica*)

Cursa (1ra-2da)														
Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta			

La garsa és molt abundant a les terres de conreu del Parc. El 17-3-2011 observem una parella amb actituds de festeig al damunt d'un niu.

Gralla de bec vermell (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
												x	

El 7-11-2011 a mig matí es van observar dos exemplars que es desplaçaven per les muntanyes del Parc del Foix. A més, les dues gralles de bec vermell van emetre tot un seguit de crits característics. Possiblement els exemplars van realitzar una fugida de la seva zona de cria a causa de les nevades que hi havia hagut a l'alta muntanya els darrers dies. Aquesta citació és la primera que s'obté per al Parc del Foix. La gralla de bec vermell és un ocell que a Catalunya es distribueix sobretot per la zona dels Pirineus i Prepirineus, a més de disposar de poblacions menors als ports de Beseit, al Baix Camp i en algun punt de la plana de Lleida. En aquestes contrades es reproduïx a les grans cingleres, a l'entrada de coves o bé en alguns edificis abandonats. És una espècie fonamentalment sedentària, és a dir que no realitza migracions, tanmateix de forma ocasional pot realitzar moviments per fugir de canvis sobtats del temps.

Gralla (*Corvus monedula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x			x	x		x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles			x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			

El 5-6-2011 s'observa un mínim de dues parelles intervenint en una zona de nidificació. La gralla, que des del 2001 havia desaparegut com a espècie nidificant al Parc del Foix, aquest 2011 hi ha tornat a recuperar la seva presència. Fa una quarantena d'anys era una espècie habitual i nombrosa, tant al Parc del Foix com al Penedès en general. Darrerament, però, havia sofert un procés progressiu que la va portar a la seva pràctica extinció en aquestes comarques. El 25-9-2011 s'observen 2 exemplars prop de les Masuques.

Corb (*Corvus corax*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior			segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany			segura			probable		x	possible			no detectat	

Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles	x	pinedes i alzinars	
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix	x	estable		augmenta	

El 6-3-2011 s'observa un exemplar prop de les Boveres. El 18-5-2011 s'observen un mínim de 2 exemplars en vol per diferents zones del pantà. El 1-9-2011, el 13-9-2011, el 19-9-2011 i el 28-9-2011 es veuen un o dos exemplars en vol per la zona del Turó de les Tres Partions. El 15-12-2011 s'observen 3 exemplars prop de les Boveres.

Estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

S'han anat observant al llarg de tot l'any. A l'hivern n'arriben molts del nord i formen estols grans.

Estornell negre (*Sturnus unicolor*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 10-6-2011 veiem agrupacions d'estornells negres amb polls volanders que van acompanyats dels adults.

Pardal comú (*Passer domesticus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable				augmenta				

El 20-4-2011 uns 5 o 6 mascles en zel empaiten una femella. El 27-5-2011 veiem un exemplar construïnt niu a Castellet.

Pardal xarrec (*Passer montanus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior		segura	x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura	x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants			1 a 10		10 a 100	x	Més de 100					
Hàbitats preferents	zones urbanes	x	rupícoles		pinedes i alzinars							
de cria	conreus i erms	x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera							
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta							

El 1-8-2011 s'observen exemplars joves que han sortit del niu recentment.

Pardal roquer (*Petronia petronia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Anterior	segura		x	probable		possible			no detectat		
	Enguany	segura		x	probable		possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants	1 a 10		10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		x	pinedes i alzinars	
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable		x	augmenta	

El 17-3-2011 en una zona agrícola propera a la Ràpita hi observem un grupet de 28 exemplars. A diverses pedreres s'hi segueixen observant com a nidificants, per exemple el 5-6-2011 a Clariana.

Pinsà comú (*Fringilla coelebs*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Dates extremes	marxa		7-4-2010		Enguany		marxa		19-3-2011			
hivernants	arribada		10-8-2007				arribada		5-10-2011			

El 12-2-2011 almenys 250 exemplars entren a ajocar-se des dels conreus cap als boscos de Torrelletes, el 27-12-2011 un mínim de 200 al mateix lloc. A partir del 5-10-2011 s'anota l'arribada i el pas d'exemplars hivernants. Destaquem l'observació del 30-10-2011, des del Turó de les Tres Partions; en 3 hores es conten 430 exemplars que travessen el coll d'aquest cim en estols més aviat petits.

Pinsà mec (*Fringilla montifringilla*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x									x	x	x

No observat el 2011. Darrera observació any 2004, 2005 i 2008.

Gafarró (*Serinus serinus*)

Fenologia	sedentari		x	estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars			x		
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 25-4-2011 s'observa un exemplar que alimenta polls volanders. El 27-5-2011 observem un grup de polls volanders. El 8-7-2011 s'observen diversos grups familiars.

Verdum (*Carduelis chloris*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars			x		
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 7-4-2011 i el 12-4-2011 veiem alguna parella en zel. El 9-7-2011 s'observa un grup familiar amb 3 polls volanders.

Cadenera (*Carduelis carduelis*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars			x		
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta					

El 27-5-2011 hi ha una parella que construeix niu al Fondo de l'Alzina. El 5-6-2011 observem un grupet de joves. El 8-7-2011 s'observen diversos grups familiars. El 24-7-2011 s'observa un grup familiar. El 1-8-2011 i el 12-8-2011 s'observen exemplars joves que han sortit del niu recentment.

Lluer (*Carduelis spinus*)

Fenologia													
sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		x	x	x							x	x	x
Dates extremes		marxa		28-3-2008				Enguany		marxa		4-2-2011	
hivernants		arribada		1-10-2005						arribada		19-10-2011	

Entre el 19-10-2011 i el 7-11-2011 s'anoten exemplars en pas migratori des del Turó de les Tres Partions.

Passerell (*Carduelis cannabina*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable		x	augmenta			

El 5-6-2011, prop de la pedrera de Clarianacal, veiem un grup familiar format per 6 exemplars. El 8-7-2011 s'observa un grup familiar. A l'octubre anotem el pas de migrants pel Turó de les Tres Partions.

Trencapinyes (*Loxia curvirostra*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x			x	x	x		x	x	

No observat el 2011. Darreres observacions any 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 i 2010.

Pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x				x							x	x		

No observat el 2011. Darreres observacions any 2004, 2005, 2008 i 2010.

Durbec (*Coccothraustes coccothraustes*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x						x	x	x	
Dates extremes	marxa		1-4-2006			Enguany			marxa		22-2-2011		
hivernants	arribada		15-10-2005						arribada		22-10-2011		

El 22-2-2011 s'observa el darrer hivernant als entorns de Castellet. El 22-10-2011 passen 3 exemplars migrant pel Turó de les Tres Partions. El 30-10-2011 al Turó de les Tres Partions, passen dos grups en migració, un de 15 exemplars i l'altre de 4. El 12-11-2011 s'observa un exemplar al bosc de ribera del castell de Penyafort. Els dies 13-11-2011, 21-11-2011 i 20-12-2011 s'observa un exemplar al bosc de ribera del riu Foix prop de Castellet.

Sit blanc (*Plectrophenax nivalis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x												

No observat el 2011. Es disposa d'un registre del 15-1-2004.

Verderola (*Emberiza citrinella*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x		x							x			x	

Tenim notícia de l'observació de 5 exemplars el 30-10-2011 (APSA-ORNITHO.CAT) prop de Torrelletes.

Gratapalles (*Emberiza cirulus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable			possible			no detectat			
	Enguany	segura			x	probable			possible			no detectat			

Estimació de parelles nidificants		1 a 10			10 a 100	x	Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles				pinedes i alzinars	
	conreus i erms	x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant		disminueix			estable	x	augmenta	

El 6-8-2011 s'observa un grup familiar. El 19-11-2011 observem un mínim de 14 exemplars que entren a ajocar-se a un pi per la zona de Clariana. Durant el pas migratori de tardor s'observen exemplars en pas actiu el 30-10-2011 al Turó de les Tres Partions. El 30-12-2011 (MBLA) s'anellen 21 exemplars.

Sit negre (*Emberiza cia*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x		x					x	x	x		
Nidificació	Anterior		segura			probable		x	possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				

Al Turó de les Tres Partions s'hi observen migrants entre els dies 26-10-2011 i 7-11-2011.

Hortolà (*Emberiza hortulana*)

Fenologia	sedentari				estival		?	hivernant				de pas		x	divagant							
Mesos observació	I		II		III		IV	V		VI		VII		VIII		IX	X		XI		XII	
								x								x						
Nidificació		Anterior				segura				probable		x	possible				no detectat					
		Enguany				segura				probable			possible				no detectat				x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars								
		conreus i erms						màquies i garrigues				x		z. humides/bosc ribera								

No observat el 2011. Darreres observacions any 2003 i 2010.

Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x							x	x	x
Dates extremes hivernants	marxa		28-3-2005		Enguany		marxa		13-2-2011			
	arribada		14-10-2005				arribada		13-10-2011			

El 13-10-2011 i el 30-10-2011 s'observen exemplars en migració des del Turó de les Tres Partions. Durant l'hivern s'observen agrupacions importants a l'hora d'ajocar-se, de dia en alguns conreus i abans de fosquejar a les joques de la cua de l'embassament.

Cruixidell (*Emberiza calandra*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x				x	x	x			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable					augmenta		

El 23-1-2011, a les joques de la cua de l'embassament hi entren una seixantena de cruixidells. El 4-2-2011 surten almenys uns 20 exemplars de la joca al pantà. El 3-4-2011 observem 4 exemplars en terrenys agrícoles propers al Castell de Penyafort. El 30-12-2011 a la cua de l'embassament hi entren exemplars a ajocar-se.

- Espècies al·lòctones -

Oca del Canadà (*Branta canadensis*)

Cua del Canard (Eutima canadensis)																			
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
				x															

No observat el 2011. Darreres observacions any 2010.

Ànec mut (*Cairina moschata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x	x			

No observat el 2011. Darreres observacions any 2009 i 2010.

Ànec carolí (*Aix sponsa*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x								

No observat el 2011. Darreres observacions any 2002.

Ànec mandarí (*Aix galericulata*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x

No observat el 2011. Darreres observacions any 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.

Ànec domèstic (*Anas peking* / *Anas platyrhynchos* var. *domestica*)

Fenologia (Migracions i fases d'evolució dels papallons domesticats)																				
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

Diverses observacions a l'embassament els mesos de novembre i desembre, d'un exemplar que possiblement hi ha estat alliberat.

Periquito (*Melopsittacus undulatus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x								

No observat el 2011. Darreres observacions any 2005 i 2007.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x		x		

No observat el 2011. Darreres observacions any 2001 i 2005.

Cotorra de pit gris (*Myiopsitta monachus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x			x				

El 12-8-2011 s'observen 3 exemplars prop de la Ràpita.

Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
						x		x					

No observat el 2011. Darreres observacions any 2005.

Lloro de la Patagònia (*Cyanoliseus patagonus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
							x													

No observat el 2011. Darreres observacions any 2001.

Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves (*Lamprotornis chalybaeus*)

Estat del metal·lic grans i grans claus (Estat del metal·lic grans i grans claus)																				
Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
																				x

No observat el 2011. Darreres observacions any 2004.

Teixidor social (*Ploceus cucullatus*)

Fenologia social (x i socas sacantats)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2011. Darreres observacions any 2004.

Bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		exo	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
						x	x	x	x	x	x	

El 21-7-2011 es veuen 2 exemplars a la cua del pantà. El 31-7-2011 es veuen 6 exemplars a l'entorn de l'observatori d'ocells de la cua de l'embassament. S'escolta un grup, a la depuradora de Castellet, el 19-8-2011. el 6-9-2011 es veuen 2 exemplars prop de l'aiguabarreig entre el Foix i la riera de Marmellar.

Bec de corall cuanegre (*Estrilda troglodytes*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x		x				x	x	

No observat el 2011. Darreres observacions any 2005, 2006, 2007 i 2009.

Vídua de cua d'agulla (*Vidua macroura*)

Vida de cua d'aigua (Vida macrobenta)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
								x					

No observat el 2011. Darreres observacions any 2007.

Gafarró de front groc (*Serinus mozambicus*)

Cicle de vida (Cormus mesomorf)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2011. Darreres observacions any 2005.

Annex 1 Observació d'altres vertebrats:

Es recull un resum de les citacions del 2011 d'altres vertebrats del Parc del Foix.

PEIXOS

Anguila (*Anguilla anguilla*) – No observat el 2011.

Alburn (*Alburnus alburnus*) – 3-1-2011, 15-4-2011, 19-4-2011, 20-4-2011, 28-4-2011, 5-5-2011, 18-5-2011, 29-5-2011, 6-6-2011, 8-6-2011, 20-6-2011, 22-6-2011, 28-6-2011, 1-7-2011, 8-7-2011, 21-7-2011, 6-8-2011, 12-8-2011, 16-9-2011, 20-9-2011, 6-10-2011, 19-10-2011, 2-11-2011, 21-11-2011, 6-12-2011.

Barb comú (*Barbus graellsii*) – No observat el 2011.

Barb cua-roig (*Barbus haasi*) – No observat el 2011.

Carpí vermell (*Carassius auratus*) – 17-7-2011.

Madrilleta roja (*Chondrostoma arcasii*) – 6-4-2011, 30-7-2011, 14-9-2011.

Carpa (*Cyprinus carpio*) – 15-4-2011, 28-4-2011, 5-5-2011, 18-5-2011, 22-5-2011, 29-5-2011, 6-6-2011, 8-6-2011, 10-6-2011, 20-6-2011, 22-6-2011, 1-7-2011, 21-7-2011, 1-8-2011, 12-8-2011, 19-8-2011, 6-9-2011, 16-9-2011, 20-9-2011, 19-10-2011, 13-11-2011.

Bagra comuna (*Squalius cephalus*) – No observat el 2011.

Gambúsia (*Gambusia holbrooki*) – 1-4-2011, 20-4-2011, 18-5-2011, 10-6-2011, 20-6-2011, 22-6-2011, 1-7-2011, 8-7-2011, 21-7-2011, 1-8-2011, 12-8-2011, 19-8-2011, 6-9-2011, 16-9-2011, 20-9-2011, 19-10-2011, 21-11-2011, 2-12-2011.

Peix gat (*Ameiurus melas*) – No observat el 2011.

Silur (*Silurus glanis*) – 5-6-2011.

AMFIBIS

Salamandra (*Salamandra salamandra*) – 12-2-2011, 17-3-2011, 19-3-2011, 7-4-2011, 22-4-2011, 22-5-2011, 25-11-2011, 27-12-2011.

Tòtil (*Alytes obstetricans*) – 20-2-2011, 5-5-2011, 25-7-2011.

Gripauet (*Pelodytes punctatus*) – 17-3-2011, 19-3-2011.

Gripau comú (*Bufo bufo*) – 18-1-2011, 13-2-2011, 22-2-2011, 17-3-2011, 28-4-2011, 5-6-2011.

Gripau corredor (*Bufo calamita*) – 17-3-2011, 5-5-2011, 29-5-2011.

Reineta comuna (*Hyla meridionalis*) – 17-3-2011, 7-4-2011, 19-4-2011, 5-5-2011, 22-5-2011, 12-11-2011, 13-11-2011.

Granota verda (*Rana perezi*) – 17-3-2011, 1-4-2011, 6-4-2011, 7-4-2011, 12-4-2011, 15-4-2011, 16-4-2011, 19-4-2011, 20-4-2011, 22-4-2011, 25-4-2011, 28-4-2011, 30-4-2011, 5-5-2011, 17-5-2011, 18-5-2011, 20-5-2011, 22-5-2011, 24-5-2011, 29-5-2011, 6-6-2011, 8-6-2011, 19-6-2011, 20-6-2011, 22-6-2011, 28-6-2011, 17-7-2011, 21-7-2011, 24-7-2011, 25-7-2011, 1-8-2011, 12-8-2011, 6-9-2011, 2-11-2011.

RÈPTILS

Tortuga mediterrània (*Testudo hermanni*) – No observat el 2011.

Tortuga mora (*Testudo graeca*) - No observat el 2011.

Tortuga de rierol (*Mauremys leprosa*) – 1-4-2011, 15-4-2011, 28-4-2011, 18-5-2011, 22-5-2011, 6-6-2011, 1-7-2011, 8-7-2011, 9-7-2011, 31-7-2011.

Tortuga d'estany (*Emys orbicularis*) – No observat el 2011.

Tortuga d'aigua americana (Tortuga de temples roges) (*Trachemys scripta elegans*) – 13-2-2011, 22-2-2011, 8-3-2011, 1-4-2011, 15-4-2011, 16-4-2011, 20-4-2011, 28-4-2011, 5-5-2011, 18-5-2011, 22-5-2011, 24-5-2011, 5-6-2011, 6-6-2011, 8-6-2011, 10-6-2011, 22-6-2011, 28-6-2011, 1-7-2011, 8-7-2011, 21-7-2011, 31-7-2011, 19-8-2011, 6-9-2011, 16-9-2011, 20-9-2011, 6-10-2011, 11-10-2011, 19-10-2011, 2-11-2011.

Tortuga d'aigua americana (Tortuga d'orelles grogues) (*Trachemys scripta scripta*) – 1-4-2011, 28-4-2011, 22-6-2011, 1-7-2011.

Tortuga d'aigua americana (*Trachemys scripta troostii*) – No observat el 2011.

Tortuga d'aigua de Nicaragua (*Trachemys emolli*) – No observat el 2011.

Tortuga comuna de Florida (*Pseudemys floridiana*) – No observat el 2011.

Tortuga tova xinesa (*Pelodiscus sinensis*) – No observat el 2011.

Tortuga mapa ianqui (*Graptemys pseudogeographica*) - No observat el 2011.

Dragó comú (*Tarentola mauritanica*) – 12-2-2011, 6-3-2011, 17-3-2011, 7-4-2011, 16-4-2011, 20-4-2011, 22-4-2011, 28-4-2011, 30-4-2011, 18-5-2011, 22-5-2011, 6-6-2011, 9-6-2011, 19-6-2011, 8-7-2011, 21-7-2011, 25-7-2011, 31-7-2011, 1-8-2011, 6-8-2011, 19-8-2011, 6-9-2011, 20-9-2011, 19-10-2011, 12-11-2011, 6-12-2011.

Dragó rosat (*Hemidactylus turcicus*) – No observat el 2011.

Llargandaix ocel·lat (*Lacerta lepida*) – 27-5-2011, 31-7-2011, 1-8-2011, 3-10-2011, 8-11-2011, 21-11-2011.

Sargantana ibèrica (*Podarcis hispanica*) – 30-4-2011, 30-7-2011.

Sargantaner gros (*Psamodromus algirus*) – 6-3-2011, 28-4-2011, 30-4-2011, 27-5-2011, 29-5-2011, 19-6-2011, 28-6-2011, 5-7-2011, 24-7-2011, 19-8-2011.

Vidriol (*Anguis fragilis*) – 24-5-2011.

Serp de ferradura (*Coluber hippocrepis*) – No observat el 2011.

Serp blanca (*Elaphe scalaris*) – 9-6-2011, 30-7-2011, 14-9-2011.

Serp llisa meridional (*Coronella girondica*) – 13-9-2011.

Serp verda (*Malpolon monspessulanus*) – 20-2-2011.

Serp d'aigua (*Natrix maura*) – 28-4-2011, 18-5-2011, 8-6-2011, 10-6-2011, 1-7-2011, 2-11-2011, 21-11-2011.

Colobra de collar (*Natrix natrix*) – No observat el 2011.

Escurçó ibèric (*Vipera latasti*) - No observat el 2011.

MAMÍFERS

Eriçó clar (*Atelerix algirus*) – No observat el 2011.

Musaranya comuna (*Crocidura russula*) – 6-3-2011, 12-4-2011, 6-12-2011.

Musaranya nana (*Suncus etruscus*) – No observat el 2011.

Ratpenat de ferradura gros (*Rhinolophus ferrumequinum*) – No observat el 2011.

Ratpenat de ferradura petit (*Rhinolophus hipposideros*) – 19-3-2011, 25-7-2011.

Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*) - 14-9-2011, 16-9-2011.

Ratpenat d'Escalera (*Myotis escaleraei*) – 6-4-2011, 22-4-2011, 30-7-2011.

Ratpenat de musell llarg (*Myotis myotis*) – No observat el 2011.

Ratpenat d'aigua (*Myotis daubentonii*) – No observat el 2011.

Ratpenat de peus grossos (*Myotis capaccinii*) – No observat el 2011.

Ratpenat noctül petit (*Nyctalus leisleri*) – No observat el 2011.

Ratpenat comú (*Pipistrellus pipistrellus*) – 22-4-2011, 16-9-2011.

Ratpenat soprano (*Pipistrellus pygmaeus*) – 23-1-2011, 1-4-2011, 20-4-2011, 29-5-2011, 1-8-2011, 14-9-2011, 16-9-2011.

Ratpenat de vores clares (*Pipistrellus kuhli*) – 22-4-2011, 25-7-2011, 16-9-2011.

Ratpenat muntanyenc (*Hypsugo savii*) – 16-9-2011.

Ratpenat dels graners (*Eptesicus serotinus*) – 25-7-2011, 16-9-2011.

Ratpenat orellut meridional (*Plecotus austriacus*) – No observat el 2011.

Ratpenat de cova (*Miniopterus schreibersii*) - No observat el 2011.

Ratpenat de bosc (*Barbastella barbastellus*) - No observat el 2011.

Ratpenat cuallarg (*Tadarida teniotis*) – No observat el 2011.

Llebre (*Lepus europaeus*) – No observat el 2011.

Llebre ibèrica (*Lepus granatensis*) – 20-4-2011.

Conill (*Oryctolagus cuniculus*) – 12-1-2011, 20-1-2011, 29-1-2011, 4-2-2011, 10-2-2011, 20-2-2011, 1-3-2011, 6-3-2011, 8-3-2011, 12-4-2011, 28-4-2011, 30-4-2011, 12-5-2011, 17-5-2011, 18-5-2011, 20-5-2011, 22-5-2011, 24-5-2011, 27-5-2011, 29-5-2011, 5-6-2011, 9-6-2011, 19-6-2011, 20-6-2011, 28-6-2011, 1-7-2011, 5-7-2011, 8-7-2011, 9-7-2011, 17-7-2011, 21-7-2011, 24-7-2011, 30-7-2011, 6-8-2011, 19-8-2011, 4-9-2011, 16-9-2011, 20-9-2011, 6-10-2011, 19-10-2011, 8-11-2011, 13-11-2011, 19-11-2011, 21-11-2011, 25-11-2011, 6-12-2011, 7-12-2011, 12-12-2011, 15-12-2011, 18-12-2011, 20-12-2011.

Esquirol (*Sciurus vulgaris*) – 12-1-2011, 20-1-2011, 4-2-2011, 10-2-2011, 20-2-2011, 22-2-2011, 6-3-2011, 8-3-2011, 13-3-2011, 17-3-2011, 3-4-2011, 12-4-2011, 16-4-2011, 20-4-2011, 28-4-2011, 18-5-2011, 22-5-2011, 24-5-2011, 27-5-2011, 29-5-2011, 20-6-2011, 22-6-2011, 28-6-2011, 21-7-2011, 24-7-2011, 25-7-2011, 30-7-2011, 19-8-2011, 6-9-2011, 20-9-2011, 6-10-2011, 8-10-2011, 11-10-2011, 19-10-2011, 19-11-2011, 21-11-2011, 25-11-2011, 2-12-2011, 6-12-2011, 7-12-2011, 12-12-2011, 15-12-2011.

Rata cellarda (*Eliomys quercinus*) – 6-12-2011.

Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*) – 16-9-2011, 6-12-2011.

Rata negra (*Rattus rattus*) – 8-7-2011, 30-7-2011.

Rata comuna (*Rattus norvegicus*) – 17-3-2011, 29-11-2011, 19-12-2011.

Ratolí domèstic (*Mus musculus*) – 6-12-2011.

Ratolí mediterrani (*Mus spretus*) – 6-12-2011.

Rata d'aigua (*Arvicola sapidus*) – No observat el 2011.

Talpó comú (*Microtus duodecimcostatus*) – 3-1-2011, 12-1-2011, 20-1-2011, 23-1-2011, 4-2-2011, 22-2-2011, 17-3-2011, 3-4-2011, 28-4-2011, 29-5-2011, 5-6-2011, 20-6-2011, 8-7-2011, 24-7-2011, 20-9-2011, 12-11-2011, 13-11-2011, 2-12-2011, 6-12-2011, 7-12-2011, 18-12-2011.

Senglar (*Sus scrofa*) – 3-1-2011, 12-1-2011, 20-1-2011, 23-1-2011, 29-1-2011, 4-2-2011, 10-2-2011, 13-2-2011, 22-2-2011, 6-3-2011, 13-3-2011, 17-3-2011, 19-3-2011, 3-4-2011, 6-4-2011, 25-4-2011, 28-4-2011, 12-5-2011, 22-5-2011, 29-5-2011, 5-6-2011, 9-6-2011, 19-6-2011, 20-6-2011, 28-6-2011, 21-7-2011, 24-7-2011, 30-7-2011, 6-8-2011, 6-9-2011, 20-9-2011, 6-10-2011, 2-11-2011, 13-11-2011, 21-11-2011, 25-11-2011, 6-12-2011, 7-12-2011, 12-12-2011, 15-12-2011, 19-12-2011, 20-12-2011.

Guineu (*Vulpes vulpes*) – 12-1-2011, 20-1-2011, 10-2-2011, 12-2-2011, 20-2-2011, 6-3-2011, 19-3-2011, 25-4-2011, 17-5-2011, 22-5-2011, 24-5-2011, 27-5-2011, 29-5-2011, 9-6-2011, 19-6-2011, 1-7-2011, 8-7-2011, 21-7-2011, 30-7-2011, 6-8-2011, 4-9-2011, 17-9-2011, 20-9-2011, 6-10-2011, 13-11-2011, 25-11-2011, 29-11-2011, 6-12-2011, 7-12-2011, 12-12-2011, 15-12-2011.

Mostela (*Mustela nivalis*) – No observat el 2011.

Fura (*Mustela putorius*) - No observat el 2011.

Visó americà (*Mustela vison*) – No observat el 2011.

Fagina (*Martes foina*) – 10-2-2011, 6-3-2011, 19-3-2011, 30-4-2011, 12-5-2011, 22-5-2011, 27-5-2011, 24-7-2011, 30-7-2011, 6-12-2011.

Llúdriga (*Lutra lutra*) - No observat el 2011.

Toixó (*Meles meles*) – 12-1-2011, 20-1-2011, 10-2-2011, 22-2-2011, 1-3-2011, 8-3-2011, 13-3-2011, 17-3-2011, 19-3-2011, 16-4-2011, 25-4-2011, 18-5-2011, 5-6-2011, 9-6-2011, 28-6-2011, 8-7-2011, 30-7-2011, 6-8-2011, 19-8-2011, 20-9-2011, 2-11-2011, 13-11-2011, 25-11-2011, 2-12-2011, 6-12-2011, 12-12-2011, 15-12-2011, 18-12-2011, 19-12-2011, 20-12-2011.

Gat mesquer (*Genetta genetta*) – 20-2-2011, 6-3-2011, 19-3-2011, 9-6-2011, 30-7-2011, 6-12-2011.