

PARC DEL FOIX

MEMÒRIA ORNITOLÒGICA DEL 2004

Recull de dades i textos a càrrec
d'Humbert Salvadó, Cisco Guasch i Xavier Bayer.



sumari

Sortides realitzades durant l'any
Nivell de les aigües a l'embassament
Meteorologia
Acció de l'home sobre el medi
Seguiment de les migracions d'aus rapinyaires i celebració del dia internacional de les aus
El programa PERNIS
El cens d'ocells hivernants
El programa SOCC
La campanya d'anellament 2004
Els ocells del Parc del Foix el 2004

Annexes

- Annex 1 - Taula comprimida amb les observacions del 2004
- Annex 2 - Taula amb els totals, percentatges, ... de les observacions del 2004
- Annex 3 – Memòria d'anellament al Parc del Foix 2004
- Annex 4 - Migració postnupcial de rapinyaires
- Annex 5 - La participació al programa PERNIS (còpies fitxes PERNIS)
- Annex 6 – La participació al SOCC (còpies fitxes SOCC)
- Annex 7 – Fitxes d'anàlisi d'egagròpiles
- Annex 8 - Observacions d'altres vertebrats
- Annex 9 - Mortalitat d'aus i altres animals a la carretera
- Annex 10 - Recull de premsa del 2004



* Sortides realitzades durant l'any

Durant l'any 2004 hem fet un total de 111 sortides al Parc del Foix que han suposat un total de 351 hores i 40 minuts:

gener	5 sortides	1er. trimestre	21 sortides
febrer	8 sortides		
març	8 sortides		
abril	7 sortides	2on. trimestre	24 sortides
maig	11 sortides		
juny	6 sortides		
juliol	8 sortides	3er. trimestre	32 sortides
agost	8 sortides		
setembre	16 sortides		
octubre	19 sortides	4rt. trimestre	34 sortides
novembre	7 sortides		
desembre	8 sortides		


1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt. trimestre	TOTAL
79 h. 30 min.	85 h. 20 min.	103h.	86 h. 05 min.	353 h. 55 min.

A continuació es detalla en un planell del Parc del Foix el terreny trepitjat per fer el seguiment ornitològic durant els mesos d'abril, maig, juny i juliol (època de nidificació) i en un segon planell el terreny trepitjat la resta de l'any.



* Nivell de les aigües a l'embassament

Al llarg de gairebé tot l'any s'ha mantingut un nivell molt alt a l'embassament. Tan sols hi ha hagut petites fluctuacions que l'han fet baixar molt poc. Aquest any ha estat el més estable i alt des del 1997. Per altra banda en diverses ocasions hi ha hagut riudes fruit de pluges abundoses a la conca del riu Foix o de la riera de Marmellar.



* Meteorologia

L'any 2004 en general no ha estat gaire fred, el termòmetre ha baixat per sota els zero graus en dies comptats de primers de març i al desembre, en tots els casos molt poc i amb la sortida del sol les temperatures s'han recuperat. L'estiu tampoc ha estat excessivament calorós, s'han superat els 30 graus puntualment entre juny i setembre. A nivell de pluges els mesos de febrer, març i abril van ser força plujosos. Les quantitats d'aigua que ja havien caigut a la tardor anterior més la d'aquests tres mesos han fet que al llarg de tot l'any no es pugui parlar de sequera. Malgrat això l'any 2004 ha plogut poc, i a banda dels tres mesos abans esmentats sols al setembre ha plogut amb abundància. La quantitat de pluja recollida al llarg de tot l'any a l'observatori de Casa Riera (les Masuques) ha estat de 394 l/m². A les capitals de comarca més properes s'han recollit: Vilafranca 513 l/m², Vilanova 451 l/m², i el Vendrell 647 l/m².

Gràfic temperatures màximes i mínimes anuals
Gràfic pluges mensuals

* Acció de l'home sobre el medi

Des de la posta en marxa del Parc del Foix s'han produït moltes millores des d'una òptica de conservació i protecció de la natura. També s'ha treballat molt per tal d'informar i conscienciar al públic que visita l'espai natural.

En els nostres quaderns de camp han quedat anotades algunes accions irregulars per a les quals en un futur cal preveure solucions, o millor encara, mirar si es poden prevenir.

4-1-2004 - Hi ha moltes motos i caçadors.

7-1-2004 – A un camí entre Castellet i Torrelletes hi ha un cotxe aparcats amb una persona que es punxa.

1-2-2004 – Un quad fa el “boig” pels camins.

9-4-2004 – Fa uns dies han cremat l'observatori d'ocells.

9-4-2004 – Hi ha gent acampada al fondo de l'Alzina.

10-6-2004 – Hi ha un cotxe robat o abandonat al fondo de mas Carlús.

9-8-2004 – trobem 2 caixes de cartó que contenen animals que han estat alliberats al riu Foix.

9-8-2004 – Hi ha un mínim de 38 anguilles mortes a la caseta de registres del riu Foix, just on comença l'embassament.

11-9-2004 – Passen quads i motos pel turó de les Tres Partions.

3-10-2004 - Passen quads i motos pel turó de les Tres Partions, un cotxe es salta pel costat la cadena que regula l'accés al turó de les Tres Partions.

9-10-2004 – Un quad es salta una cadena i va pels camins del Parc. En anar-lo a avisar un guarda, fa una maniobra, gira i s'esfuma per on ha vingut.

* Seguiment de les migracions d'aus rapinyaires i celebració del dia internacional de les aus

Aquest ha estat el setè any que es realitzava la "Campanya de seguiment de migracions d'aus rapinyaires al Penedès, tardor-2004". Com sempre, la celebració del dia internacional de les aus va ser un èxit. L'assistència de públic va ser molt nombrosa, des de mainada fins a gent gran. Es va alliberar un astor.

A més de la gent que ve expressament a les jornades d'observació, a vegades algun grup de ciclistes que passa per allà s'interessa per l'activitat. Enguany per la diada de l'onze de setembre hi va haver una cinquantena de persones de Canyelles que van pujar a penjar la senyera al cim del Puig de l'Àliga, alguns es van interessar per l'observació de rapinyaires. Entre el públic assistent a alguna de les tres activitats hi va haver gent de Canyelles, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Banyeres del Penedès, l'Arboç, El Vendrell, Barcelona i fins i tot d'Israel. En concret una família d'aquest país, el pare de la qual era el director dels parcs naturals del nord d'Israel, estaven de viatge per Catalunya.

El balanç de persones que van participar en aquests actes fou el següent:

11-9-2004 observació migracions al matí - 8 persones (+ 50 pers. festa 11 setembre)

18-9-2004 observació migracions al matí - 14 persones

18-9-2004 celebració del dia internacional de les aus a la tarda – més de 70 persones.

* El programa PERNIS

Aquest ha estat el segon any que s'ha dut a terme aquest programa al nostre país. Es tracta d'un programa de seguiment de les migracions d'aus rapinyaires a la tardor. Des del Parc del Foix també s'hi ha volgut participar. El programa pretén crear una xarxa de seguiment de la migració de rapinyaires a Catalunya. Es coordina des de l'ICO. L'objectiu és conèixer les característiques del pas postnupcial, determinar les rutes migratòries i les tendències poblacionals al llarg dels anys. Es fan un total de 10 censos en sessions de 4 hores; de les 10 del matí a les 14 del migdia. Les sessions són setmanals i preferiblement cal fer-les en dissabte (o en tot cas entre divendres i dilluns). En els annexes d'aquesta memòria hi ha les fitxes del present 2004 omplertes.

* El cens d'ocells hivernants

El dia 17-1-2004 es va participar en el "Cens Internacional d'Ocells Aquàtics Hivernants a Catalunya" organitzat per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb "Wetlands international - International Waterbird Census Western Palearctic". Durant la jornada es van recollir dades quantitatives de totes les espècies d'aus detectades. Els resultats es van trametre a l'organització d'aquest cens. Amb les informacions del pantà de Foix i tota la resta de dades recollides a Catalunya se n'elabora un informe a nivell nacional, que a la seva vegada després forma part d'un altre informe a nivell europeu. En concret s'hi va anar de les 8 hores fins a les 12,30 hores. En total es van anotar 44 espècies.

* El programa SOCC

El SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya) és un programa de seguiment de l'avifauna impulsat des de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). Aquest programa compta amb el suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del SOCC és conèixer les tendències temporals que es produeixen en

l'abundància dels ocells comuns a Catalunya, factor essencial per poder determinar l'estat de conservació de les diferents espècies d'ocells i dels seus hàbitats. Es tracta d'un programa de seguiment continu, que requereix un esforç reduït (quatre matins per any) però mantingut any rera any.

El SOCC es basa en el transecte com a mètode per obtenir índexs d'abundància de les diferents espècies d'ocells. Arreu de Catalunya se segueixen unes pautes comunes per tal que les dades es puguin comparar al llarg dels anys. Els transectes han de mesurar aproximadament uns 3 quilòmetres, i han d'estar dividits en 6 seccions de longituds similars. S'han de realitzar al matí, entre la sortida del sol i les quatre hores següents, cada vegada que es fa l'itinerari s'hi ha d'invertir entre dues i tres hores. Els 4 censos que es fan cada any han de programar-se de la següent manera: dos censos hivernals; un al gener i un al desembre, i dos censos en època de nidificació; el primer entre el 15 d'abril i el 15 de maig, i el segon entre el 15 de maig i el 15 de juny. A l'hora de fer els censos cal que hi hagi unes determinades condicions meteorològiques favorables, si no s'ha d'esperar a un altre dia.

Aquest és el tercer any que participem en el programa SOCC, amb un transecte que transcorre per l'interior del Parc del Foix. D'entre les categories establertes des de l'ICO es participa en la de "mostreig en ambients mediterranis". El recorregut té el seu inici a cal Bladet i passa per cal Semison. El recorregut transcorre per diferents ambients naturals entre els quals hi ha la pineda, la brolla i els conreus. L'itinerari es realitza per partida doble, en cada una de les jornades hi participen dos ornitòlegs que van separats uns 50 o 100 metres i que prenen nota de les observacions per separat. El 2004 les dates en què s'ha realitzat l'activitat són:

- 1er cens SOCC hivernal – 15-1-2004
- 1er cens SOCC època de nidificació – 4-5-2004
- 2n cens SOCC època de nidificació – 28-5-2004
- 2n cens SOCC hivernal – 11-12-2004

* La campanya d'anellament 2004

Per primer any en la història del Parc del Foix s'ha dut a terme una campanya d'anellament científic d'aus al llarg de tot l'any. Aquesta tasca ha estat realitzada sota la direcció de l'anellador Marc Oliver, que pertany a l'ICO. Els resultats obtinguts ja han aportat tot un seguit de dades de gran interès i valor científic. En els propers anys s'espera poder aprofundir encara més en el coneixement de la vida de les aus i poder extreure conclusions mercès a la utilització d'aquesta tècnica. Aquest primer any s'han fet 24 sessions d'anellament. S'ha capturat un total de 614 ocells de 35 espècies diferents. Les dades més interessants han estat la recuperació d'un repicatalons anellat a Suècia i d'un altre de la subespècie *witherbyi*. En l'annex 3 d'aquesta memòria hi ha el text i el resum de dades obtingudes en la present campanya.

* Els ocells del Parc del Foix el 2004

Aquest any s'han arribat a observar un total de 165 espècies d'ocells diferents. Per altra banda el total acumulat d'espècies que nosaltres tenim citades al llarg dels darrers 50 anys al Parc del Foix ha quedat en 225. Destaquem el control per primera vegada al Parc del Foix segons els nostres arxius de les següents aus.

- 1er. trimestre
 - Sit blanc (*Plectrophenax nivalis*) 15-1-2004
 - Fotja banyuda (*Fulica cristata*) 9-2-2004 (ASA; EFM)
- 2on. trimestre
 - Mussol banyut (*Asio otus*) 26-5-2004 (PTE)
- 3er. trimestre
- 4rt. trimestre
 - Picot garser gros (*Dendrocopos major*) 16-11-2004 (PTE)

També s'han anotat per primera vegada algunes espècies al·lòctones, possiblement escapades de la vida en captivitat.

- Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*) 9-8-2004
- Teixidor social (*Ploceus cucullatus*) 23-10-2004
- Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves (*Lamprotorus chalybaeus*) 1-12-2004 (PTE)

A més aquest any s'han obtingut registres indicatius de la nidificació segura del mussol banyut, el ballester i el trobat, d'aquestes dues darreres espècies ja se'n tenia l'evidència de nidificació possible o probable.

A l'hora d'omplir les taules sobre fenologia, migració, tendències poblacionals, etc... s'han tingut en compte fonamentalment les dades recollides al llarg dels darrers deu anys (en el cas que les dades de referència fossin anteriors s'ha fet constar). A la fenologia de les espècies exòtiques s'hi ha posat l'abreviatura "exo" en l'apartat de divagant, atès que per ara no es poden considerar de cap altre apartat.

Hem recopilat unes quantes observacions dels guardes del Parc del Foix, de guardes forestals, o d'altres persones aficionades a la natura. Apareixen en el text seguides entre parèntesi de les inicials de la persona col·laboradora:

Antonio Somalo Alique (ASA), Domingo Serrano Corredor (DSC), Eduardo Fernandez Martín (EFM), Jordi Cruells Rosset (JCR), Martí Cardona Melgarejo (MCM), Marc Magem Bofill (MMB), Marc Oliver (MOV), Marc Peris Miras (MPM), Manel Serrano Sánchez (MSS), Pere Xavier Albornà Rovira, (PAR), Pere Mestre Raventós (PMR), Pedro Torres Expósito (PTE).

Les dades i observacions que no van seguides de cap d'aquestes inicials, cal atribuir-les a l'equip redactor de la memòria.

Cabusset (*Tachybaptus ruficollis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix		x		estable		x		augmenta	

El 15-1-2004 s'observa un poll crescutet que crida i segueix a un adult per demanar-li menjar. El 15-7-2004 es veu un poll. El 19-8-2004 s'observen 2 pollades diferents. El 27-8-2004 es veuen un mínim de 3 grups familiars integrats per dos adults i dos joves. El 10-9-2004 es veuen 3 grups familiars de 4, 4 i 5 exemplars. El 25-9-2004 s'observa un grup familiar de 2 adults i 2 polls que els segueixen tot demanant menjar. El 4-11-2004 observem un adult amb 2 polls. El 11-11-2004 observem un exemplar a un toll d'aigua de la cimitera dels Monjos. El 19-11-2004 observem un grup amb 2 polls i 2 adults. A destacar doncs, les dades de reproducció d'aquesta espècie que anormalment s'allarguen fins a la tardor i l'hivern amb casos ben extrems com el gener o novembre del 2004. A destacar també la troballa d'un bec de cabusset en unes egagròpiles de duc a les roques Boveres.

Cabussó emplomallat (*Podiceps cristatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x						x		x	x	x

Enguany s'ha observat entre el 18-8-2004 (PTE) i el 27-8-2004 i també ens informen que es va veure el 19-10-2004 (PAR, DSC).

Cabussó collnegre (*Podiceps nigricollis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x	x		x

No observat el 2004.

Corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant	x	de pas	x	divagant	
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	---	--------	---	----------	--

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dates extremes hivernants	marxa	11-5-2001				2004			marxa	24-4-2004		
	arribada	18-6-2004							arribada	18-6-2004		

El 15-1-2004 s'observa algun exemplar que ja presenta plomatge estival. El 17-1-2004 es contenen 231 exemplars als dormidors, el 4-3-2004 n'hi ha 176. El 3-2-2004 un exemplar porta una branca al bec. El 25-3-2004 s'observen 87 exemplars, alguns semblen iniciar les migracions. El 15-7-2004 un exemplar juvenil empaita a un adult fins que és peixat. El dia 23-12-2004 es contenen 412 exemplars a les joques, aquesta és la xifra més alta fins ara. Tant a la primavera com a la tardor s'han observat estols en vol migratori, sobretot a l'octubre.

Bitó (*Botaurus stellaris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
												x	

No observat el 2004. Darrera observació 3-12-1993 (PAR, DSC).

Martinet menut (*Ixobrychus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		23-4-2000			2004			arribada		4-5-2004			
	marxa		9-8-2004						marxa		9-8-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura			probable			possible		x	no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix			estable			augmenta		x		

El 1-7-2004 s'observa un exemplar jove de l'any que vola amb poca experiència, i que ens confirma per primera vegada la nidificació d'aquesta espècie al Parc del Foix, des de feia uns anys s'apuntava aquesta possibilitat però no ha estat fins ara que s'ha pogut confirmar. El 9-8-2004 observem 2 exemplars, un dels quals podria ser un jove.

Martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*)

Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		18-3-1998				2004		arribada		6-4-2004			
	marxa		7-10-1997						marxa		3-10-2004 (PTE)			

Aquest 2004 s'ha observat amb bastanta regularitat al llarg de tot l'estiu, tant exemplars adults com juvenils. A destacar l'observació del 27-8-2004 en què es veu un exemplar jove nascut aquest any (tot i que podria haver-ho fet al Parc del Foix, no n'estem prou segurs, podria ser un poll volander vingut de fora el Parc). Se li veu el bec molt curt. Ha provat de caçar uns quants peixos i se li escapen per falta d'experiència.

Martinet ros (*Ardeola ralloides*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x			x	x						

Es va observar únicament un exemplar a la Marina el 1-9-2004 (PTE).

Esplugabous (*Bubulcus ibis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	

S'ha observat unes poques vegades, sobretot a la tardor. Destaquem l'observació de 33 exemplars a la cua del pantà del dia 2-11-2004 (PTE).

Martinet blanc (*Egretta garzetta*)

Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Ha estat vist força vegades, en algunes ocasions se n'han arribat a sedimentar fins a una dotzena a l'embassament que hi poden restar un cert temps.

Agró blanc (*Egretta alba*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			x

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1998, 1999 i 2003.

Bernat pescaire (*Ardea cinerea*)

Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

El 25-3-2004 s'observa un adult que transporta un peix a la boca. El 6-4-2004 una parella mostra actituds de zel. El 17-1-2004 hi ha un total de 13 exemplars aturats a la zona 1 (alguns damunt les plataformes). El 19-6-2004 hi ha 3 exemplars aturats en plataformes a la zona 1, i 2 exemplars a la zona 2. El 21-7-2004 un exemplar està aturat a una plataforma de la zona 2. Aquesta au es segueix observant al llarg de tot l'any al pantà (tot i que no hi cria), en algunes dates se supera la trentena d'exemplars.

Agró roig (*Ardea purpurea*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		14-3-1998			2004		arribada		9-4-2004			
	marxa		30-9-2004					marxa		30-9-2004			

El 9-4-2004 s'observen 4 exemplars que passen migrant i baixen a aturar-se al pantà de Foix, però no troben cap punt tranquil (dies de setmana santa) i finalment marxen riu Foix amunt. El 15-7-2004 i dies següents s'observa un exemplar juvenil.

Cigonya negra (*Ciconia nigra*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x	x	x		

El 10-10-2004 s'observa un exemplar que es queda a dormir al bosc de cal Bladet. També ens informen que es va veure un exemplar el 13-8-2004 (PTE).

Cigonya blanca (*Ciconia ciconia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x				x	x			

No observat el 2004. Darreres observacions 1998, 1999, 2002 i 2003.

Becplaner (*Platalea leucorodia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x									

No observat el 2004. Darrera observació 12-4-2003.

Ànec blanc (*Tadorna tadorna*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x												

No observat el 2004. Darrera observació 19-1-1987 (PMR).

Ànec xiulador (*Anas penelope*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x								x	x			

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1997, 1998, 1999, 2001 i 2002.

Ànec griset (*Anas strepera*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x					x		x	x		

No observat el 2004. Darreres observacions any 2003.

Xarxet (*Anas crecca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		14-4-1996			2004		marxa		17-2-2004 (PTE)			
	arribada		5-7-2001					arribada		-			

Aquest any ha estat poc fred i s'ha observat molt poc el xarxet, només al gener i febrer.

Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*)

Fenologia	sedentari		x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació		Fins el 2004			segura		x	probable			possible			no detectat			
		2004			segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars			
		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional					disminueix					estable		x	augmenta				

El 1-5-2004 ja s'observa una pollada amb la femella. El 6-5-2004 una altra. El 10-6-2004 es veuen exemplars joves. El 10-7-2004 veiem una femella amb polls a la riera de Llitrà.

Ànec cuallarg (*Anas acuta*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas			x	divagant	
-----------	-----------	--	---------	--	--	-----------	--	---	--------	--	--	---	----------	--

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x					x	x	x	x

Tan sols es disposa de la citació d'11 exemplars del 6-10-2004 (PTE) i un mascle el 10-11-2004 (PAR, DSC).

Xarrasclet (*Anas querquedula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x									

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001 i 2003.

Ànec cullerot (*Anas clypeata*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x			
Dates extremes hivernants	marxa		18-4-2001			2004			marxa		-				
	arribada		14-7-2003 (PAR)						arribada		27-12-2004				

Aquest any sols s'ha vist el mes de desembre.

Xibec (*Netta rufina*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x				x					

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1998, 1999 i 2002.

Morell cap-roig (*Aythya ferina*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x			x					x	x	x	

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.

Morell xocolater (*Aythya nyroca*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
									x					

No observat el 2004. Darrera observació 17-9-1988 (PMR).

Morell de plomall (*Aythya fuligula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
									x			x	x		

No observat el 2004. Darreres observacions any 2002.

Morell d'ulls grocs (*Bucephala clangula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
														x

No observat el 2004. Darrera observació 20-12-1983.

Bec de serra mitjà (*Mergus serrator*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x									

No observat el 2004. Darrera observació 4-4-1966 (PMR).

Aligot vesper (*Pernis apivorus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
			x		x				x	x			
Dates extremes migrants	arribada		24-3-2003			2004			arribada		-		
	marxa		7-5-2004						marxa		7-5-2004		
	arribada		4-9-2004						arribada		4-9-2004		
	marxa		23-10-2003						marxa		5-10-2004		

Destaca el dia 16-9-2004 en què hi ha una migració molt intensa, i s'anoten 395 exemplars.

Milà negre (*Milvus migrans*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x					x	x			

En data 2-4-2004 (PTE) s'observa un exemplar en vol migratori prenupcial.

Milà reial (*Milvus milvus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
									x	x			

Ha estat vist en migració els dies 18-9-2004 i 15-10-2004.

Voltor comú (*Gyps fulvus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
									x				

No observat el 2004. Darreres observacions any 2003.

Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada		25-3-2004				2004		arribada		25-3-2004				
	marxa		4-10-2003						marxa		3-10-2004 (PTE)				
Nidificació	Fins el 2004			segura		x	probable		possible			no detectat			
	2004			segura		x	probable		possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix			estable			augmenta			x		

El 6-4-2004 una parella mostra actituds de zel. El 22-6-2004 veiem un adult empaitat per 2 esparvers. El 30-7-2004 a més d'observar una parella sentim els crits d'un poll que reclama aliment a prop de la font de Sant Llorenç. El 14-8-2004 es veuen 2 o 3 exemplars durant tot el matí (10-14h.), tenen el territori per la zona de la font de Sant

Llorenç. El 21-8-2004 des del turó de les Tres Partions s'observa un exemplar que marxa en direcció a la presa amb una serp al bec, i també un grup de 3 exemplars (un de jove). El 14-12-2004 localitzem el niu proper a la font de Sant Llorenç on aquest any va criar. Per les dades recollides aquest any pensem que hi podria haver 2 parelles nidificants establertes al Parc del Foix.

Arpella vulgar (*Circus aeruginosus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
		x	x	x	x			x	x	x			
Dates extremes migrants	arribada		26-3-1999				2004		arribada		27-3-2004		
	marxa		2-5-1999						marxa		11-4-2004		
	arribada		21-8-1998						arribada		5-9-2004		
	marxa		11-10-2001						marxa		10-10-2004		

A destacar l'observació d'un exemplar hivernant el 10-2-2004 (PTE, PAR), recordem que ja s'havien observat hivernants el 2002. També el notable pas migratori del 19-9-2004 que s'observen 54 exemplars.

Arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x						x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		9-3-1997			2004			marxa		-		
	arribada		11-9-2002						arribada		11-9-2004		

S'ha vist puntualment al pas de tardor. També hi ha diferents observacions d'exemplars hivernants; 4-2-2004, 9-2-2004 i 17-11-2004 (PTE).

Esparver cendrós (*Circus pygargus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x					x			

El 4-9-2004 s'observa una femella en migració.

Astor (*Accipiter gentilis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant			de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x		x		x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles			pinedes i alzinars			x	
	conreus i erms					màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x		augmenta	

El 21-8-2004 s'observa un exemplar juvenil. El 18-9-2004 se n'allibera un.

Esparver vulgar (*Accipiter nisus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura				probable		x	possible			no detectat			
	2004		segura				probable		x	possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				x

de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional	disminueix				estable				x	augmenta		

El 8-3-2004 (PTE) una parella realitza vols de zel prop la Torreta. El 27-3-2004 observem un exemplar prop de les Masuques que té l'ala una mica escapçada. El 22-6-2004 veiem una parella que embesteix a una àliga marcenca a la zona de l'Albornar. El 19-8-2004 s'observa un adult molta estona en vol de caça per cal Semison.

Aligot (*Buteo buteo*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional				disminueix		x		estable		x		augmenta			

Uns caçadors el 4-1-2004 (PTE, JCR) porten un exemplar ferit d'un tret a la Marina, l'han recollit a la riera de Marmellar, l'aligot es portat a Torreferrussa. El 15-1-2004 s'observen 4 exemplars possibles migrants, o en concentració premigratòria. El 19-2-2004 s'observen 3 exemplars que semblen migrar. El 25-1-2004 una parella realitza vols de zel, s'arriben a tocar de potes i fan fins i tot algun picat per tocar-se, un exemplar és de fase fosca i l'altre de fase clara.

Àliga daurada (*Aquila chrysaetos*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2004. Darrera observació 29-8-2000 (PTE, MSS).

Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
					x				x	x									
Dates extremes migrants	arribada		-				2004			arribada		-							
	marxa		10-5-2003							marxa		-							
	arribada		18-9-2004							arribada		18-9-2004							
	marxa		23-10-2003							marxa		15-10-2004							

El 7-10-2004 s'observa un exemplar migrant sedimentat entre la cua de l'embassament i el riu Foix, realitza vols de caça i se l'observa durant uns 30 minuts.

Àliga cuabarrada (*Hieraetus fasciatus*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles			x		pinedes i alzinars				
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x		augmenta				

El 17-4-2004 observem un adult al que li penja una mica una pota. El 7-7-2004 observem un exemplar juvenil de segon any (és a dir que no ha nascut enguany). Per altra banda la parella establerta al Parc del Foix s'ha reproduït amb èxit i ha tirat endavant dos polls.

Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
			x	x	x				x	x					
Dates extremes migrants	arribada	16-3-2004				2004			arribada	16-3-2004					
	marxa	9-5-2001							marxa	4-5-2004					
	arribada	9-9-1996							arribada	10-9-2004 (PTE)					
	marxa	12-10-1998							marxa	30-9-2004					

S'ha vist durant els dos passos migratoris.

Xoriguer petit (*Falco naumanni*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x			

No observat el 2004. Darreres observacions any 2000.

Xoriguer (*Falco tinnunculus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

El 11-3-2004 una parella de xoriguer marca territori a Sant Domingo de Penyafornt d'un altre exemplar. Destaquem el 10-10-2004 el pas de 71 exemplars.

Falcó cama-roig (*Falco vespertinus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									x	x		

Des de l'any 1998 fins enguany no s'havia tornat a citar aquesta au. Ha estat vista en pas els dies 18-9-2004 i 10-10-2004.

Esmerla (*Falco columbarius*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x		x						x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		14-3-2004			2004			marxa		14-3-2004		
	arribada		28-9-2002						arribada		3-10-2004		

Sobretot s'ha vist en pas a l'octubre i algun exemplar hivernant.

Falcó mostatxut (*Falco subbuteo*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals		arribada		5-4-1996				2004		arribada		9-4-2004		
		marxa		23-10-2004						marxa		23-10-2004		

Nidificació	Fins el 2004	segura		probable	x	possible		no detectat	
	2004	segura		probable	x	possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10		x	10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		x
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional	disminueix			estable		x	augmenta		

Degut a la bonança que va fer a la tardor el pas es va allargar fins el 23-10-2004.

Falcó de la Reina (*Falco eleonora*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
								x	x						

És el tercer any que s'observa, les primeres citacions són del 2001 i 2002. Enguany el 14-8-2004 es veu un exemplar de fase fosca migrant.

Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
	x	x		x	x		x			x			x

El 25-1-2004 des de l'Albornar veiem un exemplar que vola amb un tudó a les potes. Ve de la banda del riu i vola en direcció a can Ximet. Vist de bon matí, abans de les 9 hores. El 17-2-2004 (PTE) un exemplar sobrevola el fondo de mas Granell. El 15-10-2004 passen dos exemplars en vol migratori. El 8-12-2004 un exemplar intenta caçar coloms als entorns de la riera de Llitrà prop dels Monjos.

Perdiu (*Alectoris rufa*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

El 24-6-2004 un exemplar adult va acompanyat de 10 polls. El 30-7-2004 observem dos grups de polls amb els adults.

Guatlla (*Coturnix coturnix*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas	x	divagant	
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	---	----------	--

No observat el 2004. Darreres observacions any 1977.

Faisà (*Phasianus colchicus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x								x	

El 23-4-2004 s'observa un mascle en una zona de conreus entre Espitlles i Penyafel.

Rascló (*Rallus aquaticus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII

	x	x	x	x				x	x	x	x	x
Dates extremes	marxa	6-4-2004				2004			marxa	6-4-2004		
hivernants	arribada	27-8-2004 (PAR)							arribada	27-8-2004 (PAR)		

Enguany s'han obtingut unes dades més extremes tant a la marxa prenupcial com a l'arribada postnupcial.

Polla pintada (*Porzana porzana*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
			x	x									

Com en anys anteriors s'ha observat al pas prenupcial (25-3-2004 i 27-3-2004).

Rascletó (*Porzana parva*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x											

No observat el 2004. Darrera observació 12-3-1998.

Rasclet (*Porzana pusilla*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x					x						

No observat el 2004. Darreres observacions 28-8-1978 i 20-3-1998.

Guatlla maresa (*Crex crex*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
														x	

No observat el 2004. Darrera observació 13-12-1967 (PMR).

Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix					estable		x	augmenta				

El 25-5-2004 un exemplar cova un niu amb ous al riu Foix. El 28-5-2004 veiem polls sortits fa poc del niu. El 18-7-2004 observem 2 femelles amb polls. El 25-9-2004 encara s'observen joves depenents dels adults.

Fotja (*Fulica atra*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				

de cria	conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional	disminueix			estable			x	augmenta		

El 25-3-2004 s'observen almenys 8 territoris diferents, a un dels quals hi ha un exemplar que té el niu acabat i s'hi està a sobre tot i que no cova res. El 9-4-2004 un adult sembla que cova al niu. El 24-4-2004 hi ha dos nius on estan covant. El 1-5-2004 ja s'observen dues pollades amb les respectives femelles. El 21-5-2004 es veu una femella amb 5 polls acabats de néixer. El 28-5-2004 veiem polls sortits fa poc del niu. El 19-6-2004 observem dos grups familiars amb polls. El 1-7-2004 veiem 4 grups familiars amb polls. El 18-7-2004 observem 2 femelles amb polls. El 21-7-2004 una parella neda al costat d'un poll nouat. El 23-7-2004 i 4-8-2004 veiem un exemplar jove.

Fotja banyuda (*Fulica cristata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x											

El 9-2-2004 (ASA, EFM) s'observa un exemplar a la cua de l'embassament. L'observació la fan dos ornitòlegs de Madrid (de la SEO) que ho comuniquen als guardes del Parc. Aquesta és la primera citació d'aquesta espècie al Parc del Foix. És tracta d'una au que tot i tenir les seves poblacions molt amenaçades ha estat objecte de reintroduccions a diferents parcs naturals catalans.

Grua (*grus grus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
												x	

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1998 i 1999.

Sisó (*Tetrax tetrax*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x										

No observat el 2004. Darrera observació 26-4-1972 (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Cames llargues (*Himantopus himantopus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		6-3-2002			2004			arribada		25-3-2004		
	marxa		6-8-1978						marxa		1-5-2004		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
	2004		segura			probable			possible			no detectat	
													x

S'ha observat al pas primaveral.

Torlit (*Burhinus oedicnemus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	--	---

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Corriol petit (*Charadrius dubius*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes	arribada		13-3-2002			2004			arribada		10-3-2004 (PTE)	

estivals	marxa	27-9-1998			marxa	18-7-2004
Nidificació	Fins el 2004	segura	x	probable	possible	no detectat
	2004	segura	x	probable	possible	no detectat
Estimació de parelles nidificants		1 a 10	x	10 a 100		Més de 100
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles		pinedes i alzinars
	conreus i erms			màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera
Tendència poblacional		disminueix		estable	x	augmenta

En haver-hi l'embassament ple es detecta a l'entorn de les Masuques i a la cantera Uniland, on s'hi pot reproduir.

Corriol gros (*Charadrius hiaticula*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas	x	divagant	
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	---	----------	--

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
														x

No observat el 2004. Darrera observació 23-12-2001 (MCM).

Fredulega (*Vanellus vanellus*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x										x	x		

El 10-2-2004 a un sembrat prop de les Masuques hi ha 52 exemplars. En altres dates hivernals se'n segueixen observant al mateix camp.

Territ menut (*Calidris minuta*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
							x	x	x						

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1998, 1999, 2000 i 2001.

Territ de Temminck (*Calidris Temminckii*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
								x						

No observat el 2004. Darreres observacions any 1998.

Territ beclarg (*Calidris ferruginea*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
					x										

No observat el 2004. Darreres observacions any 2001.

Territ variant (*Calidris alpina*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
								x	x						

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1999 i 2001.

Becadell sord (*Lymnocyrtus minimus*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		x													

No observat el 2004. Darrera observació 6-2-1998 (MMB).

Becadell comú (*Gallinago gallinago*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x						x	x	x	
Dates extremes	marxa		24-4-2004			2004		marxa		24-4-2004			
hivernants	arribada		7-10-2004					arribada		7-10-2004			

Enguany s'han obtingut unes dades més extremes tant a la marxa prenupcial com a l'arribada postnupcial.

Becada (*Scolopax rusticola*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
	x	x	x									x	x
Dates extremes	marxa		14-3-2004			2004			marxa		14-3-2004		
hivernants	arribada		8-11-1999 (PTE)						arribada		-		

Es va veure el 17-1-2004 a la cua de l'embassament i el 14-3-2004 prop mas Albornar.

Tètol cuanegre (*Limosa limosa*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x		x								

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1973 i 1985.

Tètol cuabarrat (*Limosa lapponica*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Gamba roja pintada (*Tringa erythropus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
				x			x						

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1998 i 2003.

Gamba roja vulgar (*Tringa totanus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x			x	x	x				

Sols es va observar el 27-8-2004 (PAR, DSC).

Gamba verda (*Tringa nebularia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x		x	x	x	x		

Sols es va observar el 24-8-2004 (PAR, DSC).

Xivita (*Tringa ochropus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
		x	x	x			x	x	x	x		x	x
Dates extremes hivernants	marxa		22-4-2003			2004		marxa		17-4-2004			
	arribada		1-7-2004					arribada		1-7-2004			

S'ha anat observant en els passos migratoris.

Valona (*Tringa glareola*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			x	x	x	x	x	x	x			

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001 i 2003.

Xivitona (*Actitis hypoleucos*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dates extremes	arribada		5-3-1999			2004		arribada			17-4-2004	
migrants	marxa		24-5-1980					marxa			21-5-2004	
	arribada		7-7-2001					arribada			15-7-2004	
	marxa		19-11-1999					marxa			30-9-2004	

Com en anys anteriors se segueix observant als passos migratoris.

Gavina menuda (*Larus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x										

No observat el 2004. Darreres observacions any 1999.

Gavina vulgar (*Larus ridibundus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x	x	x	x	x	x	x	

La primera citació és de finals de juliol, el 28-7-2004 (PTE). A partir del mes d'agost s'observen ocells establerts al pantà; de primer uns quants, arriben a superar el centenar durant el mes de setembre, més endavant minven i a finals d'any en queden pocs. Aquesta au mai s'havia observat amb la regularitat i quantitat del 2004.

Gavià fosc (*Larus fuscus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
									x				

No observat el 2004. Darreres observacions any 2001.

Gavià argentat (*Larus cachinnans*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x				x				

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1999, 2000 i 2001.

Xatrac gros (*Sterna caspia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x									

No observat el 2004. Darreres observacions any 2002.

Fumarell carablanc (*Chlidonias hybridus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x		x		x	x	x			

Es va observar el 24-4-2004 en ple pas primaveral, si bé ja s'havia vist uns dies abans; el 22-4-2004 (PTE). A la tardor es va sedimentar un exemplar juvenil entre setembre i octubre.

Fumarell negre (*Chlidonias niger*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x		x		x				

Sols es va observar el 18-5-2004 (PAR, PTE).

Colom roquer (*Columba livia*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004			segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004			segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta					

El 8-12-2004 un grup d'exemplars vola alarmat davant la presència d'un falcó pelegrí als entorns de la riera de Llitrà prop dels Monjos.

Xixella (*Columba oenas*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		de pas			divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004			segura		x	probable		possible			no detectat		
	2004			segura		x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				x	pinedes i alzinars			
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional					disminueix		x		estable		augmenta			

Tot i que se li atribueix un comportament sedentari sembla ser que realitza algun petit desplaçament de forma que no es cita a l'hivern.

Tudó (*Columba palumbus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta					

El 25-1-2004 un falcó pelegrí porta un tudó mort. Des de principis d'any ja es van anotar actituds de zel que s'allarguen fins al juny. El 7-5-2004 veiem una parella al niu i a una altra banda un exemplar en zel. A la tardor hi va haver alguna jornada que es va detectar pas d'estols migrants. A la tardor/hivern es formen algunes concentracions que queden refugiades (dels caçadors) a la cua de l'embassament.

Tórtora turca (*Streptopelia decaocto*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura			x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix			estable			augmenta				x	

El 23-4-2004 s'anoten exemplars en zel.

Tórtora (*Streptopelia turtur*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		12-4-2003			2004			arribada		23-4-2004			
	marxa		20-9-2000						marxa		28-8-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix		x	estable			augmenta				

El 31-5-2004 una parella realitza la parada nupcial i una còpula.

Cucut reial (*Clamator glandarius*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x								
Dates extremes estivals		arribada		28-3-1983			2004		arribada					
		marxa		25-5-2002 (PTE)					marxa					
Nidificació	Fins el 2004			segura		x	probable		possible		no detectat			
	2004			segura			probable		possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100				Més de 100		

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms	x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional		disminueix	x	estable		augmenta

Enguany sols es va observar el dia 6-4-2004 als entorns de Clariana.

Cucut (*Cuculus canorus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		28-3-1993			2004			arribada		1-4-2004 (PAR)			
	marxa		8-9-1998						marxa		7-7-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta				

El 1-7-2004 s'observa un exemplar jove.

Òliba (*Tyto alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		x	x			x				x					
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta				

El 11-3-2004 trobem egagròpiles recents a Sant Domingo de Penyafort.

Xot (*Otus scops*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x							
Dates extremes estivals	arribada		5-4-1980				2004			arribada		17-4-2004		
	marxa		11-7-2001							marxa		-		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional				disminueix		x	estable			augmenta				

Sols es va anotar el seu cant el 17-4-2004.

Duc (*Bubo bubo*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x				x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles	x	pinedes i alzinars	
	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional		disminueix		estable	x	augmenta

El 31-5-2004 observem 2 polls (potser 3) que ja volen i fan unes veus d'alarma. El 10-6-2004 sentim les veus dels joves. El 7-7-2004 trobem 2 egagròpiles recents més algunes de velles, també el cap de dues fagines suposadament depredades pel duc. El 27-11-2004 s'escolta a la parella que canta a duo.

Mussol (*Athene noctua*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible		no detectat				
	2004		segura		x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues					x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix		x	estable		augmenta					

Com en anys anteriors se segueix observant, però cada vegada minva més.

Gamarús (*Strix aluco*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x		x			x					x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix				estable		x		augmenta		

Es continua situant als entorns de la presa. El 19-8-2004 (PTE) es troben plomes i egagròpiles a l'ermita de Lourdes.

Mussol banyut (*Asio otus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x		x						
Nidificació	Fins el 2004		segura			probable			possible			no detectat	x
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes						rupícoles						
	conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera

El 28-5-2004 veiem un exemplar ofegat a un safareig de Cova Pineda, feia dos dies 26-5-2004 (PTE) que ja s'hi havia trobat. El 7-7-2004 escoltem veus de 2 o 3 polls volanders més les d'un adult, arribem a veure un exemplar. Es desplacen d'un arbre a l'altre per tal de fugir de la nostra presència. Aquesta espècie és el primer any que es detecta al Parc del Foix, i a més s'ha pogut comprovar la seva nidificació. És un ocell que passa molt desapercebut i podria haver nidificat en anys anteriors.

Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x		x		
Dates extremes estivals	arribada		19-4-2002				2004		arribada		21-5-2004	
	marxa		1-10-2003						marxa		7-7-2004	

Nidificació	Fins el 2004	segura	x	probable		possible		no detectat	
	2004	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants	1 a 10			10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		
de cria	conreus i erms		x	màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional	disminueix			estable		x	augmenta		

Es manté amb molt bona densitat a la majoria de les muntanyes del Parc del Foix.

Siboc (*Caprimulgus ruficollis*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
					x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		17-5-1997			2004			arribada		21-5-2004			
	marxa		10-8-1999						marxa		-			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix		x	estable			augmenta				

Cada vegada resulta més difícil de localitzar, és possible que acabi extingint-se al Parc.

Ballester (*Apus melba*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada	13-3-2002			2004			arribada	14-3-2004					
	marxa	30-10-2003						marxa	23-10-2004					
Nidificació	Fins el 2004		segura			probable			possible		x	no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					

Hi ha una estranya observació hivernal d'aquesta au del 27-2-2004 (PTE) al fondo de mas Carlús. El 7-7-2004 hi ha 3 exemplars que marquen territori a les roques Boveres; hi arriben al capvespre i s'hi estan fins que es fa fosc, fan algunes passades per entrar a forats de les cingleres. Es comprova per primera vegada la seva nidificació, tot i que ja s'havia considerat anteriorment aquesta possibilitat. Es tracta d'un nidificant molt localitzat.

Falciot negre (*Apus apus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		26-3-1999			2004			arribada		2-4-2004 (PAR)			
	marxa		3-10-2004						marxa		3-10-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

El 22-6-2004 veiem nius a mas Albarnar. El 7-7-2004 alguns adults entren a nius a les roques Boveres, se senten veus de polls dins els nius.

Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
						x		x	x						

Observacions d'interès – Es va observar amb poca quantitat però certa regularitat entre el 14-8-2004 i 19-9-2004.

Blauet (*Alcedo atthis*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura				probable		x	possible			no detectat		
	2004		segura				probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x

Es va anar veient fins a finals de març i a partir de finals de maig.

Abellerol (*Merops apiaster*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		8-4-1999			2004			arribada		1-4-2004 (PAR)			
	marxa		29-9-2001						marxa		16-9-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix		x	estable			augmenta				

El 31-5-2004 trobem nius ocupats.

Gaig blau (*Coracias garrulus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x						

El 8-5-2004 (PTE) es van veure dos exemplars, un al riu Foix, prop la Marsera i l'altre al barranc de Sant Llorenç

Puput (*Upupa epops*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

S'ha anat observant amb regularitat, tot i ser una espècie escassa.

Colltort (*Jynx torquilla*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
				x	x	x	x							
Dates extremes estivals	arribada	5-4-1980				2004			arribada	-				
	marxa	7-7-2004							marxa	7-7-2004				
Nidificació	Fins el 2004		segura			probable		x	possible			no detectat		
	2004		segura			probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars			x	
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix		x	estable				augmenta			

Sols ha estat anotat el 7-7-2004 als entorns de les roques Boveres.

Picot verd (*Picus viridis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta				

S'ha anat observant amb regularitat, tot i ser una espècie poc abundant. El 21-7-2004 s'observen dos joves.

Picot garser gros (*Dendrocopos major*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
												x		

Es cita per primer cop al Parc del Foix el 16-11-2004 (PTE) als entorns de la font d'Horta. Hi ha una altra observació d'un exemplar possible vist el 31-12-2004 al riu Foix. Ja feia un temps que s'esperava l'arribada d'aquesta au al Parc del Foix, puix que s'havia vist a la riera de Marmellar a pocs quilòmetres del Parc. És un ocell que al Penedès els darrers 20 anys ha anat augmentant la seva zona de distribució.

Terrerola vulgar (*Calandella brachydactyla*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
					x								

No observat el 2004. Darrera observació el 22-5-2002 (PTE).

Cogullada vulgar (*Galerida cristata*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix		x	estable				augmenta				

Es pot trobar al llarg de tot l'any amb poca abundància a les zones de conreu.

Cogullada fosca (*Galerida theklae*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x	x	x	x	x	x	x		x	
Nidificació		Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
		2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100			Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional					disminueix				estable		x	augmenta		

Seguim anotant sols unes dues parelles d'aquesta espècie a tot el Parc del Foix.

Cotoliu (*Lullula arborea*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x		augmenta			

A banda dels exemplars hivernants cada vegada hem anat situant més parelles que es reproduïxen al Parc del Foix. Això podria ser fruit d'una major prospecció ornitològica, o bé d'un progressiu augment d'efectius.

Alosa (*Alauda arvensis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		4-3-2004			2004			marxa		4-3-2004		
	arribada		11-10-2003						arribada		23-10-2004		

Ocell típicament hivernant que s'observa a l'entorn d'alguns conreus, o en pas.

Oreneta de ribera (*Riparia riparia*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
			x	x	x	x			x	x					
Dates extremes migrants	arribada	5-3-1999				2004			arribada		11-3-2004 (PAR)				
	marxa	11-6-1998							marxa		11-5-2004				
	arribada	2-9-2000							arribada		10-9-2004				
	marxa	15-10-2000							marxa		10-10-2004				

Com en anys anteriors s'ha observat als dos passos migratoris.

Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura			probable			possible			no detectat		x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles			x		pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			

Tendència poblacional	disminueix	x	estable		augmenta	
-----------------------	------------	---	---------	--	----------	--

Enguany s'ha observat sols en pas i com a hivernant. Hi ha dies d'hivern que es concentra en estols relativament grans, com el 4-1-2004 que es veuen aproximadament uns 40 exemplars a la riera de Llitrà prop de Santa Margarida i els Monjos.

Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada	17-2-1979				2004			arribada	28-2-2004				
	marxa	15-11-1998							marxa	23-10-2004				
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix		x	estable			augmenta				

El 22-6-2004 veiem un niu amb polls a mas Albornar. El 1-7-2004 s'observen polls volanders alimentats per adults. El 13-10-2004 al capvespre un grup d'uns 40 exemplars busquen un lloc per ajocar-se a l'entorn del turó de les Tres Partions.

Oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x	x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada	15-3-1980				2004			arribada	2-4-2004 (PTE)				
	marxa	15-9-2001							marxa	-				
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura			probable			possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				x	pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta				

Sols es va observar els dies 9-4-2004 i 22-6-2004. També ens informen que es va veure el 2-4-2004 (PTE)

Oreneta cuablanca (*Delichon urbica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Dates extremes estivals	arribada	19-2-2004				2004			arribada	19-2-2004				
	marxa	29-10-1999							marxa	15-10-2004				
Nidificació	Fins el 2004	segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004	segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix		x	estable			augmenta				

El 2-10-2004 s'observa una gran quantitat de migrants, es calcula que unes 8000, totes volen cap al sud. En 3 recomptes d'un minut es conten 72 ex, 26 ex. i 80 ex.

Trobat (*Anthus campestris*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada	11-4-2004		2004				arribada	11-4-2004					
	marxa	24-9-2003						marxa	23-9-2004					
Nidificació	Fins el 2004		segura			probable		x	possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera			

S'ha obtingut un bon registre per a les arribades. El 24-6-2004 un exemplar marca territori a la pedrera d'Uniland. Al cap de pocs dies, el 3-7-2004 (PTE), al mateix lloc un adult alimenta a un poll. Així doncs per primera vegada es confirma la nidificació segura d'aquesta au, que fins ara sols s'havia considerat una espècie de nidificació probable.

Piula dels arbres (*Anthus trivialis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x				x	x	x			
Dates extremes migrants	arribada	26-3-1999				2004			arribada	-			
	marxa	23-4-2004							marxa	23-4-2004			
	arribada	15-8-2002							arribada	18-9-2004(MOV			
	marxa	18-10-2003							marxa	5-10-2004			

Hi ha hagut molt poques citacions d'aquesta au de pas.

Titella (*Anthus pratensis*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x						x	x	x		
Dates extremes hivernants	marxa		9-4-1979			2004			marxa		6-4-2004			
	arribada		3-10-2000						arribada		9-10-2004			

El 1-2-2004, el 25-3-2004 i el 6-12-2004 observem exemplars que entren a ajocar-se de les terres de conreu cap a les muntanyes del Parc. El 13-10-2004 s'observen nombrosos migrants (aprox. 180) en petits grupets, alguns es queden a dormir per la zona a l'entorn del turó de les Tres Partions.

Grasset de muntanya (*Anthus spinoletta*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x											

No observat el 2004. Darreres observacions any 1998 (possibles).

Grasset de costa (*Anthus petrosus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			x											

No observat el 2004. Darreres observacions any 1998.

Cuereta groga (*Motacilla flava*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x	x				x	x			
Dates extremes migrants	arribada	22-3-1998				2004			arribada		-		
	marxa	1-5-2004							marxa		1-5-2004		

	arribada	5-9-2001		arribada	2-10-2004
	marxa	25-10-2003		marxa	10-10-2004

Hi ha hagut molt poques citacions d'aquesta au de pas.

Cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x	
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x		augmenta			

Es segueix observant al llarg de tot l'any, tot i que sols cria al riu Foix. Al pas migratori postnupcial se n'observen unes quantes.

Cuereta blanca (*Motacilla alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura			x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta				

El 21-5-2004 es veu un exemplar mort per col·lisió amb una línia elèctrica a la cua de l'embassament. El 28-5-2004 veiem un poll volander. El 10-6-2004 un niu a la Marina té 4 ous. El 15-7-2004 s'observa un grup familiar amb joves no independitzats. El 23-7-2004 una trentena d'exemplars surt de la joca (6,30h.) a la cua de l'embassament, el 17-1-2004 n'hi ha almenys uns 70.

Cargolet (*Troglodytes troglodytes*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles			x	pinedes i alzinars			x	
	conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix					estable		x	augmenta		

El 25-5-2004 veiem polls volanders. En diferents dates també es troben nius vells.

Pardal de bardissa (*Prunella modularis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes	marxa		28-3-2003			2004		marxa		25-3-2004			
hivernants	arribada		11-10-2003					arribada		13-10-2004			

S'ha observat amb regularitat els mesos freds.

Pit-roig (*Erithacus rubecula*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable			augmenta		x		

A l'hivern és molt abundant. A l'època de cria hem detectat que segueix augmentant de forma lenta la seva distribució i població al Parc. El 17-4-2004 trobem un exemplar mort a cal Balaguer.

Rossinyol (*Luscinia megarhynchos*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant		de pas	x	divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada	6-4-2004				2004			arribada	6-4-2004			
	marxa	1-10-1999							marxa	29-9-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100	x	
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta		

Es va detectar molt aviat la seva arribada a primers d'abril.

Cotxa blava (*Luscinia svecica*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x						x	x					
Dates extremes migrants	arribada	12-3-1998				2004			arribada	-					
	marxa	15-3-1998							marxa	-					
	arribada	6-9-2000							arribada	18-9-2004(MOV					
	marxa	31-10-1998							marxa	28-10-2004					

El dia 18-9-2004 (MOV) s'anellen dos exemplars. El 25-9-2004 s'observa una femella anellada. El 7-10-2004 s'observa un mascle de taca blanca, té el blau força descolorit.

Cotxa fumada (*Phoenicurus ochruros*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x				x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta					

Enguany es localitza una nova parella nidificant d'aquesta espècie, en concret a la Casa Alta el 7-5-2004.

Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas	x	divagant	
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	---	----------	--

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x			x	x	x		
Dates extremes migrants	arribada	5-4-1999			2004				arribada	17-4-2004 (PTE)		
	marxa	16-5-2002 (PTE)							marxa	8-5-2004 (PTE)		
	arribada	21-8-2002 (PTE)							arribada	28-8-2004		
	marxa	23-10-2004							marxa	23-10-2004		

Ha estat observada sobretot al pas de tardor.

Bitxac rogenic (*Saxicola rubetra*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x				x	x					
Dates extremes migrants	arribada	16-4-2002				2004			arribada	-					
	marxa	7-5-2000							marxa	5-5-2004 (PTE)					
	arribada	15-9-2002 (PTE)							arribada	20-9-2004					
	marxa	5-10-2001 (PTE)							marxa	-					

És un ocell migrant molt escàs.

Bitxac comú (*Saxicola torquata*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x		Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix		x	estable		x	augmenta				

El 1-2-2004 un mascle porta una eruga peluda al bec, sembla processonària del pi. El 7-5-2004 observem polls volanders. El 24-6-2004 una parella marca territori. Després dels forts freds de fa un parell d'anys que van reduir molt la seva població, enguany ja s'ha començat a notar una lleu recuperació.

Còbit gris (*Oenanthe oenanthe*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
				x	x				x	x					
Dates extremes migrants	arribada	2-4-2004 (PTE)				2004			arribada	2-4-2004 (PTE)					
	marxa	11-5-2003							marxa	-					
	arribada	4-9-2004							arribada	4-9-2004					
	marxa	15-10-2004							marxa	15-10-2004					

Sobretot s'ha vist al pas de tardor, s'han obtingut millors dates extremes d'aquest pas.

Còbit (*Oenanthe hispanica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		13-4-2000			2004			arribada		7-5-2004			
	marxa		16-9-1997						marxa		24-6-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				

Tendència poblacional	disminueix	x	estable		augmenta	
A destacar el dia 31-5-2004 que es troben 4 territoris ocupats diferents.						

Còbit roquer (*Oenanthe leucura*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
							x	x						

Segona observació d'aquesta au al Parc del Foix. En aquesta ocasió el dia 30-7-2004 s'observen dos exemplars.

Merla roquera (*Monticola saxatilis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
				x									

No observat el 2004. Darreres observacions any 2001.

Merla blava (*Monticola solitarius*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

El 27-3-2004 un mascle canta i fa vols de zel davant de la femella. El 25-5-2004 s'observa un exemplar jove.

Merla de pit blanc (*Turdus torquatus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
										x					
Dates extremes migrants	arribada	-				2004			arribada	-					
	marxa	-							marxa	-					
	arribada	1-10-2003							arribada	15-10-2004					
	marxa	25-10-2003							marxa	23-10-2004					

Per segon any consecutiu s'anota aquesta au de pas al Parc del Foix.

Merla (*Turdus merula*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta				

El 4-3-2004 trobem un exemplar depredat per un rapinyaire a la zona de la Xoriguera. El 27-3-2004 un altre prop de les Masuques. El 17-4-2004 un adult surt de dins una ginesta on hi té un niu amb 3 ous. El 25-5-2004 veiem polls volanders.

Griva cerdana (*Turdus pilaris*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x										x	x		

El dia 15-1-2004 s'observa un exemplar.

Tord (*Turdus philomelos*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x		
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional				disminueix				estable			augmenta			x	

El 25-1-2004 en veiem un de mort per un caçador. El 2-4-2004 (PTE) un adult construeix niu.

Tord ala-roig (*Turdus iliacus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x								x	x	x	
Dates extremes	marxa		19-2-2004			2004			marxa		19-2-2004		
hivernants	arribada		26-10-2001						arribada		29-10-2004		

Aquest ocell hivernant es va observar sobretot durant el gener i febrer.

Griva (*Turdus viscivorus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms			x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix					estable		x	augmenta				

El 3-5-2004 un adult porta becada. El 15-10-2004 se'n veu alguna de migrant.

Rossinyol bord (*Cettia cetti*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

El 25-5-2004 veiem polls volanders. El 15-7-2004, el 18-7-2004 i el 4-8-2004 observem exemplars joves.

Trist (*Cisticola juncidis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		?		Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional				disminueix				estable		x		augmenta		

S'observa tot l'any però a l'època reproductora n'hi ha més i són més fàcils de detectar.

Boscaler comú (*Locustella luscinioides*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
					x		x		x	x					

El 15-7-2004 s'anoten almenys dos exemplars, un que canta i un altre que és observat.

Boscarla d'aigua (*Acrocephalus paludicola*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
								x							

No observat el 2004. Darreres observacions any 1998.

Boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
					x								

No observat el 2004. Darreres observacions any 1998.

Boscarla menjamosquits (*Acrocephalus palustris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

No observat el 2004. Darreres observacions any 1999.

Boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*)

Fenologia	sedentari				estival ?		hivernant				de pas x		divagant				
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
					x	x		x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals		arribada		29-4-2000				2004		arribada		4-5-2004					
		marxa		4-11-2004						marxa		4-11-2004					
Nidificació		Fins el 2004		segura				probable				possible x		no detectat			
		2004		segura				probable				possible x		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		?		10 a 100				Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars			
		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera x			
Tendència poblacional				disminueix				estable						augmenta			

El 15-7-2004 observem un exemplar amb un comportament molt discret, diferent al que solen mostrar els exemplars migrants. Uns dies abans el 5-7-2004 (MOV) ja es va anellar un exemplar. Aquestes observacions que

surten de les dates de pas ens fan pensar en la possibilitat de nidificació de l'espècie, en tot cas caldrà confirmar-ho en els pròxims anys.

Balquer (*Acrocephalus arundinaceus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		17-4-1997			2004			arribada		9-8-2004	
	marxa		17-9-2004(MOV)						marxa		17-9-2004(MOV)	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible			no detectat	
	2004		segura			probable		possible		x	no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional				disminueix		x	estable				augmenta	

El 9-8-2004 es va observar un exemplar que surt un moment dels canyissars i de seguida s'hi torna a amagar. El 17-9-2004 (MOV) es va anellar un exemplar, la citació és molt interessant ja que al pas de tardor el balquer sol passar desapercebut.

Bosqueta pàl·lida (*Hippolais pallida*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
								x					

No observat el 2004. Darreres observacions any 1973 (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Bosqueta vulgar (*Hippolais polyglotta*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant		de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada	26-4-2002				2004			arribada	1-5-2004		
	marxa	18-9-2004(MOV)							marxa	18-9-2004(MOV)		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars		
	conreus i erms			x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta		

S'observa amb regularitat a l'època reproductora.

Tallareta cuallarga (*Sylvia undata*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

S'ha anat observant al llarg de tot l'any.

Tallarol de garriga (*Sylvia cantillans*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x	x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	arribada		29-3-2003			2004			arribada		6-4-2004				
	marxa		22-5-1999						marxa		23-4-2004				
	arribada		23-8-2003						arribada		23-9-2004				
	marxa		9-10-2001						marxa		29-9-2004				

Ha estat vist als dos passos migratoris.

Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x	
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

El 10-6-2004 una parella construeix niu.

Tallarol emmascarat (*Sylvia hortensis*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	x
No observat el 2004. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).										

Tallareta vulgar (*Sylvia communis*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
				x	x			x	x	x					
Dates extremes migrants	arribada		17-4-2004			2004			arribada		17-4-2004				
	marxa		12-5-1999						marxa		23-4-2004				
	arribada		22-8-2000						arribada		10-9-2004				
	marxa		12-10-1998						marxa		-				

S'ha vist poc als passos migratoris.

Tallarol gros (*Sylvia borin*)

Fenologia	sedentari		estival ?			hivernant			de pas x		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				x	x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada	11-5-2001				2004			arribada		10-9-2004		
	marxa	23-10-2001							marxa		30-9-2004		

S'ha vist molt poc al pas de tardor.

Tallarol de casquet (*Sylvia atricapilla*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			

Estimació de parelles nidificants	1 a 10		10 a 100		Més de 100		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars		x
	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional	disminueix		estable		x	augmenta	x

S'ha anotat tot l'any, sobretot a la tardor i hivern.

Mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		1-4-2003			2004			arribada		6-4-2004			
	marxa		11-9-2003						marxa		21-8-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta				

Hi ha bastantes parelles reproductores establertes a diferents àrees de bosc.

Mosquiter xiulaire (*Phylloscopus sibilatrix*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
									x					

No observat el 2004. Darrera observació 4-9-1977 (el 2000 citació possible).

Mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x	
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional				disminueix				estable				augmenta		x	

El 25-3-2004 canten molt.

Mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
			x	x	x			x	x	x				
Dates extremes migrants	arribada		29-3-2001			2004			arribada		3-4-2004			
	marxa		12-5-2003						marxa		9-4-2004			
	arribada		9-8-2004						arribada		9-8-2004			
	marxa		15-10-2000						marxa		18-9-2004			

Com en anys anteriors s'ha vist sobretot al pas de tardor.

Reietó (*Regulus regulus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant	x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII

	x	x	x							x	x	x
Dates extremes hivernants	marxa	25-3-2004				2004			marxa	25-3-2004		
	arribada	20-10-1998							arribada	-		

Tan sols s'ha vist el 25-3-2004.

Bruel (*Regulus ignicapillus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta				

Hi ha bastantes parelles reproductores establertes a diferents àrees de bosc.

Papamosques gris (*Muscicapa striata*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant			de pas			x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
				x	x	x	x	x	x	x						
Dates extremes estivals	arribada		9-4-2000				2004			arribada		1-5-2004				
	marxa		8-10-1999							marxa		5-9-2004				
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars						
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x			
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta					

El 28-5-2004 observem un poll volander. El 27-8-2004 es veu un jove.

Mastegatatxes (*Ficedula hypoleuca*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant				de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
				x	x			x	x	x						
Dates extremes migrants	arribada		13-4-2003 (PTE)				2004			arribada		16-4-2004 (PTE)				
	marxa		13-5-2001							marxa		14-5-2004 (PTE)				
	arribada		12-8-2003							arribada		27-8-2004				
	marxa		9-10-1998							marxa		30-9-2004				

Ha estat vist tant al pas prenupcial com al pas postnupcial.

Mallerenga cuallarga (*Aegithalos caudatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			x	Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars			x	
	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix			estable			x	augmenta		

El 6-5-2004, 11-5-2004, 25-5-2004 i 10-6-2004 veiem polls volanders. El 30-7-2004 observem un grup de joves.

Mallerenga emplomallada (*Parus cristatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				x	
	conreus i erms			màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional				disminueix		estable		x	augmenta				

El 10-6-2004 i el 27-8-2004 es veuen joves. També s'observen exemplars amb becada o alimentats per adults els dies 7-5-2004 i 9-6-2004 (PTE).

Mallerenga petita (*Parus ater*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars		x
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix				estable		x		augmenta	

El 25-3-2004 canta almenys a 4 territoris diferents. El 28-5-2004 veiem un poll volander.

Mallerenga blava (*Parus caeruleus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta				

El 15-1-2004 hi ha una parella que canta dalt del pal on han fet niu en anys anteriors, van i vénen diverses vegades. El 27-3-2004 es torna a veure una parella al mateix pal on té el niu. El 1-5-2004 es troba un niu. Els dies 9-5-2004 i 12-7-2004 (PTE) es veuen exemplars joves.

Mallerenga carbonera (*Parus major*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100			x
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

El 25-3-2004 una parella construeix niu. El 23-4-2004 intervenen a un niu a l'Albornar. El 25-5-2004 veiem polls volanders. El 22-6-2004 veiem polls volanders.

Raspinell (*Certhia brachydactyla*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x		
		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional				disminueix			estable			x		augmenta	

El 7-5-2004 veiem una parella al niu. El 23-5-2004 (PTE) un adult amb becada entra al niu.

Teixidor (*Remiz pendulinus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x		x					x	x	x
Dates extremes	marxa		27-3-2004		2004		marxa		27-3-2004			
hivernants	arribada		23-10-2004				arribada		23-10-2004			

Com en anys anteriors s'ha anat veient a l'hivern. Enguany s'ha detectat la presència d'almenys uns 8 exemplars junts, on hi havia exemplars juvenils i adults. Per altra banda se n'han arribat a anellar 15 de diferents, cosa que ens demostra que n'hi ha una quantitat superior a la que es calculava.

Oriol (*oriolus oriolus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				x	x	x	x	x	x					
Dates extremes estivals	arribada		17-4-2004			2004			arribada		17-4-2004			
	marxa		11-9-2004						marxa		11-9-2004			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta			

Hi ha bastantes parelles reproductores establertes a diferents àrees de bosc.

Botxí (*Lanius excubitor*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
	2004		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars			
		conreus i erms			x		màquies i garrigues			x z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional				disminueix		x		estable		x		augmenta	

El 7-5-2001 un adult porta becada.

Capsigrany (*Lanius senator*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x				

Dates extremes estivals	arribada	9-4-2000		2004	arribada	3-5-2004			
	marxa	28-8-2002			marxa	24-8-2004 (PTE)			
Nidificació	Fins el 2004	segura	x	probable		possible		no detectat	
	2004	segura	x	probable		possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants		1 a 10			10 a 100	x	Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars		
	conreus i erms		x	màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional		disminueix		x	estable		x	augmenta	

El 24-6-2004 un exemplar marca territori. Els dies 10-7-2004 i 24-8-2004 (PTE) es veuen polls volanders o joves alimentats per exemplars adults.

Gaig (*Garrulus glandarius*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004	segura	x	probable		possible		possible		no detectat			
	2004	segura	x	probable		possible		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants		1 a 10				10 a 100	x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles			pinedes i alzinars			x		
	conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional		disminueix				estable			x	augmenta			

El 1-7-2004 s'observa un poll volander. Els dies 22-4-2004 i 10-7-2004 (PTE) s'observen polls volanders i joves.

Garsa (*Pica pica*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004	segura	x	probable		possible		possible		no detectat			
	2004	segura	x	probable		possible		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants		1 a 10				10 a 100	x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars					
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional		disminueix				estable			x	augmenta			

El 23-4-2004 es situen nius on hi ha activitat. El 25-5-2004 veiem polls volanders. El 10-7-2004 veiem exemplars joves.

Gralla (*Corvus monedula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x			x	x		x	
Nidificació	Fins el 2004	segura	x	probable		possible		possible		no detectat			
	2004	segura		probable		possible		possible		no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants		1 a 10			x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional		disminueix			x	estable				augmenta			

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1999, 2000 i 2001.

Corb (*Corvus corax*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura	x		probable			possible			no detectat	
	2004		segura			probable			possible			no detectat	x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10	x			10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents			zones urbanes					rupícoles	x			pinedes i alzinars	
de cria			conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional				disminueix	x			estable				augmenta	

Es va observar els dies 11-3-2004, 3-4-2004 i 15-10-2004. També ens informen de l'avistament d'un adult amb becada el 30-4-2004 (PTE) que marxa cap a Olèrdola.

Estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*)

Fenologia	sedentari	x		estival			hivernant	x		de pas	x		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura	x		probable			possible			no detectat		
	2004		segura	x		probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100	x	
Hàbitats preferents			zones urbanes	x				rupícoles				pinedes i alzinars		
de cria			conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix				estable	x			augmenta		

S'observa tot l'any, a l'hivern es pot trobar en estols molt nombrosos.

Estornell negre (*Sturnus unicolor*)

Fenologia	sedentari	x		estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura	x		probable			possible			no detectat		
	2004		segura	x		probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100	x	
Hàbitats preferents			zones urbanes	x				rupícoles				pinedes i alzinars		
de cria			conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix				estable	x			augmenta		

El 17-4-2004 almenys 5 exemplars construeixen niu a cal Bladet i a la presa. El 23-4-2004 construeixen niu per la zona de Penyal. El 28-5-2004 veiem una parella fent una còpula. El 1-7-2004 s'observen polls volanders.

Pardal (*Passer domesticus*)

Fenologia	sedentari	x		estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura	x		probable			possible			no detectat		
	2004		segura	x		probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100	x	
Hàbitats preferents			zones urbanes	x				rupícoles				pinedes i alzinars		
de cria			conreus i erms	x				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional				disminueix	x			estable	x			augmenta		

La població d'aquest ocell sembla iniciar una petita davallada, sense que per ara sigui preocupant.

Pardal xarrec (*Passer montanus*)

Fenologia	sedentari	x		estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nidificació	Fins el 2004		segura	x		probable			possible			no detectat		
	2004		segura	x		probable			possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants	1 a 10		10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		x	rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms		x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional	disminueix		estable		x	augmenta	

El 15-1-2004 s'observa una parella que porta materials per fer niu.

Pardal roquer (*Petronia petronia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles			x	pinedes i alzinars			
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional				disminueix			estable		x	augmenta			

El 1-2-2004 una parella sembla mostrar alguna actitud de zel.

Pinsà (*Fringilla coelebs*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x			x			x	x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		3-4-2004			2004			marxa		3-4-2004		
	arribada		24-9-2003						arribada		9-10-2004		

Sovint passen el dia en zona de conreus i entren al capvespre cap els boscos. El 1-2-2004 uns 80 exemplars entren a ajocar-se de les terres de conreu cap a les muntanyes del Parc. El 25-3-2004 en veiem una trentena.

Pinsà mec (*Fringilla montifringilla*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
	x											x		

El 5-1-2004 (PTE) es veuen dos exemplars en un lledoner a prop de cal Bladet.

Gafarró (*Serinus serinus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars			x
		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta		

El 22-6-2004 veiem alguns adults peixant polls volanders. El 4-8-2004 es veuen joves.

Verdum (*Carduelis chloris*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat		
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants	1 a 10		10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		x	rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms		x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional	disminueix		estable		x	augmenta	

El 25-3-2004 uns 20 exemplars entren a ajocar-se de les terres de conreu cap a les muntanyes del Parc. Els dies 16-3-2004 i 27-3-2004 s'observen exemplars amb actituds de zel. El 1-7-2004 i 4-8-2004 s'observen joves.

Cadernera (*Carduelis carduelis*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars				x	
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta				

El 3-4-2004 un centenar o més d'exemplars en estols de 10 a 20 entra a ajocar-se als boscos provenen de les terres de conreu. El 31-5-2004 es troba un niu. El 22-6-2004, el 24-6-2004, el 1-7-2004, el 15-7-2004 i el 4-8-2004 s'observen joves.

Lluer (*Carduelis spinus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x	x	x							x	x	x
Dates extremes	marxa		12-3-1998		2004		marxa		14-2-2004			
hivernants	arribada		12-10-2002				arribada		15-10-2004			

Com en anys anteriors ha estat observat durant l'hivern i en el pas de tardor.

Passerell (*Carduelis cannabina*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms				màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta				

El 3-4-2004 uns 40 exemplars entren a ajocar-se als boscos provenen de les terres de conreu. El 13-6-2004 (PTE) es localitza un niu amb 5 ous prop de la Casa Alta. El 7-7-2004 observem exemplars joves que han sortit del niu fa molt poc.

Trencapinyes (*Loxia curvirostra*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x			x	x	x		x			

No observat el 2004. Darreres observacions anys 2001, 2002 i 2003

Pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	--	---

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	x											

Es van escoltar les seves veus els dies 15-1-2004 i 17-1-2004. Feia molts anys que no es citava aquest ocell al Parc del Foix.

Durbec (*Coccothraustes coccothraustes*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x							x	x	x			
Dates extremes hivernants	marxa		27-3-2004				2004				marxa		27-3-2004		
	arribada		28-10-2000								arribada		4-11-2004		

Els tres primers mesos de l'any es va anar observant força, en canvi a finals d'any ha estat vist sols un dia.

Sit blanc (*Plectrophenax nivalis*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	x													

El 15-1-2004 s'observa una femella junt amb pinsans i titelles al camp del costat de l'observatori. Aquesta és la primera citació d'aquesta espècie al Parc del Foix, i una de les poques de què es disposa a les comarques de l'entorn. Es tracta d'una espècie que pot arribar a les nostres terres desplaçada pels freds el nord.

Verderola (*Emberiza citrinella*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			x											x	

No observat el 2004. Darreres observacions anys 2001, 2002 i 2003.

Gratapalles (*Emberiza cirulus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix				estable		x	augmenta				

El 3-5-2004 , i el 3-6-2004 veiem un adult que porta becada. El 27-8-2004 observem un grup de joves.

Sit negre (*Emberiza cia*)

Fenologia	sedentari	?	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	x	x	x		x					x	x	x				
Nidificació	Fins el 2004			segura			probable		x	possible			no detectat			
	2004			segura			probable			possible			no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms					màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				

A l'època hivernal ha estat molt poc vist.

Hortolà (*Emberiza hortulana*)

Fenologia	sedentari			estival		?	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
					x										
Nidificació	Fins el 2004		segura			probable		x	possible			no detectat			
	2004		segura			probable			possible			no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		?		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
		conreus i erms					màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera			

No observat el 2004. Darreres observacions any 2003.

Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	x	x	x							x	x	x	
Dates extremes hivernants	marxa		18-3-1999			2004			marxa		4-3-2004		
	arribada		20-10-1998						arribada		28-10-2004		

Els dies 17-1-2004 i 3-2-2004 surten uns 200 exemplars dels dormiders. El dia 23-12-2004 hi ha un mínim de 100 exemplars a les joques. Destaquem l'anellament de més de dos cents exemplars d'aquesta espècie, la recuperació el 4-3-2004 d'un exemplar anellat a Suècia i l'anellament d'un exemplar de la subespècie "*witherbyi*" (MOV).

Cruixidell (*Miliaria calandra*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	x	x	x	x	x	x				x	x	x			
Nidificació	Fins el 2004		segura		x	probable			possible			no detectat			
	2004		segura			probable			possible			no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional				disminueix		x		estable				augmenta			

A diferència dels darrers anys no s'ha localitzat com a nidificant, sols a l'hivern.

- Espècies al·lòctones -

Ànec carolí (*Aix sponsa*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			x	x									

No observat el 2004. Darreres observacions any 2002.

Ànec mandarí (*Aix galericulata*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
	x	x	x		x	x		x	x		x	x							

No observat el 2004. Darreres observacions any 2003.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	exo
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	-----

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2004. Darreres observacions any 2001.

Lloro de la Patagònia (*Cyanoliseus patagonus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
							x						

No observat el 2004. Darreres observacions any 2001.

Cotorra de pit gris (*Myiopsitta monachus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					x			x				

No observat el 2004. Darreres observacions anys 1998 i 2000.

Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
								x				

S'observa en dues ocasions; el 9-8-2004 un exemplar al pont de Castellet i el 14-8-2004 un exemplar passa volant pel turó de les Tres Partions. Es tracta d'una espècie exòtica, les observacions molt possiblement són d'exemplars escapats de gàbies.

Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves (*Lamprotornis chalybaeus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
													x						

El 8-12-2004 s'observa un exemplar a prop dels Monjos. Els dies 1-12-2004 i 3-12-2004 (PTE) ja havia estat observat pels guardes del Parc. Aquestes són les primeres citacions d'aquest ocell exòtic al Parc del Foix, sense cap mena de dubte es tracta d'un exemplar escapat d'alguna gàbia.

Teixidor social (*Ploceus cucullatus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		exo
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
										x			

El 23-10-2004 es senten unes veus estranyes a dins d'un canyar, després de força estona d'esperar a veure què pot ser, ens surt un exemplar d'aquesta espècie, per les veus sembla que n'hi hagi un altre dins el canyar. Aquesta és la primera citació d'aquest ocell exòtic al Parc del Foix, sense cap mena de dubte es tracta d'exemplars escapats d'alguna gàbia.

data	4+1+2004	7+1+2004	15+1+2004	17+1+2004	25+1+2004	1+2+2004	3+2+2004	5+2+2004	10+2+2004	14+2+2004	14+2+2004	19+2+2004	28+2+2004	4+3+2004	9+3+2004	11+3+2004	14+3+2004	16+3+2004	25+3+2004
dia	diumenge	dimecres	dijous	dissabte	diumenge	diumenge	dimarts	dijous	dimarts	dissabte	dissabte	dijous	dissabte	dijous	dimarts	dijous	diumenge	dimarts	dijous
hora	8'20-13h.	9'15-13h.	7'45-13'30h.	8-12'30h.	8'15-12'30h.	16-19h.	8-11h.	15'30-19'30h.	7'50-14'10h.	8'10-13h.	16-17h.	7'30-13'10h.	8'15-10'45h.	15'30-20h.	13'20-14h.	8-13'30h.	16'15-19'30h.	8-8'50h.	7'50-13'20h.
lloc	panrà	panrà	panrà	panrà	parc	parc	panrà	panrà	panrà/parc	panrà	panrà	panrà	panrà	panrà	panrà	parc	parc	panrà	panrà
nivell aigua embassament	ple	ple	ple	ple	sol - mestràl	sol	ple	ple	ple	ple	ple	ple	ple	ple	ple	ple		ple	ple
observacions climatologia	sol	sol	sol	sol - mestràl	sol	sol	sol/boira	sol/boira	sol	sol/núvol	sol/núvol	sol	sol / mestràl	sol	sol	sol		sol	sol
observacions			SOCC	CENS H.															
Podicipediformes																			
Cabusset - Tachybaptus ruficollis	c+c+2+4	c+c+6	x15+1poll	x14			x10	x10	3		1		1	1+2	1				1
Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus																			
Cabussó collnegre - Podiceps nigricollis																			
Pelecaniformes																			
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo	150+/-	100+/-	100+/-	231			200+/-	200+/-	100+/-	100+/-	100+/-	100+/-	100+/-	176	40+/-			50+/-	87
Ciconiiformes																			
Bitó - Botaurus stellaris																			
Martinet menut - Ixobrychus minutus																			
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax																			
Martinet ros - Ardeola ralloides																			
Esplugabous - Bubulcus ibis																			
Martinet blanc - Egretta garzetta															1			1	8
Agró blanc - Egretta alba																			
Bernat pescaire - Ardea cinerea	15+/-	7	10+/-	x22			9	10+/-	12	16	10	x10	15+/-	17	6			2	18
Agró roig - Ardea purpurea																			
Cigonya negra - Ciconia nigra																			
Cigonya blanca - Ciconia ciconia																			
Becplaner - Platalea leucorodia																			
Anseriformes																			
Anec blanc - Tadorna tadorna																			
Anec carolí - Aix sponsa																			
Anec mandari - Aix galericulata																			
Anec xiulador - Anas penelope																			
Anec griset - Anas strepera																			
Xarxet - Anas crecca		p v	3 (2m,1f)				3(2m,1f)	v		1f									
Anec collverd - Anas platyrhynchos	20+/-	p+p+12	10+/-	96			6p	2+2	10p	12p	2	x10	5+4p	4p	3p	1m		10p	2p+8m
Anec cuallarg - Anas acuta																			
Xarrasclet - Anas querquedula																			
Anec cullerot - Anas clypeata																			
Xibec - Netta rufina																			
Morell cap-roig - Aythya ferina																			
Morell xocolater - Aythya niroca																			
Morell de plomall - Aythya fuligula																			
Morell d'ulls grocs - Bucephala clangula																			
Bec de serra mitjà - Mergus serrator																			
Accipitriformes																			
Aligot vesper - Pernis apivorus																			
Milà negre - Milvus migrans																			
Milà reial - Milvus milvus																			
Voltor comú - Gyps fulvus																			
Àliga marcenca - Circaetus gallicus																			1
Arpella vulgar - Circus aeruginosus																			
Arpella pàl·lida - Circus cyaneus																			
Esparver cendrós - Circus pygargus																			
Astor - Accipiter gentilis									1										
Esparver vulgar - Accipiter nisus							3(p+1)							1+1		1	1		
Aligot - Buteo buteo	1+1+2	1+1	x3+4	1+1	p zel		1+1	1+1	1	1		1+3	1	1+1		1+1			1+2
Àliga daurada - Aquila chrysaetos																			
Àliga calçada - Hieraaetus pennatus																			
Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus																			
Pandionidae																			
Àliga pescadora - Pandion haliaetus																		1+1	
Falconiformes																			
Xoriguer petit - Falco naumanni																			
Xoriguer - Falco tinnunculus	1+1	x3	1+1	1+1	1+1		p+p		1	1+p						p+1			1+2
Falcó cama-roig - Falco vespertinus																			
Esmerla - Falco columbarius																	1		
Falcó mostatxut - Falco subbuteo																			
Falcó de la reina - Falco eleonorae																			
Falcó pelegrí - Falco peregrinus					1														
Gal·liformes																			

data	4+1+2004	7+1+2004	15+1+2004	17+1+2004	25+1+2004	1+2+2004	3+2+2004	5+2+2004	10+2+2004	14+2+2004	14+2+2004	19+2+2004	28+2+2004	4+3+2004	9+3+2004	11+3+2004	14+3+2004	16+3+2004	25+3+2004
Perdiu - Alectoris rufa		2				3			c+1				p						
Guatlla - Coturnix coturnix																			
Faisà - Phasianus colchicus																			
Gruiformes																			
Rasció - Rallus acuaticus	v+v		vx3	x6			vx4	v	v+v	1		vx4	v	v+v	v				v+1
Polla pintada - Porzana porzana																			1
Rascletó - Porzana parva																			
Rasclet - Porzana pusilla																			
Guatlla maresa - Crex crex																			
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	20+/-	x5	20+/-	x45	1		x50+/-	20+/-	30+/-	30+/-	15	vs	40+/-	x20	10+/-			10+/-	20
Fotja - Fulica atra	25+/-	3+4+2	20+/-	x39			x15	10+/-	14	7p	15	vs	20+/-	x20	6			10+/-	8t+1niu
Fotja banyuda - Fulica cristata																			
Grua - Grus grus																			
Sisó - Tetrax tetrax																			
Caradriformes																			
Camesllargues - Himantopus himantopus																			4
Torlit - Burhinus oedicnemus																			
Coriol petit - Charadrius dubius																			
Coriol gros - Charadrius hiaticula																			
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																			
Fredulega - Vanellus vanellus									52	50+/-		30+/-							
Territ menut - Calidris minutus																			
Territ de temminck - Calidris temminckii																			
Territ becllarg - Calidris ferruginea																			
Territ variant - Calidris alpina																			
Becadell sord - Lymnocyrtus minimus																			
Becadell comú - Gallinago gallinago				1					3	1+3		3	2	1			1		1
Becada - Scolopax rusticola			1																
Tétol cuanegre - Limosa limosa																			
Tétol cuabarrat - Limosa lapponica																			
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																			
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																			
Gamba verda - Tringa nebularia																			
Xivita - Tringa ochropus																			1v+1
Valona - Tringa glareola																			
Xivitona - Actitis hypoleucos																			
Gavina menuda - Larus minutus																			
Gavina vulgar - Larus ridibundus																			
Gavià fosc - Larus fuscus																			
Gavià argentat - Larus cachinnans																			
Xatrac gros - Sterna caspia																			
Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus																			
Fumarell negre - Chlidonias niger																			
Columbiformes																			
Colom roquer - Columba livia				6	150+/-	x2	3		2	4		4	2	3		200+/-	1	5	4
Xixela - Columba oenas																			
Tudó - Columba palumbus	1 zel	7+4	x128	2+60+6	x4	2+1+1	2+2+60+/-	1+2	1+2+40+6	3+4+33+8	2	4+27+6+4	30+4	30+5+60	3+4	c+c+30	1	c+8+17	4+120+p+c
Tórtora turca - Streptopelia decaocto					80+/-											2+2	2		
Tórtora - Streptopelia turtur																			
Psittacidae																			
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																			
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																			
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																			
Inseparable de Fischer - Agapornis fischeri																			
Cuculiformes																			
Cucut reial - Clamator glandarius																			
Cucut - Cuculus canorus																			
Estrigiformes																			
Óliba - Tyto alba																egr.			
Xot - Otus scops																			
Duc - Bubo bubo																			
Mussol - Athene noctua																			
Gamarús - Strix aluco																			
Mussol banyut - Asio otus																			
Caprimulgiformes																			
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus																			
Siboc - Caprimulgus ruficollis																			
Apodiformes																			
Ballester - Apus melba																	6+/-		19 migr
Falciot negre - Apus apus																			

data	4+1+2004	7+1+2004	15+1+2004	17+1+2004	25+1+2004	1+2+2004	3+2+2004	5+2+2004	10+2+2004	14+2+2004	14+2+2004	19+2+2004	28+2+2004	4+3+2004	9+3+2004	11+3+2004	14+3+2004	16+3+2004	25+3+2004
Tallareta vulgar - Sylvia communis																			
Tallarol gros - Sylvia borin																			
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	x20	x20	x12	x15			x8	x3	x8	x5		x12		x11		v	v		x8
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli																			
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																			
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	x8	1	x6	x3	x30	x4	3+2+2	x4	x3	c+c		1+c	1+1	1	c	v+c	v	v	x30
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus																			
Reietó - Regulus regulus																			1v
Bruet - Regulus ignicapillus			1+2		1+2	v			c+2					v	v	c	c		x3
Muscicapidae																			
Papamosques gris - Muscicapa striata																			
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca																			
Paridae																			
Mallerega cuallarga - Aegithalos caudatus	v+v	v	x14	x3	v+v	v+vs	v+v	vs	v+2	v+v		v	v	x9	v	v	v	v	p+1
Mallerega emplomada - Parus cristatus	v	v	x15		vx3	x4		v	v		vs+vs			v	v		v		v+v
Mallerega petita - Parus ater			1+1v		c+c									v					cx4
Mallerega blava - Parus caeruleus	1+1	2	x4	v+2	2			1	v+v	x5		x6		p	x4		1		v
Mallerega carbonera - Parus major	v+1	c+v	x7	vs	vx4	x2	c+c+v	v+v	x3	v+2	c	c	v	v	x3	v	v+c	v	c
Certhiidae																			
Raspinell - Certhia brachydactyla	1+1	x4	x13	x3	v	v+v	x4	x4	x40	v+c	v	vx3	v+v	x5	c	c+c	v	v+v	cx10
Remizidae																			
Teixidor - Remiz pendulinus			4	4vs								vs+vs+1							
Oriolidae																			
Oriol - Oriolus oriolus																			
Laniidae																			
Botxí - Lanius excubitor		1							2v+v+v										
Capsigrany - Lanius senator																			
Corvidae																			
Gaig - Garrulus glandarius	1	v+1	x6		1+2	1	1	v	1	v+v		v+1	2			1+1	v+3		1+1
Garsa - Pica pica	v+2	1	1+1		2+2	v	2		1	v			2				2+2	2	1
Gralla - Corvus monedula																			
Corb - Corvus corax																	2		
Sturnidae																			
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris	alguns	alguns	20+/-	alguns	alguns		alguns		alguns								alguns		alguns
Estornell negre - Sturnus unicolor	alguns	alguns	20+/-		alguns		alguns		alguns	alguns			14	alguns		alguns	alguns	alguns	
Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolornis chalybaeus																			
Passeridae																			
Pardal - Passer domesticus	alguns	alguns	18	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns		alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns
Pardal xarrec - Passer montanus	x10		p mat						1	1		x4		v		6		1	2+2
Pardal roquer - Petronia petronia						6		1											
Ploceidae																			
Teixidor social - Ploceus cucullatus																			
Fringillidae																			
Pinsà - Fringilla coelebs	abundant	abundant	x250+/-	x30+/-	30+20	x80	abundant	abundant	abundant	x30		alguns	alguns	alguns		v		alguns	1
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																			v
Gafarró - Serinus serinus	x5+/-	x10	x47	x40+/-	x20	x10	x20	x10	x20	x50+/-	c	x10	v	cx4	c+c	60+c+c	x6	cx4	x40
Verdum - Carduelis chloris	x20	v+4	x10	x20	c+c+4		v+c	1	x6	x4	c	x7	v	v	v	20+/-	c+1	1 zel	v+2c
Cadernera - Carduelis carduelis	x40+/-	v	x18	x10	x6	x10	v+2	v+2	x10	v+2+2	vs	x10	v+4	x6	v+v	x4	3	v	c+2
Lluer - Carduelis spinus	v+v									1									
Passerell - Carduelis cannabina	1v	x40				x24	v+v	vs	1	v+2						3c			
Trencapinyes - Loxia curvirostra																			
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula			v+v	v															
Durbec - Coccothraustes coccothraustes	1			2+3			2			2		1+1v	5						1
Embericidae																			
Sit blanc - Plectrophenax nivalis			1																
Verderola - Emberiza citrinella																			
Gratapalles - Emberiza cirius	1+1	c+1	c	v+v	c+2		c+1		2	c+1						c			
Sit negre - Emberiza cia			1		2					1									
Hortolà - Emberiza hortulana																			
Repicatalons - Emberiza schoeniclus	v		10+/-	200+/-			200+/-			v		x20		200+/-					
Cruixidell - Milvina calandra										1v				5					
Espècies no identificades																			
falcònid sp.																			
rapinyaire sp.																			
TOTAL	54	46	53	44	39	29	47	37	52	51	20	41	39	43	32	41	34	32	54

data	25+3+2004	27+3+2004	1er.	3+4+2004	6+4+2004	9+4+2004	11+4+2004	17+4+2004	23+4+2004	24+4+2004	1+5+2004	2+5+2004	3+5+2004	4+5+2004	6+5+2004	7+5+2004	11+5+2004	21+5+2004	25+5+2004
Perdiu - Alectoris rufa								p+p								1			
Guatlla - Coturnix coturnix																			
Faisà - Phasianus colchicus									1m										
Gruiformes																			
Rascló - Rallus acuaticus		v			v														
Polla pintada - Porzana porzana		1																	
Rascletó - Porzana parva																			
Rasclet - Porzana pussilla																			
Guatlla maresa - Crex crex																			
Polla d'aigua - Gallinula chloropus		x34			x20+/-	x10		1		10	v+1	v	vs	20+/-	v		v	v+v	x6+ niu
Fotja - Fulica atra		x10+niu			x6	x8+ niu		2 nius		6+nius	1polls+1polls	2	1	10+/-	5		2	1f 5 polls	
Fotja banyuda - Fulica cristata																			
Grua - Grus grus																			
Sisó - Tetrao tetrao																			
Caradriformes																			
Cameslargues - Himantopus himantopus		1+4	X		1			1			1								
Torlit - Burhinus oedicnemus																			
Coriol petit - Charadrius dubius			X	2										v					
Coriol gros - Charadrius hiaticula																			
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																			
Fredulega - Vanellus vanellus																			
Territ menut - Calidris minutus																			
Territ de temminck - Calidris temminckii																			
Territ beclarg - Calidris ferruginea																			
Territ variant - Calidris alpina																			
Becadell sord - Lymnocyrtus minimus																			
Becadell comú - Gallinago gallinago		1	X			1				1									
Becada - Scolopax rusticola																			
Tètol cuanegre - Limosa limosa																			
Tètol cuabarrat - Limosa lapponica																			
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																			
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																			
Gamba verda - Tringa nebularia																			
Xivita - Tringa ochropus		1	X		4	1		3											
Valona - Tringa glareola																			
Xivitona - Actitis hypoleucos								5			8			v+1	1			3	
Gavina menuda - Larus minutus																			
Gavina vulgar - Larus ridibundus																			
Gavià fosc - Larus fuscus																			
Gavià argentat - Larus cachinnans																			
Xatrac gros - Sterna caspia																			
Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus										1									
Fumarell negre - Chlidonias niger																			
Columbiformes																			
Colom roquer - Columba livia	20+/-	3		5	6		4	2	20+/-	1+4					5				15+/-
Xixela - Columba oenas							1			1c+1									
Tudó - Columba palumbus	p	x12+70		1+2+5+1	c+2+2	c+c+p+20	1	c+c+1+2	1+1	c+1	2+2	c	c+c	x9	p+p+1	p niu + 1 zel	p+p	2	x4
Tórtora turca - Streptopelia decaocto				c	c			c	p zel+p+p										
Tórtora - Streptopelia turtur									1		c+2	c	c+2			1+1			c+c+5
Psittacidae																			
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																			
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																			
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																			
Inseparable de Fischer - Agapornis fischeri																			
Cuculiformes																			
Cucut reial - Clamator glandarius					1v														
Cucut - Cuculus canorus					c			c	1			c		c+1		c+c	1+1		1
Estrigiformes																			
Óliba - Tyto alba																			
Xot - Otus scops								c											
Duc - Bubo bubo																			
Mussol - Athene noctua																			
Gamarús - Strix aluco																			
Mussol banyut - Asio otus																			
Caprimulgiformes																			
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus																			c
Siboc - Caprimulgus ruficollis																			1+1
Apodiformes																			
Ballester - Apus melba			X					2+4	p+p+1		2					4			
Falcot negre - Apus apus				1+1+12+1		alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	x186	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns

data	25+3+2004	27+3+2004	1er.	3+4+2004	6+4+2004	9+4+2004	11+4+2004	17+4+2004	23+4+2004	24+4+2004	1+5+2004	2+5+2004	3+5+2004	4+5+2004	6+5+2004	7+5+2004	11+5+2004	21+5+2004	25+5+2004
Tallareta vulgar - Sylvia communis								1	1+1										
Tallarol gros - Sylvia borin																			
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla		x4	X	1	v+2	v+v	x4	x8	c+c+1					x6		c		c	x8
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli					c+c			p+cx5	cx4			c	c	x8					
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																			
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	x10	x5			c		x4					1		1					
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus				1			1												
Reietó - Regulus regulus																			
Bruel - Regulus ignicapillus				v	c			x4	c	c	c	c	v	x5	c				
Muscicapidae																			
Papamosques gris - Muscicapa striata											1			1	1				
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca									1f+1m					x4		1			
Paridae																			
Mallerega cuallarga - Aegithalos caudatus	v+v		X	v+v	v+p	v	v+v	x10	x6	v+v	v	v	x3	x14	js	x4	js		x5+polls
Mallerega emplomallada - Parus cristatus	v			v	1	v	v+v	x3	x3	2		v	x4	x7		x3			v
Mallerega petita - Parus ater			X					v+v											
Mallerega blava - Parus caeruleus		v+1v+p niu	X	x4	v+v	1	v+v		v+v	v	1 niu			v+v				vs+2	v+v
Mallerega carbonera - Parus major	c+v+v	c	X	x10	p+p	1+v	x8	x5	c+c+p niu	c+v	c	c	c	x10	c	x4	c	vs+2	x3+polls
Certhiidae																			
Raspinell - Certhia brachydactyla		v+c		vx6	x12	c+c	x6	x6	x6	v+v	v	c	v	x16	1	c+ niu	c	v+1	x3
Remizidae																			
Teixidor - Remiz pendulinus		3v+1																	
Oriolidae																			
Oriol - Oriolus oriolus								1				c	c+1c	v+1	c	x3	c	c	c
Laniidae																			
Botxí - Lanius excubitor							1	1								1 bec			1
Capsigrany - Lanius senator													1+1	1+2	1	1+1			
Corvidae																			
Gaig - Garrulus glandarius	v			1	v+1		v+2	v	1	v			1	v+v		v+1			1
Garsa - Pica pica	v			2+2	1+1				6+nius	x3			1						polls+2
Gralla - Corvus monedula																			
Corb - Corvus corax				1															
Sturnidae																			
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris		alguns		alguns			alguns	alguns				alguns	1	x9	alguns				
Estornell negre - Sturnus unicolor	alguns	alguns		alguns	alguns	alguns	alguns	x5 nius	nius		alguns	alguns	1	x20					alguns
Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolaima																			
Passeridae																			
Pardal - Passer domesticus	alguns	alguns		alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns		alguns	alguns	vs	x22	alguns		alguns	alguns	alguns
Pardal xarrec - Passer montanus		1+2+6		vs	v	v	4v	p	20			2	1	x6				1v	p
Pardal roquer - Petronia petronia							v+2	14	3										
Ploceidae																			
Teixidor social - Ploceus cucullatus																			
Fringillidae																			
Pinsà - Fringilla coelebs	x30	v		1															
Pinsà mec - Fringilla montifringilla			X																
Gafarró - Serinus serinus	x30	x7		x30	x50	x8	x40+/-	x20	x20	x20	c	c	c+c	x39	1	x30	c	c	x20
Verdum - Carduelis chloris	x20	x5+ zel	X	x30	x20	x10	x8	x11	x15	x4	c	cx3	c+1c	x20	c	x4	c	2c	x8
Cadernera - Carduelis carduelis		x4		x100+/-	x30	x4	x10	x4	x10	v+10	c	v	x3	x24	v	x2	v+2	c+2	x11
Lluer - Carduelis spinus			X																
Passerell - Carduelis cannabina	v+p+p+p+p			x40	v	v+1	x30	x8	1		1		1v	1c		x5			
Trencapinyes - Loxia curvirostra																			
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																			
Durbec - Coccothraustes coccothraustes		3+1+1	X																
Embericidae																			
Sit blanc - Plectrophenax nivalis																			
Verderola - Emberiza citrinella																			
Gratapalles - Emberiza cirius		1		c	cx3	c	x5		p+p+c	c+c+p	c+1	c+1	c bec+c	x3			c	1v	c+c
Sit negre - Emberiza cia			X																
Hortolà - Emberiza hortulana																			
Repicatalons - Emberiza schoeniclus			X																
Cruixidell - Milvina calandra			X																
Espècies no identificades																			
falcònid sp.																			
rapinyaire sp.																			
TOTAL	21	49		49	53	41	44	55	45	39	40	36	43	59	32	36	29	37	42

	28+5+2004	31+5+2004	3+6+2004	10+6+2004	18+6+2004	19+6+2004	22+6+2004	24+6+2004	2n.	1+7+2004	7+7+2004	10+7+2004	15+7+2004	18+7+2004	21+7+2004	23+7+2004	30+7+2004	4+8+2004	9+8+2004
dia	divendres	dilluns	dijous	dijous	divendres	dissabte	dimarts	dijous	trimestre	dijous	dimecres	dissabte	dijous	diumenge	dimecres	divendres	divendres	dimecres	dilluns
hora	6'45-12'45h.	6'15-12h.	6'15-11	17'45-23'45h.	13'30-14	18'15-20'30	17-21h.	10-11h.	dades	7'15-9h.	17-23h.	18'15-20h.	7'45-10'20h.	18'40-21h.	8'20-11h.	11'20-12h.	6-13'30h.	6'55-8'45h.	7-11'45h.
lloc	panà	parc	panà	panà/parc	panà	panà	parc	parc	dels	panà	parc	parc	panà	panà	panà	panà	parc	panà	panà
nivell aigua embassament	ple		ple	ple	ple	ple			col.laboradors	aprx -5cm.				aprx -5cm.	aprx -10cm.	aprx -10cm.			aprx -15cm.
observacions climatologia	clarianes	boires	sol	sol	sol	pluja	núvol	sol		sol	sol	sol	clar	sol	sol	sol	sol		sol / núvol
observacions	SOCC																		
Podicipediformes																			
Cabusset - Tachybaptus ruficollis		C+C									C			C+1+1j	C+1+2	C	1	C+1	5+2
Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus																			
Cabussó collnegre - Podiceps nigricollis																			
Pelecaniformes																			
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo						1	1			3			5	4	2				1
Ciconiiformes																			
Bitó - Botaurus stellaris																			
Martinet menut - Ixobrychus minutus										1 jove									2
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax					1				X				1	1					1
Martinet ros - Ardeola ralloides																			
Esplugabous - Bubulcus ibis																			
Martinet blanc - Egretta garzetta				1					X										
Agró blanc - Egretta alba																			
Bernat pescaire - Ardea cinerea	12		5	3	2	19				6			6	11	6	4		x30	15+/-
Agró roig - Ardea purpurea									X				1j						
Cigonya negra - Ciconia nigra																			
Cigonya blanca - Ciconia ciconia																			
Becplaner - Platalea leucorodia																			
Anseriformes																			
Ànec blanc - Tadorna tadorna																			
Ànec carolí - Aix sponsa																			
Ànec mandari - Aix galericulata																			
Ànec xiulador - Anas penelope																			
Ànec griset - Anas strepera																			
Xarxet - Anas crecca																			
Ànec collverd - Anas platyrhynchos	1		3+4+1	4 js	1	1+1	1			x7		1f polls	5+5	20+/-	15+/-	10+/-	26	vs+1+6	3+1+1
Ànec cuallarg - Anas acuta																			
Xarrasclet - Anas querquedula																			
Ànec cullerot - Anas clypeata																			
Xibec - Netta rufina																			
Morell cap-roig - Aythya ferina																			
Morell xocolater - Aythya niroca																			
Morell de plomall - Aythya fuligula																			
Morell d'ulls grocs - Bucephala clangula																			
Bec de serra mitjà - Mergus serrator																			
Accipitriformes																			
Àligot vesper - Pernis apivorus																			
Milà negre - Milvus migrans										X									
Milà reial - Milvus milvus																			
Voltor comú - Gyps fulvus																			
Àliga marcenca - Circaetus gallicus								1	1	X							p		
Arpella vulgar - Circus aeruginosus																			
Arpella pàl·lida - Circus cyaneus																			
Esparver cendrós - Circus pygargus																			
Astor - Accipiter gentilis																			
Esparver vulgar - Accipiter nisus							p												
Àligot - Buteo buteo	p															1			
Àliga daurada - Aquila chrysaetos																			
Àliga calçada - Hieraaetus pennatus																			
Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus		1									1 juvenil								
Pandionidae																			
Àliga pescadora - Pandion haliaetus																			
Falconiformes																			
Xoriguer petit - Falco naumanni																			
Xoriguer - Falco tinnunculus	1		1	1		1	1	1			1	1					1+1		
Falcó cama-roig - Falco vespertinus																			
Esmerla - Falco columbarius																			
Falcó mostatxut - Falco subbuteo		1									1								
Falcó de la reina - Falco eleonorae																			
Falcó pelegrí - Falco peregrinus																			
Gal·liformes																			

data	28+5+2004	31+5+2004	3+6+2004	10+6+2004	18+6+2004	19+6+2004	22+6+2004	24+6+2004	2n.	1+7+2004	7+7+2004	10+7+2004	15+7+2004	18+7+2004	21+7+2004	23+7+2004	30+7+2004	4+8+2004	9+8+2004
Perdiu - Alectoris rufa	1			rastres	1			10 polls+1									1+polls+polls		
Guatlla - Coturnix coturnix																			
Faisà - Phasianus colchicus																			
Gruiformes																			
Rascló - Rallus acuaticus									X										
Polla pintada - Porzana porzana																			
Rascletó - Porzana parva																			
Rasclet - Porzana pusilla																			
Guatlla maresa - Crex crex																			
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	x6+polls		x10	x6	2	x5				v			v+1	x10+polls	x10	v+v		v+1	x6
Fotja - Fulica atra	x4+polls		p+1	2+1		x5polls+4			X	x10 (polls)			1	x3+polls	4+polls	1+1]		1]	10+/-
Fotja banyuda - Fulica cristata																			
Grua - Grus grus																			
Sisó - Tetrax tetrax																			
Caradriiformes																			
Camesllargues - Himantopus himantopus										X									
Torlit - Burhinus oedicephalus																			
Coriol petit - Charadrius dubius								1	X					v					
Coriol gros - Charadrius hiaticula																			
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																			
Fredulega - Vanellus vanellus																			
Territ menut - Calidris minutus																			
Territ de temminck - Calidris temminckii																			
Territ bec llarg - Calidris ferruginea																			
Territ variant - Calidris alpina																			
Becadell sord - Lymnocyptes minimus																			
Becadell comú - Gallinago gallinago																			
Becada - Scolopax rusticola																			
Tètol cuanegre - Limosa limosa																			
Tètol cuabarrat - Limosa lapponica																			
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																			
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																			
Gamba verda - Tringa nebularia																			
Xivita - Tringa ochropus									X	2									
Valona - Tringa glareola																			
Xivitona - Actitis hypoleucos									X				vs		1			1	1
Gavina menuda - Larus minutus																			
Gavina vulgar - Larus ridibundus																		2	2
Gavià fosc - Larus fuscus																			
Gavià argentat - Larus cachinnans																			
Xatrac gros - Sterna caspia																			
Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus									X										
Fumarell negre - Chlidonias niger									X										
Columbiformes																			
Colom roquer - Columba livia	6	15					50+/-					100+/-	4	10+/-			3		2
Xixella - Columba oenas		1						1									2		
Tudó - Columba palumbus	x14	c+c	x10+zel	x5		c+1+1	1+1	1+1+c		1+2	1+1	x20+/-	1+c+1	c+2	c+1+1	2	x6	1+3+c	1+3
Tórtora turca - Streptopelia decaocto							30+/-					30+/-							
Tórtora - Streptopelia turtur	c	cx4+zel	p+p	c+1			c+1	1c		c	1	1		c			c		1+2+2
Psittacidae																			
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																			
Llor de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																			
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																			
Inseparable de Fischer - Agapornis fischeri																		1	
Cuculiformes																			
Cucut reial - Clamator glandarius																			
Cucut - Cuculus canorus	c	c+c							X	1 jove	1								
Estrigiformes																			
Óliba - Tyto alba																			
Xot - Otus scops																			
Duc - Bubo bubo		2 polls		vs							egagròpies								
Mussol - Athene noctua						1									1				
Gamarús - Strix aluco																			
Mussol banyut - Asio otus	1 mort								X		2 o 3 polls								
Caprimulgiformes																			
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus				x9							x3								
Siboc - Caprimulgus ruficollis																			
Apodiformes																			
Ballester - Apus melba			1	2			8	2				3 t							
Falciot negre - Apus apus	x25	alguns	alguns	alguns	alguns	alguns	nius	alguns	X	alguns	nius	alguns	50+/-	alguns	alguns	alguns	alguns	1	

data	28+5+2004	31+5+2004	3+6+2004	10+6+2004	18+6+2004	19+6+2004	22+6+2004	24+6+2004	2n.	1+7+2004	7+7+2004	10+7+2004	15+7+2004	18+7+2004	21+7+2004	23+7+2004	30+7+2004	4+8+2004	9+8+2004
Tallareta vulgar - Sylvia communis																			
Tallarol gros - Sylvia borin																			
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	x9	cx4	c	x3	c	x6	x4			cx3		c	c	cx4	c+c	c	c	c+vs+1	x4
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli	x11	c	c	c	c		c			c		v	c	c	c+c	c	c+v	c	
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																			
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	c	c																	
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus																			c+1c+1
Reietó - Regulus regulus																			
Bruel - Regulus ignicapillus	x6	c	c	c		c+c	c+c										x4		v+c
Muscicapidae																			
Papamosques gris - Muscicapa striata	2 (1poll)																	v+2polls	1+1
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca										X									
Paridae																			
Mallerenga cuallarga - Aegithalos caudatus	x9	vs	x3	v+v+js	vs	v	v+v		X	vs			vs	v	v+v	1	4+js	vs	
Mallerenga emplomallada - Parus cristatus	x9	x4	x4	x3+js	2	v	v+v	v+2	X			v					x4		v
Mallerenga petita - Parus ater	1 poll																		
Mallerenga blava - Parus caeruleus	x2					v			X	v			p	v	v			vs	x4
Mallerenga carbonera - Parus major	x10	x8	x2	v+v		v	polls		X		v		vs+p	v	v		v	vs	v+v
Certhiidae																			
Raspinell - Certhia brachydactyla	x15	x4	x4	x3	c	x4	x5	v+1	X	v+v	v+v		v	v	v		v+v	v	v
Remizidae																			
Teixidor - Remiz pendulinus																			
Oriolidae																			
Oriol - Oriolus oriolus	c+c	cx3	x3			v		c		c+1+1	v+1	c	v		v	1	v	v	x6
Laniidae																			
Botxi - Lanius excubitor																	2		
Capsigrany - Lanius senator	1		1+1		1	1		1 t						2			2		
Corvidae																			
Gaig - Garrulus glandarius	1		1	1		1	1		X	1 poll			1		v		x4		1
Garsa - Pica pica			1			2	1+2	v		1		vs		1			1		1
Gralla - Corvus monedula																			
Corb - Corvus corax									X										
Sturnidae																			
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris													8+/-		alguns				alguns
Estornell negre - Sturnus unicolor	x26		alguns	alguns		alguns	alguns		X	polls								2	alguns
Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolaima																			
Passeridae																			
Pardal - Passer domesticus	x24	alguns	alguns			alguns	alguns	alguns	X	alguns	alguns	alguns	vs	alguns	alguns	alguns	alguns	vs	alguns
Pardal xarrec - Passer montanus	x5	v+2	1							v+1v			1	1	1+1		1	2+v	1+4
Pardal roquer - Petronia petronia								10+/-						1			2		
Ploceidae																			
Teixidor social - Ploceus cucullatus																			
Fringillidae																			
Pinsà - Fringilla coelebs																			
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																			
Gafarró - Serinus serinus	x47	x20	x30	x10	c	x4	x20+polls	3+2	X	c	v	v+v	1mc	v+v			x10	vs+js	x10
Verdum - Carduelis chloris	x13	x10	x20	c		x6	x8	c+2	X	js	v	2	v+c	c+4	v		10+/-	vs+js	x5
Cadernera - Carduelis carduelis	x20	x4+niu	x20	x4		v	js+js+2	v+js	X	c+js	v	v	v+c+js	v+4	v		1+2	c+vs+js	v+1+1
Lluer - Carduelis spinus																			
Passerell - Carduelis cannabina	x3	x15	1					v+v	X		vs+1+7js	v					x3		
Trencapinyes - Loxia curvirostra																			
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																			
Durbec - Coccythraustes coccythraustes																			
Embericidae																			
Sit blanc - Plectrophenax nivalis																			
Verderola - Emberiza citrinella																			
Gratapalles - Emberiza cirius	x12	c	x5+ 1 bec	c		c	v+c	v+c	X	c		c+c+1	c		c	c	c	c+1	1
Sit negre - Emberiza cia																			
Hortolà - Emberiza hortulana																			
Repicatalons - Emberiza schoeniclus																			
Cruixidell - Miliaria calandra																			
Espècies no identificades																			
falcònid sp.																			
rapinyaire sp.																			
TOTAL	54	39	47	39	20	40	40	33		39	29	26	42	40	34	23	43	37	49

	14+8+2004	19+8+2004	21+8+2004	21+8+2004	27+8+2004	28+8+2004	4+9+2004	5+9+2004	10+9+2004	11+9+2004	12+9+2004	16+9+2004	18+9+2004	18+9+2004	19+9+2004	19+9+2004	20+9+2004	23+9+2004	25+9+2004
data	dissabte	dijous	dissabte	dissabte	divendres	dissabte	dissabte	diumenge	divendres	dissabte	diumenge	dijous	dissabte	dissabte	diumenge	diumenge	dilluns	dijous	dissabte
hora	10-14h.	7'40-9'50h.	7'10-9'20h.	10-14h.	8'45-10'45h.	10-14h.	10-14h.	18'15-20'45h.	7'40-11'20h.	9'40-14h.	10'20-13'20h.	13'05-16'15h.	9'30-14'30	16'45-19'10h.	10-13h.	16'20-19'25h.	10'50-13'35h.	8'40-11'55h.	8-9'20h.
lloc	parc	panrà	panrà	parc	panrà	parc	parc	parc	panrà	parc	parc	parc	parc	parc	parc	parc	parc	parc	panrà
nivell aigua embassament		aprx -30cm.	aprx -15cm.		aprx -40cm.				ple										
observacions climatologia	sol / núvol	sol	sol	sol	sol / núvol	núvol	mig tapat	sol	núvol	núvol	sol / núvol	clar	clar	clar	núvol	núvol	tapat	clar	tapat
observacions	PERNIS			PERNIS													plugim		
Podicipediformes																			
Cabusset - Tachybaptus ruficollis		x9+ polls	c		14				x20										4(2ad,2js)
Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus					1														
Cabussó collnegre - Podiceps nigricollis																			
Pelecaniformes																			
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo		9	7		13				31				1 migr			3 migr	12 migr		47
Ciconiiformes																			
Bitó - Bataurus stellaris																			
Martinet menut - Ixobrychus minutus																			
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax			1		1				3										
Martinet ros - Ardeola ralloides																			
Esplugabous - Bubulcus ibis																			
Martinet blanc - Egretta garzetta		2	x10		8				7										x3
Agró blanc - Egretta alba																			
Bernat pescaire - Ardea cinerea		24	x13		20+/-				30+/-										13+5
Agró roig - Ardea purpurea																			1
Cigonya negra - Ciconia nigra																			
Cigonya blanca - Ciconia ciconia																			
Becplaner - Platalea leucorodia																			
Anseriformes																			
Ànec blanc - Tadorna tadorna																			
Ànec carolí - Aix sponsa																			
Ànec mandari - Aix galericulata																			
Ànec xiulador - Anas penelope																			
Ànec griset - Anas strepera																			
Xarxet - Anas crecca																			
Ànec collverd - Anas platyrhynchos		8	7					3+3+1	4+11+20										
Ànec cuallarg - Anas acuta																			
Xarrasclet - Anas querquedula																			
Ànec cullerot - Anas clypeata																			
Xibec - Netta rufina																			
Morell cap-roig - Aythya ferina																			
Morell xocolater - Aythya niroca																			
Morell de plomall - Aythya fuligula																			
Morell d'ulls grocs - Bucephala clangula																			
Bec de serra mitjà - Mergus serrator																			
Accipitriformes																			
Àligot vesper - Pernis apivorus							1 migr			x11 migr	2 migr	x395 migr	x40 migr	x139 migr	x8 migr	x50 migr	3 migr	x8 migr	
Milà negre - Milvus migrans																			
Milà reial - Milvus milvus														1 migr					
Voltor comú - Gyps fulvus																			
Àliga marcenca - Circaetus gallicus	2			1+1+3	1v		1			1 migr	1					1 migr			
Arpella vulgar - Circus aeruginosus								1 migr		x2 migr		x4 migr	x2 migr	x7 migr		x54 migr			
Arpella pàl.lida - Circus cyaneus										1 migr				1 migr		x8 migr			
Esparver cendrós - Circus pygargus							1 migr												
Astor - Accipiter gentilis				1										1 alliberat					
Esparver vulgar - Accipiter nisus		1		x2 migr		x3 migr	x2 migr			x5 migr +1	x 2 migr	x7 migr	x3 migr	x7 migr	x4 migr	1 migr			
Àligot - Buteo buteo																			
Àliga daurada - Aquila chrysaetos																			
Àliga calçada - Hieraaetus pennatus														1 migr					
Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus						1				p		1	p						
Pandionidae																			
Àliga pescadora - Pandion haliaetus										1 migr						1 migr			
Falconiformes																			
Xoriguer petit - Falco naumanni																			
Xoriguer - Falco tinnunculus	2			1	1	1	1+1		1	1+1	1	x8 migr	x3 migr	x17 migr	1 migr	x6 migr	1+1	1 migr	
Falcó cama-roig - Falco vespertinus													2 migr						
Esmerla - Falco columbarius																			
Falcó mostatxut - Falco subbuteo						1				1 migr	1	x6 migr				1 migr	1 migr	1 migr	
Falcó de la reina - Falco eleonorae	1 migr																		
Falcó pelegrí - Falco peregrinus																			
Gal.liformes																			

data	14+8+2004	19+8+2004	21+8+2004	21+8+2004	27+8+2004	28+8+2004	4+9+2004	5+9+2004	10+9+2004	11+9+2004	12+9+2004	16+9+2004	18+9+2004	18+9+2004	19+9+2004	19+9+2004	20+9+2004	23+9+2004	25+9+2004
Perdiu - Alectoris rufa	1			1															
Guatlla - Coturnix coturnix																			
Faisà - Phasianus colchicus																			
Gruidiformes																			
Rascló - Rallus acuaticus									v										v
Polla pintada - Porzana porzana																			
Rascletó - Porzana parva																			
Rasclet - Porzana pussilla																			
Guatlla maresa - Crex crex																			
Polla d'aigua - Gallinula chloropus		x6	v+1		20+/-				10										x5+js
Fotja - Fulica atra		x4	1		20+/-				10										v
Fotja banyuda - Fulica cristata																			
Grua - Grus grus																			
Sisó - Tetraex tetraex																			
Caradriformes																			
Cameslargues - Himantopus himantopus																			
Torlit - Burhinus oedinenus																			
Coriol petit - Charadrius dubius																			
Coriol gros - Charadrius hiaticula																			
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																			
Fredulega - Vanellus vanellus																			
Territ menut - Calidris minutus																			
Territ de temminck - Calidris temminckii																			
Territ beclarg - Calidris ferruginea																			
Territ variant - Calidris alpina																			
Becadell sord - Lymnocyptes minimus																			
Becadell comú - Gallinago gallinago																			
Becada - Scolopax rusticola																			
Tètol cuanegra - Limosa limosa																			
Tètol cuabarrat - Limosa lapponica																			
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																			
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																			
Gamba verda - Tringa nebularia																			
Xivita - Tringa ochropus					1v														
Valona - Tringa glareola																			
Xivitona - Actitis hypoleucos		v	1																
Gavina menuda - Larus minutus																			
Gavina vulgar - Larus ridibundus		40+/-	12		90+/-				114										1
Gavià fosc - Larus fuscus																			
Gavià argentat - Larus cachinnans																			
Xatrac gros - Sterna caspia																			
Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus																			
Fumarell negre - Chlidonias niger																			
Columbiformes																			
Colom roquer - Columba livia																			
Xixella - Columba oenas								1											
Tudó - Columba palumbus		3+2	5+/-		6+2				1+13+6		2			1	6	1			x30
Tórtora turca - Streptopelia decaocto								2											
Tórtora - Streptopelia turtur	1					3 migr													
Psittacidae																			
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																			
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																			
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																			
Inseparable de Fischer - Agapornis fischeri	1																		
Cuculiformes																			
Cucut reial - Clamator glandarius																			
Cucut - Cuculus canorus																			
Estrigiformes																			
Óliba - Tyto alba																			
Xot - Otus scops																			
Duc - Bubo bubo																			
Mussol - Athene noctua								1											
Gamarús - Strix aluco																			
Mussol banyut - Asio otus																			
Caprimulgiformes																			
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus																			
Siboc - Caprimulgus ruficollis																			
Apodiformes																			
Ballester - Apus melba	20+/-			1+2			2	10		100+20 migr	80+/-		80+/-	50+/-	250+/-	20+/-	120+/-	30+/-	
Falciot negre - Apus apus	15 migr	alguns	1+50+/-	alguns	alguns	alguns		alguns					alguns	1		1+1 migr			

data	14+8+2004	19+8+2004	21+8+2004	21+8+2004	27+8+2004	28+8+2004	4+9+2004	5+9+2004	10+9+2004	11+9+2004	12+9+2004	16+9+2004	18+9+2004	18+9+2004	19+9+2004	19+9+2004	20+9+2004	23+9+2004	25+9+2004
Tallareta vulgar - Sylvia communis									1										
Tallarol gros - Sylvia borin									2										
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla		x6	x8					v	x6				2						x4
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli			1																
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																			
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita					1														
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus		1	c+1	1	2				4				1						
Reietó - Regulus regulus																			
Bruel - Regulus ignicapillus					c			v	v									vs	
Muscicapidae																			
Papamosques gris - Muscicapa striata		1	v+1		1 poll			1											
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca					1+1				2										
Paridae																			
Mallerenga cuallarga - Aegithalos caudatus		v	vs	v	v	v+6		vs	vs+1	v	v		v+6	vs					vs
Mallerenga emplomallada - Parus cristatus	v	v	vs		js	v		v			v		v+1					v	
Mallerenga petita - Parus ater									c				c						
Mallerenga blava - Parus caeruleus		v+v+1	v		v				v+v										c+v
Mallerenga carbonera - Parus major	v	v	v	1v	v		vs	v	v+v	v		2							v+v
Certhiidae																			
Raspinell - Certhia brachydactyla		v+2	v+v	c	v+v	v	v	x4	c+2							v	v		v+v
Remizidae																			
Teixidor - Remiz pendulinus																			
Oriolidae																			
Oriol - Oriolus oriolus		v+v	v		v+1			1	1	1									
Laniidae																			
Botxí - Lanius excubitor			1										v						
Capsigrany - Lanius senator																			
Corvidae																			
Gaig - Garrulus glandarius		v						3+2	v	v+v	v		v				1	1	
Garsa - Pica pica					v			2			v		v		v				
Gralla - Corvus monedula																			
Corb - Corvus corax																			
Sturnidae																			
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris		alguns	2																30+/-
Estornell negre - Sturnus unicolor																			1
Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolaima																			
Passeridae																			
Pardal - Passer domesticus		alguns	vs+10+/-		alguns			alguns	alguns										10+/-
Pardal xarrec - Passer montanus		v+v	1+v		1				1										8+vs
Pardal roquer - Petronia petronia		1																	
Ploceidae																			
Teixidor social - Ploceus cucullatus																			
Fringillidae																			
Pinsà - Fringilla coelebs																			
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																			
Gafarró - Serinus serinus		1	vs		x4				v								v		v+7+v
Verdum - Carduelis chloris		v+1	vs					v+v	v+v										v
Cadernera - Carduelis carduelis		v+1	5+/-		v			v+v	v									3	vs+vs
Lluer - Carduelis spinus																			
Passerell - Carduelis cannabina						v													
Trencapinyes - Loxia curvirostra																			
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																			
Durbec - Coccothraustes coccothraustes																			
Embericidae																			
Sit blanc - Plectrophenax nivalis																			
Verderola - Emberiza citrinella																			
Gratapalles - Emberiza cirius		c	vs		4js			c+2	c										c+v
Sit negre - Emberiza cia																			
Hortolà - Emberiza hortulana																			
Repicatalons - Emberiza schoeniclus																			
Cruixidell - Milvina calandra																			
Espècies no identificades																			
falcònid sp.															2 migr				
rapinyaire sp.										x5 migr		2 migr	x3 migr		4 migr	2 migr			
TOTAL	16	43	45	20	44	17	14	30	45	22	18	17	24	15	10	19	18	16	34

	25+9+2004	29+9+2004	30+9+2004	3er.	1+10+2004	2+10+2004	3+10+2004	5+10+2004	7+10+2004	8+10+2004	9+10+2004	10+10+2004	12+10+2004	13+10+2004	15+10+2004	15+10+2004	17+10+2004	20+10+2004	23+10+2004
dia	dissabte	dimecres	dijous	trimestre	divendres	dissabte	diumenge	dimarts	dijous	divendres	dissabte	diumenge	dimarts	dimecres	dijous	dijous	diumenge	dimecres	dissabte
hora	9'50-14h.	17'25-19'05h.	7'45-11'15h.	dades	14'45-16'10h.	9'30-14h.	16'20-19'05h.	17-19'30h.	8'30-11'40h.	17'30-18'50h.	9'20-14'10h.	16'45-19'10h.	16'30-17'30h.	17'25-19'15h.	8'15-9'40h.	10-14h.	17'05-19'05h.	16'35-18'15h.	8-13'30h.
lloc	parc	parc	panà	dels	parc	parc	parc	parc	panà	parc	parc	parc	parc	parc	panà	parc	parc	parc	panà
nivell aigua embassament			aprox -15 cm	col.laboradors					aprox -25 cm						aprox -30 cm				aprox -30 cm
observacions climatologia	tapat	clarianes	sol		clar		sol	sol	sol	sol / núvol	sol		núvol / pluja	sol	sol	sol / núvol	sol	sol / núvol	sol
observacions	mestral											mestral							
Podicipediformes																			
Cabusset - Tachybaptus ruficollis			x6		X				x7						x20+/-				10+/-
Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus																			
Cabussó collnegre - Podiceps nigricollis																			
Pelecaniformes																			
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo			63	X					76			6 migr	9+73+22 migr	9+2 migr	136	1+6 migr			5migr+100
Ciconiiformes																			
Bitó - Bataurus stellaris																			
Martinet menut - Ixobrychus minutus																			
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax				X															
Martinet ros - Ardeola ralloides				X															
Esplugabous - Bubulcus ibis																			
Martinet blanc - Egretta garzetta			1						2						1				1+4 migr
Agró blanc - Egretta alba																			2
Bernat pescaire - Ardea cinerea			27						25+/-						20+/-				20+/-
Agró roig - Ardea purpurea			1	X															
Cigonya negra - Ciconia nigra				X								1 migr							
Cigonya blanca - Ciconia ciconia																			
Becplaner - Platalea leucorodia																			
Anseriformes																			
Ànec blanc - Tadorna tadorna																			
Ànec carolí - Aix sponsa																			
Ànec mandari - Aix galericulata																			
Ànec xiulador - Anas penelope																			
Ànec griset - Anas strepera																			
Xarxet - Anas crecca																			
Ànec collverd - Anas platyrhynchos			12						10				1		12				3+3
Ànec cuallarg - Anas acuta																			
Xarrasclet - Anas querquedula																			
Ànec cullerot - Anas clypeata																			
Xibec - Netta rufina																			
Morell cap-roig - Aythya ferina																			
Morell xocolater - Aythya niroca																			
Morell de plomall - Aythya fuligula																			
Morell d'ulls grocs - Bucephala clangula																			
Bec de serra mitjà - Mergus serrator																			
Accipitriformes																			
Àligot vesper - Pernis apivorus		x5 migr				1 migr	x 11 migr	4 migr											
Milà negre - Milvus migrans																			
Milà reial - Milvus milvus																1 migr			
Voltor comú - Gyps fulvus																			
Àliga marcenca - Circaetus gallicus	1 migr																		
Arpella vulgar - Circus aeruginosus	1 migr	x4 migr				1 migr	1 migr	x2 migr			1 migr	1 migr							
Arpella pàl·lida - Circus cyaneus																			
Esparver cendrós - Circus pygargus																			
Astor - Accipiter gentilis		1		X															1
Esparver vulgar - Accipiter nisus	1 migr+1		1		1 migr	x3 migr	x2 migr	1 migr		1 migr	x3 migr	1 migr			1	x4 migr	1 migr		1 migr+3
Àligot - Buteo buteo	4 migr											1 migr							4migr+1
Àliga daurada - Aquila chrysaetos																			
Àliga calçada - Hieraaetus pennatus								2 migr	1 migr		3+1 migr	3 migr				x2 migr			
Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus																			
Pandionidae																			
Àliga pescadora - Pandion haliaetus			1	X															
Falconiformes																			
Xoriguer petit - Falco naumanni																			
Xoriguer - Falco tinnunculus		1 migr+1	1		x3 migr	x2 migr	x7 migr	x8 migr	1 migr+2	x 10 migr	x11 migr +1	x71 migr		x5 migr	2	x18 migr	x2 migr	2 migr	1
Falcó cama-roig - Falco vespertinus												2 migr							
Esmerla - Falco columbarius							1 migr				1 migr	x2 migr		1 migr					
Falcó mostatxut - Falco subbuteo	x4 migr				1 migr			1 migr			1 migr	x15 migr					x3 migr	1 migr	1 migr
Falcó de la reina - Falco eleonorae																			
Falcó pelegrí - Falco peregrinus																x2 migr			
Gal·liformes																			

[illegible]

data	25+9+2004	29+9+2004	30+9+2004	3er.	1+10+2004	2+10+2004	3+10+2004	5+10+2004	7+10+2004	8+10+2004	9+10+2004	10+10+2004	12+10+2004	13+10+2004	15+10+2004	15+10+2004	17+10+2004	20+10+2004	23+10+2004
Tallareta vulgar - Sylvia communis																			
Tallarol gros - Sylvia borin			1	X															
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla			x10	X		8+/-			x10					v	v	v			x10
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli																			
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																			
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita									1						v				x8
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus				X															
Reietó - Regulus regulus																			
Bruel - Regulus ignicapillus			v+v	X				v	v+v			v			v		v	v	c
Muscicapidae																			
Papamosques gris - Muscicapa striata																			
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca			1	X															
Paridae																			
Mallerenga cuallarga - Aegithalos caudatus			v	X		v		v	v+2						2	v	v	v	v+6
Mallerenga emplomallada - Parus cristatus		vs	v+1					v	v+2			v		1	v	v	v		
Mallerenga petita - Parus ater				X															
Mallerenga blava - Parus caeruleus			2	X					v						v				v+2
Mallerenga carbonera - Parus major			v+1	X		c+2		v	10+2	v		1		v	v	v	v		x3
Certhiidae																			
Raspinell - Certhia brachydactyla			x4			v+v			v			v				v	v		v+v
Remizidae																			
Teixidor - Remiz pendulinus																			4
Oriolidae																			
Oriol - Oriolus oriolus																			
Laniidae																			
Botxí - Lanius excubitor																			v
Capsigrany - Lanius senator				X															
Corvidae																			
Gaig - Garrulus glandarius	vs		v+1	X					v+3										1
Garsa - Pica pica						v	v	v	1				v						
Gralla - Corvus monedula																			
Corb - Corvus corax																	p		
Sturnidae																			
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris			alguns					20+/-	alguns			1+1			alguns	4+5			alguns
Estornell negre - Sturnus unicolor																			alguns
Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolaima																			
Passeridae																			
Pardal - Passer domesticus			alguns	X					alguns						alguns				alguns
Pardal xarrec - Passer montanus			v+1+1						2						2				v+v
Pardal roquer - Petronia petronia																			
Ploceidae																			
Teixidor social - Ploceus cucullatus																			1
Fringillidae																			
Pinsà - Fringilla coelebs											8 migr		1 migr	x15 migr	x10	x70 migr	v	x30 migr	x100 migr
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																			
Gafarró - Serinus serinus			vs		2	v			x4	1	v+v	x3			v	2	v	v+6 migr	x4
Verdum - Carduelis chloris									2						2	2			x6
Cadernera - Carduelis carduelis				X					v+v+12		3+1	v			v				x4
Lluer - Carduelis spinus																v+2 migr			x3 migr
Passerell - Carduelis cannabina																			
Trencapinyes - Loxia curvirostra							4		x10	1	1+v	vs		4+6		v	14	v	v+v
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																			
Durbec - Coccothraustes coccothraustes																			
Embericidae																			
Sit blanc - Plectrophenax nivalis																			
Verderola - Emberiza citrinella																			
Gratapalles - Emberiza cirius			c						c+c						c+2				c+c
Sit negre - Emberiza cia																			
Hortolà - Emberiza hortulana																			
Repicatalons - Emberiza schoeniclus																			
Cruixidell - Milvina calandra																			
Espècies no identificades																			
falcònid sp.					1 migr	1 migr						6 migr							
rapinyaire sp.	1 migr	1 migr				1 migr	x2 migr	x2 migr			1 migr					x6 migr	x2 migr	1 migr	
TOTAL	15	14	44		10	23	15	21	47	10	30	25	10	15	43	37	19	13	63

data	27+10+2004	28+10+2004	29+10+2004	4+11+2004	10+11+2004	11+11+2004	12+11+2004	19+11+2004	25+11+2004	27+11+2004	28+11+2004	4+12+2004	6+12+2004	8+12+2004	11+12+2004	14+12+2004	23+12+2004	26+12+2004	31+12+2004
Perdiu - Alectoris rufa						7+1					c								
Guatlla - Coturnix coturnix																			
Faisà - Phasianus colchicus																			
Gruiformes																			
Rascló - Rallus acuaticus		v+v		v+v			v	vx3	v			v+4			x5		x4		v
Polla pintada - Porzana porzana																			
Rascletó - Porzana parva																			
Rasclet - Porzana pusilla																			
Guatlla maresa - Crex crex																			
Polla d'aigua - Gallinula chloropus		10+/-		x20			2	x10	1	v+1		6			x10		x4		x12
Fotja - Fulica atra		10+/-		10+/-			1	6	1	1+1		3			x10		1+1		x10
Fotja banyuda - Fulica cristata																			
Grua - Grus grus																			
Sisó - Tetrax tetrax																			
Caradriformes																			
Camesllargues - Himantopus himantopus																			
Torlit - Burhinus oedicnemus																			
Corriol petit - Charadrius dubius																			
Corriol gros - Charadrius hiaticula																			
Daurada grossa - Pluvialis apricaria																			
Fredulega - Vanellus vanellus									3			2			14				
Territ menut - Calidris minutus																			
Territ de temminck - Calidris temminckii																			
Territ becllarg - Calidris ferruginea																			
Territ variant - Calidris alpina																			
Becadell sord - Lymnocyptes minimus																			
Becadell comú - Gallinago gallinago																			
Becada - Scolopax rusticola																			
Tétol cuanegre - Limosa limosa																			
Tétol cuabarrat - Limosa lapponica																			
Gamba roja pintada - Tringa erythropus																			
Gamba roja vulgar - Tringa totanus																			
Gamba verda - Tringa nebularia																			
Xivita - Tringa ochropus																			
Valona - Tringa glareola																			
Xivitona - Actitis hypoleucos																			
Gavina menuda - Larus minutus																			
Gavina vulgar - Larus ridibundus		8	5	15+/-			3	1	1						7				10+/-
Gavià fosc - Larus fuscus																			
Gavià argentat - Larus cachinnans																			
Xatrac gros - Sterna caspia																			
Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus																			
Fumarell negre - Chlidonias niger																			
Columbiformes																			
Colom roquer - Columba livia		4				10							3	60+/-	5				
Xixella - Columba oenas																			
Tudó - Columba palumbus	1	20+/-	1+1	30+/-		1		x20	3	1	1	15+/-	8	2	11	1+7	1+2+6		5+5
Tórtora turca - Streptopelia decaocto						15+/-					4		2						
Tórtora - Streptopelia turtur																			
Psittacidae																			
Cotorra de Kramer - Psittacula krameri																			
Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus																			
Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus																			
Inseparable de Fischer - Agapornis fischeri																			
Cuculiformes																			
Cucut reial - Clamator glandarius																			
Cucut - Cuculus canorus																			
Estrigiformes																			
Óliba - Tyto alba																			
Xot - Otus scops																			
Duc - Bubo bubo											pc								
Mussol - Athene noctua										v+v									
Gamarús - Strix aluco																	c		
Mussol banyut - Asio otus																			
Caprimulgiformes																			
Enganyapastors - Caprimulgus europaeus																			
Siboc - Caprimulgus ruficollis																			
Apodiformes																			
Ballester - Apus melba																			
Falciot negre - Apus apus																			

data	27+10+2004	28+10+2004	29+10+2004	4+11+2004	10+11+2004	11+11+2004	12+11+2004	19+11+2004	25+11+2004	27+11+2004	28+11+2004	4+12+2004	6+12+2004	8+12+2004	11+12+2004	14+12+2004	23+12+2004	26+12+2004	31+12+2004
Tallareta vulgar - Sylvia communis																			
Tallarol gros - Sylvia borin																			
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	v	x20		x5		x8		x20	v	x15	v+v	x5	v+v	1	x6	x40	x5	v+v	v
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli																			
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix																			
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	v+v	x4	v	1+1	x9	x10		v+v	v		v	x5	1	10+/-	x15	x10	3+1+1	1+1	1+1
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus																			
Reietó - Regulus regulus																			
Bruel - Regulus ignicapillus		c				v+1							1		x3	c+2			
Muscicapidae																			
Papamosques gris - Muscicapa striata																			
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca																			
Paridae																			
Mallereña cuallarga - Aegithalos caudatus	vs	v+v		4	vs	8+8		v	v	vs	v	v+v	v+v+13		x4	v+9	x3		5
Mallereña emplomallada - Parus cristatus				2	vs+vs	v		v		v+v		v	v		x3	v+v	v		1v
Mallereña petita - Parus ater				c											c+c				
Mallereña blava - Parus caeruleus		v+v		v+v		1+2+v		v+2				v		1	x2	v+1	v+v		
Mallereña carbonera - Parus major	vs	v+2		1		v+v		v+v		v		v+2	2	c	x11	v+2+2	v+2	v	x3
Certhiidae																			
Raspinel·l - Certhia brachydactyla		v+v		v		v+v		v+c		x3	v+v	x3	v	v	x9	x5	v+v		v+v
Remizidae																			
Teixidor - Remiz pendulinus		v		8				4		vs					v				
Oriolidae																			
Oriol - Oriolus oriolus																			
Laniidae																			
Botxí - Lanius excubitor																		1	
Capsigrany - Lanius senator																			
Corvidae																			
Gaig - Garrulus glandarius	v	2	v	v		v+2		4		vs		v			x3	1+1	3+1		
Garsa - Pica pica						x6				1	1		4	4+2		x10	1	2	2
Gralla - Corvus monedula																			
Corb - Corvus corax																			
Sturnidae																			
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris		alguns				alguns		alguns							alguns	alguns			20+15
Estornell negre - Sturnus unicolor															alguns	alguns			
Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolaima														1					
Passeridae																			
Pardal - Passer domesticus		alguns		alguns		alguns		alguns			alguns	alguns	alguns		alguns	alguns	alguns	alguns	10
Pardal xarrec - Passer montanus				v				v							1v+v	v+v	v	v	
Pardal roquer - Petronia petronia																			
Ploceidae																			
Teixidor social - Ploceus cucullatus																			
Fringillidae																			
Pinsà - Fringilla coelebs	v	alguns	alguns	alguns	x16	alguns		alguns	alguns	50+/-	abundant	abundant	alguns	alguns	x91	alguns	alguns	alguns	x12
Pinsà mec - Fringilla montifringilla																			
Gafarró - Serinus serinus	v	v	v	v+v		1+v		v	c	x30+/-	v	1+2	1	v	x23	x20	c+c	x4	c
Verdum - Carduelis chloris		v+1	v	x4		x4	v	v	v	v+1		4			x10	v	v		
Cadernera - Carduelis carduelis	vs	6	1	v	x5	v+4	v	v+1	v	x25+/-		x20	v	v	x10	v+4	v+2+60	v+20	vs
Lluer - Carduelis spinus			3 migr			v													
Passerell - Carduelis cannabina	vs					v			10				4		v	1	v	v+v	
Trencapinyes - Loxia curvirostra																			
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula																			
Durbec - Coccothraustes coccothraustes				3															
Embericidae																			
Sit blanc - Plectrophenax nivalis																			
Verderola - Emberiza citrinella																			
Gratapalles - Emberiza cirius	c	c+c		c+2		2+2					v			c+1	c	v			
Sit negre - Emberiza cia						1													
Hortolà - Emberiza hortulana																			
Repicatalons - Emberiza schoeniclus		1		x4				x10				v			v		1+100+/-		
Cruixidell - Miliaria calandra										v+1									
Espècies no identificades																			
falcònid sp.																			
rapinyaire sp.			1 migr																
TOTAL	21	42	24	43	12	42	16	43	29	39	21	41	31	27	52	38	44	23	37

data							
hora		NOMBRE D'OBSERVACIONS I PERCENTATGES DURANT EL 2004					
lloc							
nivell aigua embassament	PERÍODE	ANY 2004		Percentatge d'observacions			
observacions climatologia				respecte sortides efectuades en cada període			
observacions		Total observacions	any 2004	gener-març	abril-juny	juliol-setembre	octu.-desembre
Podicipediformes							
Cabusset - Tachybaptus ruficollis	Cabusset - Tachybaptus ruficollis	45	40,5%	61,9%	25,0%	40,6%	38,2%
Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus	Cabussó emplomallat - Podiceps cristatus	3	2,7%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Cabussó collnegre - Podiceps nigricollis	Cabussó collnegre - Podiceps nigricollis	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pelecaniformes							
Corb marí gros - Phalacrocorax carbo	Corb marí gros - Phalacrocorax carbo	56	50,5%	76,2%	29,2%	43,8%	52,9%
Ciconiformes							
Bitó - Botaurus stellaris	Bitó - Botaurus stellaris	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Martinet menut - Ixobrychus minutus	Martinet menut - Ixobrychus minutus	3	2,7%	0,0%	4,2%	6,3%	0,0%
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax	Martinet de nit - Nycticorax nycticorax	17	15,3%	0,0%	33,3%	18,8%	0,0%
Martinet ros - Ardeola ralloides	Martinet ros - Ardeola ralloides	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Esplugabous - Bubulcus ibis	Esplugabous - Bubulcus ibis	6	5,4%	4,8%	0,0%	0,0%	8,8%
Martinet blanc - Egretta garzetta	Martinet blanc - Egretta garzetta	33	29,7%	19,0%	41,7%	18,8%	32,4%
Agró blanc - Egretta alba	Agró blanc - Egretta alba	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bernat pescaire - Ardea cinerea	Bernat pescaire - Ardea cinerea	59	53,2%	76,2%	70,8%	40,6%	38,2%
Agró roig - Ardea purpurea	Agró roig - Ardea purpurea	8	7,2%	0,0%	12,5%	9,4%	0,0%
Cigonya negra - Ciconia nigra	Cigonya negra - Ciconia nigra	2	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Cigonya blanca - Ciconia ciconia	Cigonya blanca - Ciconia ciconia	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Becplaner - Platalea leucorodia	Becplaner - Platalea leucorodia	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anseriformes							
Ànec blanc - Tadorna tadorna	Ànec blanc - Tadorna tadorna	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ànec carolí - Aix sponsa	Ànec carolí - Aix sponsa	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ànec mandarí - Aix galericulata	Ànec mandarí - Aix galericulata	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ànec xiulador - Anas penelope	Ànec xiulador - Anas penelope	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ànec grisè - Anas strepera	Ànec grisè - Anas strepera	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Xarxet - Anas crecca	Xarxet - Anas crecca	7	6,3%	28,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Ànec collverd - Anas platyrhynchos	Ànec collverd - Anas platyrhynchos	66	59,5%	81,0%	83,3%	43,8%	44,1%
Ànec cuallarg - Anas acuta	Ànec cuallarg - Anas acuta	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Xarrasclet - Anas querquedula	Xarrasclet - Anas querquedula	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ànec cullebot - Anas clypeata	Ànec cullebot - Anas clypeata	2	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Xibec - Netta rufina	Xibec - Netta rufina	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Morell cap-roig - Aythya ferina	Morell cap-roig - Aythya ferina	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Morell xocolater - Aythya nyroca	Morell xocolater - Aythya nyroca	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Morell de plomall - Aythya fuligula	Morell de plomall - Aythya fuligula	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Morell d'ulls grocs - Bucephala clangula	Morell d'ulls grocs - Bucephala clangula	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bec de serra mitjà - Mergus serrator	Bec de serra mitjà - Mergus serrator	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Accipitriformes							
Aligot vesper - Pernis apivorus	Aligot vesper - Pernis apivorus	15	13,5%	0,0%	4,2%	34,4%	8,8%
Milà negre - Milvus migrans	Milà negre - Milvus migrans	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Milà reial - Milvus milvus	Milà reial - Milvus milvus	2	1,8%	0,0%	0,0%	3,1%	2,9%
Voltor comú - Gyps fulvus	Voltor comú - Gyps fulvus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Àliga marcenca - Circaetus gallicus	Àliga marcenca - Circaetus gallicus	19	17,1%	9,5%	25,0%	28,1%	0,0%
Arpella vulgar - Circus aeruginosus	Arpella vulgar - Circus aeruginosus	16	14,4%	4,8%	4,2%	25,0%	14,7%
Arpella pal.lida - Circus cyaneus	Arpella pal.lida - Circus cyaneus	5	4,5%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%
Esparver cendrós - Circus pygargus	Esparver cendrós - Circus pygargus	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Astor - Accipiter gentilis	Astor - Accipiter gentilis	8	7,2%	4,8%	0,0%	9,4%	8,8%
Esparver vulgar - Accipiter nisus	Esparver vulgar - Accipiter nisus	35	31,5%	23,8%	8,3%	40,6%	38,2%
Aligot - Buteo buteo	Aligot - Buteo buteo	34	30,6%	71,4%	12,5%	6,3%	38,2%
Àliga daurada - Aquila chrysaetos	Àliga daurada - Aquila chrysaetos	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Àliga calçada - Hieraaetus pennatus	Àliga calçada - Hieraaetus pennatus	7	6,3%	0,0%	0,0%	3,1%	14,7%
Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus	Àliga cuabarrada - Hieraaetus fasciatus	9	8,1%	0,0%	12,5%	15,6%	2,9%
Pandionidae							
Àliga pescadora - Pandion haliaetus	Àliga pescadora - Pandion haliaetus	6	5,4%	4,8%	4,2%	9,4%	0,0%
Falconiformes							
Xoriguer petit - Falco naumanni	Xoriguer petit - Falco naumanni	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Xoriguer - Falco tinnunculus	Xoriguer - Falco tinnunculus	73	65,8%	57,1%	75,0%	62,5%	67,6%
Falcó cama-roig - Falco vespertinus	Falcó cama-roig - Falco vespertinus	2	1,8%	0,0%	0,0%	3,1%	2,9%
Esmerla - Falco columbarius	Esmerla - Falco columbarius	7	6,3%	4,8%	0,0%	0,0%	11,8%
Falcó mostatxut - Falco subbuteo	Falcó mostatxut - Falco subbuteo	21	18,9%	0,0%	20,8%	28,1%	20,6%
Falcó de la reina - Falco eleonorae	Falcó de la reina - Falco eleonorae	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Falcó pelegrí - Falco peregrinus	Falcó pelegrí - Falco peregrinus	4	3,6%	4,8%	0,0%	0,0%	5,9%
Gal.liformes							
Perdiu - Alectoris rufa	Perdiu - Alectoris rufa	20	18,0%	19,0%	25,0%	15,6%	14,7%
Guatlla - Coturnix coturnix	Guatlla - Coturnix coturnix	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Faisà - Phasianus colchicus	Faisà - Phasianus colchicus	1	0,9%	0,0%	4,2%	0,0%	0,0%
Gruiformes							
Rascló - Rallus acuaticus	Rascló - Rallus acuaticus	32	28,8%	61,9%	4,2%	9,4%	35,3%
Polla pintada - Porzana porzana	Polla pintada - Porzana porzana	2	1,8%	9,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Rascletó - Porzana parva	Rascletó - Porzana parva	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rasclet - Porzana pusilla	Rasclet - Porzana pusilla	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guatlla maresa - Crex crex	Guatlla maresa - Crex crex	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Polla d'aigua - Gallinula chloropus	Polla d'aigua - Gallinula chloropus	60	54,1%	81,0%	70,8%	40,6%	38,2%
Fotja - Fulica atra	Fotja - Fulica atra	58	52,3%	76,2%	62,5%	40,6%	38,2%
Fotja banyuda - Fulica cristata	Fotja banyuda - Fulica cristata	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grua - Grus grus	Grua - Grus grus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	data						
	Sisó - Tetrax tetrax	Sisó - Tetrax tetrax	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Caradriiformes						
	Camesllargues - Himantopus himantopus	Camesllargues - Himantopus himantopus	7	6,3%	9,5%	12,5%	0,0%
	Torlit - Burhinus oedicephalus	Torlit - Burhinus oedicephalus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Coriol petit - Charadrius dubius	Coriol petit - Charadrius dubius	6	5,4%	0,0%	12,5%	3,1%
	Coriol gros - Charadrius hiaticula	Coriol gros - Charadrius hiaticula	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Daurada grossa - Pluvialis apricaria	Daurada grossa - Pluvialis apricaria	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Fredulega - Vanellus vanellus	Fredulega - Vanellus vanellus	7	6,3%	14,3%	0,0%	8,8%
	Territ menut - Calidris minutus	Territ menut - Calidris minutus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Territ de temminck - Calidris temminckii	Territ de temminck - Calidris temminckii	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Territ becllarg - Calidris ferruginea	Territ becllarg - Calidris ferruginea	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Territ variant - Calidris alpina	Territ variant - Calidris alpina	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Becadell sord - Lymnocyrtus minimus	Becadell sord - Lymnocyrtus minimus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Becadell comú - Gallinago gallinago	Becadell comú - Gallinago gallinago	12	10,8%	38,1%	8,3%	2,9%
	Becada - Scolopax rusticola	Becada - Scolopax rusticola	2	1,8%	9,5%	0,0%	0,0%
	Tètol cuanegre - Limosa limosa	Tètol cuanegre - Limosa limosa	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Tètol cuabarrat - Limosa lapponica	Tètol cuabarrat - Limosa lapponica	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Gamba roja pintada - Tringa erythropus	Gamba roja pintada - Tringa erythropus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Gamba roja vulgar - Tringa totanus	Gamba roja vulgar - Tringa totanus	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
	Gamba verda - Tringa nebularia	Gamba verda - Tringa nebularia	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
	Xivita - Tringa ochropus	Xivita - Tringa ochropus	10	9,0%	9,5%	12,5%	6,3%
	Valona - Tringa glareola	Valona - Tringa glareola	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Xivitona - Actitis hypoleucos	Xivitona - Actitis hypoleucos	14	12,6%	0,0%	20,8%	21,9%
	Gavina menuda - Larus minutus	Gavina menuda - Larus minutus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Gavina vulgar - Larus ridibundus	Gavina vulgar - Larus ridibundus	21	18,9%	0,0%	0,0%	32,4%
	Gavià fosc - Larus fuscus	Gavià fosc - Larus fuscus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Gavià argentat - Larus cachinnans	Gavià argentat - Larus cachinnans	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Xatrac gros - Sterna caspia	Xatrac gros - Sterna caspia	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus	Fumarell carablanc - Chlidonias hybridus	6	5,4%	0,0%	4,2%	2,9%
	Fumarell negre - Chlidonias niger	Fumarell negre - Chlidonias niger	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
	Columbiformes						
	Colom roquer - Columba livia	Colom roquer - Columba livia	39	35,1%	71,4%	45,8%	23,5%
	Xixella - Columba oenas	Xixella - Columba oenas	6	5,4%	0,0%	16,7%	6,3%
	Tudó - Columba palumbus	Tudó - Columba palumbus	86	77,5%	100,0%	95,8%	64,7%
	Tórtora turca - Streptopelia decaocto	Tórtora turca - Streptopelia decaocto	14	12,6%	14,3%	20,8%	8,8%
	Tórtora - Streptopelia turtur	Tórtora - Streptopelia turtur	19	17,1%	0,0%	50,0%	21,9%
	Psittacidae						
	Cotorra de Kramer - Psittacula krameri	Cotorra de Kramer - Psittacula krameri	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus	Lloro de la Patagònia - Cyanoliseus patagonus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus	Cotorra de pit gris - Myiopsitta monachus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Inseparable de Fischer - Agapornis fischeri	Inseparable de Fischer - Agapornis fischeri	2	1,8%	0,0%	0,0%	6,3%
	Cuculiformes						
	Cucut reial - Clamator glandarius	Cucut reial - Clamator glandarius	1	0,9%	0,0%	4,2%	0,0%
	Cucut - Cuculus canorus	Cucut - Cuculus canorus	13	11,7%	0,0%	41,7%	6,3%
	Estrigiformes						
	Òliba - Tyto alba	Òliba - Tyto alba	1	0,9%	4,8%	0,0%	0,0%
	Xot - Otus scops	Xot - Otus scops	1	0,9%	0,0%	4,2%	0,0%
	Duc - Bubo bubo	Duc - Bubo bubo	4	3,6%	0,0%	8,3%	2,9%
	Mussol - Athene noctua	Mussol - Athene noctua	4	3,6%	0,0%	4,2%	2,9%
	Gamarús - Strix aluco	Gamarús - Strix aluco	2	1,8%	0,0%	0,0%	2,9%
	Mussol banyut - Asio otus	Mussol banyut - Asio otus	3	2,7%	0,0%	4,2%	3,1%
	Caprimulgiformes						
	Enganyapastors - Caprimulgus europaeus	Enganyapastors - Caprimulgus europaeus	3	2,7%	0,0%	8,3%	3,1%
	Siboc - Caprimulgus ruficollis	Siboc - Caprimulgus ruficollis	1	0,9%	0,0%	4,2%	0,0%
	Apodiformes						
	Ballester - Apus melba	Ballester - Apus melba	31	27,9%	9,5%	33,3%	17,6%
	Falcot negre - Apus apus	Falcot negre - Apus apus	45	40,5%	0,0%	95,8%	5,9%
	Falcot pàl·lid - Apus pallidus	Falcot pàl·lid - Apus pallidus	5	4,5%	0,0%	0,0%	15,6%
	Coraciformes						
	Blauet - Alcedo atthis	Blauet - Alcedo atthis	40	36,0%	52,4%	12,5%	29,4%
	Abellerol - Merops apiaster	Abellerol - Merops apiaster	40	36,0%	0,0%	75,0%	0,0%
	Gaig blau - Coracias garrulus	Gaig blau - Coracias garrulus	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
	Puput - Upupa epops	Puput - Upupa epops	20	18,0%	14,3%	41,7%	5,9%
	Piciformes						
	Colltort - Jynx torquilla	Colltort - Jynx torquilla	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%
	Picot verd - Picus viridis	Picot verd - Picus viridis	13	11,7%	9,5%	8,3%	11,8%
	Picot garser gros - Dendrocopos major	Picot garser gros - Dendrocopos major	2	1,8%	0,0%	0,0%	2,9%
	Passeriformes:						
	Alaudidae						
	Terrerola vulgar - Calandrella brachydactyla	Terrerola vulgar - Calandrella brachydactyla	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Cogullada vulgar - Galerida cristata	Cogullada vulgar - Galerida cristata	19	17,1%	19,0%	25,0%	14,7%
	Cogullada fosca - Galerida theklae	Cogullada fosca - Galerida theklae	4	3,6%	0,0%	4,2%	9,4%
	Cotoliu - Lullula arborea	Cotoliu - Lullula arborea	17	15,3%	14,3%	12,5%	32,4%
	Alosa - Alauda arvensis	Alosa - Alauda arvensis	5	4,5%	14,3%	0,0%	5,9%
	Hirundinidae						
	Oreneta de ribera - Riparia riparia	Oreneta de ribera - Riparia riparia	10	9,0%	0,0%	20,8%	2,9%
	Roquerol - Pyronoprogne rupestris	Roquerol - Pyronoprogne rupestris	15	13,5%	33,3%	0,0%	20,6%
	Oreneta vulgar - Hirundo rustica	Oreneta vulgar - Hirundo rustica	75	67,6%	38,1%	95,8%	35,3%
	Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica	Oreneta cua-rogenca - Hirundo daurica	3	2,7%	0,0%	8,3%	0,0%
	Oreneta cuablanca - Delichon urbica	Oreneta cuablanca - Delichon urbica	63	56,8%	28,6%	87,5%	26,5%
	Motacillidae						
	Trobat - Anthus campestris	Trobat - Anthus campestris	7	6,3%	0,0%	12,5%	6,3%

data							
Piula dels arbres - Anthus trivialis	Piula dels arbres - Anthus trivialis	4	3,6%	0,0%	4,2%	3,1%	2,9%
Titella - Anthus pratensis	Titella - Anthus pratensis	37	33,3%	61,9%	8,3%	0,0%	64,7%
Grasset de muntanya - Anthus spinoletta	Grasset de muntanya - Anthus spinoletta	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grasset de costa - Anthus petrosus	Grasset de costa - Anthus petrosus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuereta groga - Motacilla flava	Cuereta groga - Motacilla flava	4	3,6%	0,0%	4,2%	0,0%	8,8%
Cuereta torrentera - Motacilla cinerea	Cuereta torrentera - Motacilla cinerea	23	20,7%	38,1%	8,3%	3,1%	35,3%
Cuereta blanca - Motacilla alba	Cuereta blanca - Motacilla alba	74	66,7%	95,2%	79,2%	43,8%	58,8%
Troglodytidae							
Cargolet - Troglodytes troglodytes	Cargolet - Troglodytes troglodytes	78	70,3%	95,2%	91,7%	50,0%	55,9%
Prunellidae							
Pardal de bardissa - Prunella modularis	Pardal de bardissa - Prunella modularis	38	34,2%	81,0%	0,0%	0,0%	58,8%
Turdidae							
Pit-roig - Erithacus rubecula	Pit-roig - Erithacus rubecula	91	82,0%	100,0%	79,2%	46,9%	97,1%
Rossinyol - Luscinia megarhynchos	Rossinyol - Luscinia megarhynchos	35	31,5%	0,0%	83,3%	40,6%	0,0%
Cotxa blava - Luscinia svecica	Cotxa blava - Luscinia svecica	5	4,5%	0,0%	0,0%	3,1%	8,8%
Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros	Cotxa fumada - Phoenicurus ochruros	27	24,3%	61,9%	4,2%	0,0%	38,2%
Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus	Cotxa cua-roja - Phoenicurus phoenicurus	8	7,2%	0,0%	4,2%	6,3%	5,9%
Bitxac rogenc - Saxicola rubetra	Bitxac rogenc - Saxicola rubetra	2	1,8%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Bitxac comú - Saxicola torquata	Bitxac comú - Saxicola torquata	43	38,7%	28,6%	50,0%	31,3%	44,1%
Còbit gris - Oenanthe oenanthe	Còbit gris - Oenanthe oenanthe	9	8,1%	0,0%	0,0%	15,6%	5,9%
Còbit - Oenanthe hispanica	Còbit - Oenanthe hispanica	3	2,7%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%
Còbit negre - Oenanthe leucura	Còbit negre - Oenanthe leucura	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Merla roquera - Monticola saxatilis	Merla roquera - Monticola saxatilis	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Merla blava - Monticola solitarius	Merla blava - Monticola solitarius	27	24,3%	38,1%	41,7%	12,5%	14,7%
Merla de pit blanc - Turdus torquatus	Merla de pit blanc - Turdus torquatus	2	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%
Merla - Turdus merula	Merla - Turdus merula	93	83,8%	100,0%	100,0%	59,4%	73,5%
Griva cerdana - Turdus pilaris	Griva cerdana - Turdus pilaris	1	0,9%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Tord - Turdus philomelos	Tord - Turdus philomelos	54	48,6%	90,5%	37,5%	12,5%	55,9%
Tord ala-roig - Turdus iliacus	Tord ala-roig - Turdus iliacus	14	12,6%	52,4%	0,0%	0,0%	5,9%
Griva - Turdus viscivorus	Griva - Turdus viscivorus	40	36,0%	42,9%	50,0%	9,4%	47,1%
Sylviidae							
Rossinyol bord - Cettia cetti	Rossinyol bord - Cettia cetti	74	66,7%	90,5%	87,5%	43,8%	47,1%
Trist - Cisticola juncidis	Trist - Cisticola juncidis	18	16,2%	4,8%	45,8%	12,5%	5,9%
Boscaler comú - Locustella luscinioides	Boscaler comú - Locustella luscinioides	1	0,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Boscarla d'aigua - Acrocephalus paludicola	Boscarla d'aigua - Acrocephalus paludicola	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Boscarla dels joncs - Acrocephalus shoenoaenus	Boscarla dels joncs - Acrocephalus shoenoaenus	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Boscarla menjamosquits - Acrocephalus palustris	Boscarla menjamosquits - Acrocephalus palustris	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpaceus	Boscarla de canyar - Acrocephalus scirpaceus	18	16,2%	0,0%	12,5%	28,1%	11,8%
Balquer - Acrocephalus arundinaceus	Balquer - Acrocephalus arundinaceus	2	1,8%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Bosqueta pàl·lida - Hippolais pallida	Bosqueta pàl·lida - Hippolais pallida	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta	Bosqueta vulgar - Hippolais polyglotta	18	16,2%	0,0%	45,8%	15,6%	0,0%
Tallareta cuallarga - Sylvia undata	Tallareta cuallarga - Sylvia undata	46	41,4%	33,3%	25,0%	46,9%	52,9%
Tallarol de garriga - Sylvia cantillans	Tallarol de garriga - Sylvia cantillans	4	3,6%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%
Tallarol capnegre - Sylvia melanocephala	Tallarol capnegre - Sylvia melanocephala	111	100,0%	95,2%	100,0%	100,0%	97,1%
Tallarol emmascarat - Sylvia hortensis	Tallarol emmascarat - Sylvia hortensis	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tallareta vulgar - Sylvia communis	Tallareta vulgar - Sylvia communis	3	2,7%	0,0%	8,3%	3,1%	0,0%
Tallarol gros - Sylvia borin	Tallarol gros - Sylvia borin	3	2,7%	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%
Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	Tallarol de casquet - Sylvia atricapilla	72	64,9%	66,7%	70,8%	50,0%	64,7%
Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli	Mosquiter pàl·lid - Phylloscopus bonelli	21	18,9%	0,0%	50,0%	28,1%	0,0%
Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix	Mosquiter xiulaire - Phylloscopus sibilatrix	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	Mosquiter comú - Phylloscopus collybita	48	43,2%	95,2%	25,0%	3,1%	58,8%
Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus	Mosquiter de passa - Phylloscopus trochilus	10	9,0%	0,0%	8,3%	21,9%	0,0%
Reietó - Regulus regulus	Reietó - Regulus regulus	1	0,9%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Bruel - Regulus ignicapillus	Bruel - Regulus ignicapillus	45	40,5%	42,9%	66,7%	21,9%	35,3%
Muscicapidae							
Papamosques gris - Muscicapa striata	Papamosques gris - Muscicapa striata	10	9,0%	0,0%	16,7%	18,8%	0,0%
Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca	Mastegatàtxes - Ficedula hypoleuca	8	7,2%	0,0%	12,5%	9,4%	0,0%
Paridae							
Mallerenga cuallarga - Aegithalos caudatus	Mallerenga cuallarga - Aegithalos caudatus	88	79,3%	90,5%	91,7%	62,5%	67,6%
Mallerenga emplomallada - Parus cristatus	Mallerenga emplomallada - Parus cristatus	67	60,4%	66,7%	83,3%	43,8%	52,9%
Mallerenga petita - Parus ater	Mallerenga petita - Parus ater	12	10,8%	19,0%	8,3%	6,3%	5,9%
Mallerenga blava - Parus caeruleus	Mallerenga blava - Parus caeruleus	56	50,5%	76,2%	50,0%	37,5%	35,3%
Mallerenga carbonera - Parus major	Mallerenga carbonera - Parus major	90	81,1%	100,0%	91,7%	59,4%	70,6%
Certhiidae							
Raspinell - Certhia brachydactyla	Raspinell - Certhia brachydactyla	84	75,7%	95,2%	100,0%	62,5%	55,9%
Remizidae							
Teixidor - Remiz pendulinus	Teixidor - Remiz pendulinus	11	9,9%	19,0%	0,0%	0,0%	17,6%
Oriolidae							
Oriol - Oriolus oriolus	Oriol - Oriolus oriolus	29	26,1%	0,0%	58,3%	46,9%	0,0%
Laniidae							
Botxí - Lanius excubitor	Botxí - Lanius excubitor	11	9,9%	9,5%	16,7%	9,4%	5,9%
Capsigrany - Lanius senator	Capsigrany - Lanius senator	12	10,8%	0,0%	37,5%	6,3%	0,0%
Corvidae							
Gaig - Garrulus glandarius	Gaig - Garrulus glandarius	60	54,1%	71,4%	62,5%	46,9%	38,2%
Garsa - Pica pica	Garsa - Pica pica	48	43,2%	66,7%	41,7%	31,3%	41,2%
Gralla - Corvus monedula	Gralla - Corvus monedula	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Corb - Corvus corax	Corb - Corvus corax	4	3,6%	4,8%	4,2%	0,0%	2,9%
Sturnidae							
Estornell vulgar - Sturnus vulgaris	Estornell vulgar - Sturnus vulgaris	36	32,4%	47,6%	29,2%	21,9%	35,3%
Estornell negre - Sturnus unicolor	Estornell negre - Sturnus unicolor	39	35,1%	66,7%	66,7%	12,5%	11,8%
Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolaima	Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves - Lamprolaima	2	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Passeridae							

data							
Pardal - Passer domesticus	Pardal - Passer domesticus	75	67,6%	95,2%	83,3%	53,1%	44,1%
Pardal xarrec - Passer montanus	Pardal xarrec - Passer montanus	46	41,4%	47,6%	58,3%	40,6%	26,5%
Pardal roquer - Petronia petronia	Pardal roquer - Petronia petronia	9	8,1%	9,5%	16,7%	9,4%	0,0%
Ploceidae							
Teixidor social - Ploceus cucullatus	Teixidor social - Ploceus cucullatus	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Fringillidae							
Pinsà - Fringilla coelebs	Pinsà - Fringilla coelebs	46	41,4%	90,5%	4,2%	0,0%	76,5%
Pinsà mec - Fringilla montifringilla	Pinsà mec - Fringilla montifringilla	1	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gafarró - Serinus serinus	Gafarró - Serinus serinus	89	80,2%	100,0%	100,0%	46,9%	82,4%
Verdum - Carduelis chloris	Verdum - Carduelis chloris	76	68,5%	95,2%	95,8%	43,8%	47,1%
Cadenera - Carduelis carduelis	Cadenera - Carduelis carduelis	85	76,6%	95,2%	95,8%	50,0%	67,6%
Lluer - Carduelis spinus	Lluer - Carduelis spinus	7	6,3%	9,5%	0,0%	0,0%	11,8%
Passerell - Carduelis cannabina	Passerell - Carduelis cannabina	46	41,4%	42,9%	58,3%	12,5%	52,9%
Trencapinyes - Loxia curvirostra	Trencapinyes - Loxia curvirostra	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula	Pinsà borroner - Pyrrhula pyrrhula	2	1,8%	9,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Durbec - Coccothraustes coccothraustes	Durbec - Coccothraustes coccothraustes	10	9,0%	38,1%	0,0%	0,0%	2,9%
Embericidae							
Sit blanc - Plectrophenax nivalis	Sit blanc - Plectrophenax nivalis	1	0,9%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Verderola - Emberiza citrinella	Verderola - Emberiza citrinella	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gratapalles - Emberiza cirius	Gratapalles - Emberiza cirius	57	51,4%	47,6%	83,3%	46,9%	32,4%
Sit negre - Emberiza cia	Sit negre - Emberiza cia	5	4,5%	14,3%	0,0%	0,0%	2,9%
Hortolà - Emberiza hortulana	Hortolà - Emberiza hortulana	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Repicatalons - Emberiza schoeniclus	Repicatalons - Emberiza schoeniclus	15	13,5%	33,3%	0,0%	0,0%	17,6%
Cruixidell - Miliaria calandra	Cruixidell - Miliaria calandra	4	3,6%	9,5%	0,0%	0,0%	2,9%
Espècies no identificades							
falcònid sp.							
rapinyaire sp.							
TOTAL	225	165	165	91	109	113	103

MEMÒRIA D'ANELLAMENT AL PARC DEL FOIX 2004

Per Marc Oliver

Introducció: què és l'anellament?

Durant l'any 2004 s'ha realitzat per primera vegada al Parc del Foix l'estudi de l'avifauna mitjançant l'anellament.

L'anellament científic d'ocells és una tècnica d'estudi consistent en la seva captura mitjançant mètodes inofensius i el seu marcatge amb una anella metàl·lica que es col·loca a la pota. Aquesta anella conté un codi alfanumèric i una adreça o remitent, que en el cas de l'estat espanyol és *Ministerio de Medio Ambiente - ICONA Madrid*, que ens permet individualitzar cada ocell, és a dir, actua de manera similar a la matrícula d'un cotxe.

Això ens permetrà conèixer els moviments dels ocells, quant triguen a fer-los, quin cost energètic els hi suposa, quina és la seva longevitat, períodes i velocitat de muda i molts altres aspectes del seu cycle vital.

Un cop se li ha col·locat l'anella, es prenen una sèrie de mesures biomètriques i d'estat físic que habitualment són l'edat, el sexe, la mesura de l'ala, la de la tercera primària (una ploma de vol), el pes, l'estat de greix i múscul; i la muda (per una descripció detallada d'aquestes mesures i la manera de prendre-les, es pot consultar els Estàndards d'anellament de l'Institut Català d'Ornitologia a l'adreça web www.ornitologia.org/anellament/estandards3.htm). La presa d'aquestes dades es fa al més ràpidament possible per tal d'ocasionar el mínim de molèsties als ocells. Un cop s'han registrat les dades, l'ocell és alliberat.

Les dades d'anellament s'envien a una base de dades gestionada per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), que és l'entitat a nivell català que coordina les tasques d'anellament i s'encarrega de la formació dels nous anelladors.

Aquesta informació és consultable per tots aquells investigadors que desitgin estudiar qualsevol aspecte de la vida dels ocells i també és enviada a Madrid a una base de dades estatal i des d'aquí a Europa, on aquestes s'agrupen amb les dels diversos estats europeus.

Zona d'estudi

El lloc del parc escollit ha estat la cua del pantà (3855-45690 de coordenades UTM en el punt central i situat al terme municipal de Castellet i la Gornal, Alt Penedès), a la riba esquerra, en una zona on hi ha un canyissar (*Phragmites australis*) esquitxat de canyes *Arundo donax*, freixes i altres arbres. És una zona que s'inunda en funció del nivell d'aigua del pantà o després de pluges. Quan el pantà està al màxim de la seva capacitat o s'hi apropa, la zona d'estudi presenta fins a 30 cm d'aigua en certes zones.

Els ocells s'han capturat mitjançant xarxes japoneses, que és el mètode més utilitzat per a la captura de petits ocells passeriformes. Per tant, aquest estudi està centrat en les espècies que formen aquest ordre i per tant no és vàlid per estudiar altres espècies d'ocells de mides grans com poden ser les aus aquàtiques que habiten al pantà (ànecs, fotges, polles d'aigua, ardèids, corbs marins o limícoles), tot i que en ocasions excepcionals se'n pot capturar algun exemplar.

Les xarxes s'han col·locat a la mateixa zona i al mateix lloc, tot i que el nombre ha estat variable.

El mínim de xarxes col·locades ha estat de 6 i el màxim, 9. Cada xarxa fa 12 m de longitud per 2.5 m d'alçada i 1.6 cm de malla. Aquestes xarxes s'han col·locat paral·leles al curs del riu a excepció de dues que s'han col·locat perpendicularment.

Resultats

Durant aquest 2004 s'ha anellat en 24 ocasions al parc, ja sigui al matí, tarda o tot el dia (veure Taula 1).

Dia	Matí	Tarda
19/02/04	x	
04/03/04	x	x
21/05/04		x
22/05/04	x	
04/06/04		x
10/06/04		x
20/06/04		x
30/06/04		x
04/07/04		x
05/07/04	x	
18/07/04		x
19/07/04	x	
10/09/04		x
11/09/04	x	
17/09/04		x
18/09/04	x	
12/11/04	x	x
19/11/04	x	x
05/12/04		x
06/12/04	x	x
11/12/04	x	x
29/12/04		x
30/12/04	x	x
Total	12	17

Taula 1: jornades d'anellament durant el 2004

En total s'han capturat 614 ocells de 35 espècies diferents (primeres captures, és a dir, ocells capturats per primer cop, portin anella o no) (Taula 2), s'han fet 224 controls, és a dir, ocells anellats al Foix i que s'han tornat a capturar en successives sessions i s'han produït 6 baixes, un 0.7% de les captures totals (primeres captures + controls), percentatge inferior al que es considera com a habitual per al mètode, situat al voltant de l'1%.

	Espècie	Anellaments	Controls	Recuperacions	Baixes
1	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1			
2	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	36	3		
3	<i>Aegithalos caudatus</i>	11			1
4	<i>Alcedo atthis</i>	7			
5	<i>Anthus trivialis</i>	2			
6	<i>Carduelis carduelis</i>	11	1		
7	<i>Carduelis chloris</i>	4			
8	<i>Cettia cetti</i>	62	132		
9	<i>Emberiza cirrus</i>	2			
10	<i>Emberiza schoeniclus</i>	201	25	1	3
11	<i>Erithacus rubecula</i>	27	27		1
12	<i>Gallinago gallinago</i>	1			
13	<i>Hippolais polyglotta</i>	13	4		
14	<i>Hirundo rustica</i>	68	1		
15	<i>Luscinia megarhynchos</i>	8	9		
16	<i>Luscinia svecica</i>	2	1		
17	<i>Miliaria calandra</i>	1			
18	<i>Motacilla alba</i>	1			
19	<i>Parus caeruleus</i>	14	4		
20	<i>Parus major</i>	7	1		
21	<i>Passer domesticus</i>	9			
22	<i>Phylloscopus collybita</i>	13	2		
23	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2			
24	<i>Prunella modularis</i>	1			
25	<i>Rallus aquaticus</i>	1			
26	<i>Remiz pendulinus</i>	15	4		
27	<i>Serinus serinus</i>	1			
28	<i>Sturnus unicolor</i>	1			
29	<i>Sylvia atricapilla</i>	30	1		
30	<i>Sylvia borin</i>	11	2		
31	<i>Sylvia melanocephala</i>	12	2		1
32	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1			
33	<i>Turdus iliacus</i>	1			
34	<i>Turdus merula</i>	25	5		
35	<i>Turdus philomelos</i>	6			
	Total	608	224	1	6

Taula 2: captures fetes al 2004 al Foix classificades per anellaments, controls, recuperacions i baixes

Les espècies més capturades han estat el repicatalons *Emberiza schoeniclus* (205 primeres captures), l'oreneta vulgar *Hirundo rustica* (68) i el rossinyol bord *Cettia cetti* (62).

El repicatalons és una espècie que utilitza el canyissar del Foix com a joca, concentrant-se una gran quantitat d'individus a darrera hora de la tarda a l'hivern.

L'oreneta també utilitza el canyissar per a dormir, però hi és present durant la primavera i l'estiu.

El rossinyol bord és una espècie sedentària al pantà, és a dir, hi és tot l'any. Això fa que els mateixos individus es capturin moltes vegades al llarg de l'any, tal com es pot observar pel nombre de controls, 132.

Com a fets més destacables, s'ha produït una recuperació, és a dir, la captura d'un ocell amb una anella que no ha estat col·locada al pantà. Concretament, es tracta d'un repicatalons anellat a Suècia i del qual encara no s'han rebut les seves dades d'anellament.

Altres fets destacats han estat l'anellament d'un exemplar de la subspècie *witherbyi* de repicatalons. Aquesta és la pròpia de l'àrea mediterrània de la Península Ibèrica i del sud de França i està considerada en perill d'extinció, criant només amb regularitat al Delta de l'Ebre i a l'embassament d'Utxesa (Segrià) a Catalunya.

També s'ha comprovat la fidelitat en el lloc d'hivernada, és a dir, ocells que hivernen al mateix lloc al llarg dels anys. Concretament, un repicatalons anellat el mes de març es va controlar al desembre, per tant en dues temporades d'hivernada diferents. Aquesta espècie només és present al pantà durant els passos migratoris i la hivernada i cria al centre i nord d'Europa.

Conclusió

L'anellament és una tasca que necessita de temps per donar resultats. La continuació de les tasques d'anellament al pantà en els propers anys ens permetrà conèixer millor quins ocells l'utilitzen, en quines èpoques i per què. També ens permetrà conèixer la procedència d'alguns exemplars d'espècies que s'hi presenten com a migrants o el lloc de cria d'aquells que hivernen o fins i tot el lloc d'hivernada d'aquells que hi crien.

En espècies sedentàries, es podrà conèixer la longevitat i estudiar-ne la reproducció.

ESPÈCIE		19/02	04/03	21/05	22/05	04/06	10/06	20/06	30/06	04/07	05/07	18/07
1	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>											
2	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			2							1	
3	<i>Aegithalos caudatus</i>		4			1						
4	<i>Alcedo atthis</i>										1	
5	<i>Anthus trivialis</i>											
6	<i>Carduelis carduelis</i>					4			2		1	3
7	<i>Carduelis chloris</i>	1			1				1			
8	<i>Cettia cetti</i>	3	4	1	1	2	4		6	6	3	3
9	<i>Emberiza cirrus</i>						2					
10	<i>Emberiza schoeniclus</i>	1	32									
11	<i>Erithacus rubecula</i>	6	5									
12	<i>Gallinago gallinago</i>		1									
13	<i>Hippolais polyglotta</i>			2	1			2	2	1		2
14	<i>Hirundo rustica</i>			9	1	3	3	1	14	16	6	7
15	<i>Luscinia megarhynchos</i>			3			1	1	1		2	
16	<i>Luscinia svecica</i>											
17	<i>Miliaria calandra</i>		1									
18	<i>Motacilla alba</i>											
19	<i>Parus caeruleus</i>		1	2	1			4	1		1	
20	<i>Parus major</i>		1			1	1		1		1	
21	<i>Passer domesticus</i>				1				1		1	
22	<i>Phylloscopus collybita</i>											
23	<i>Phylloscopus trochilus</i>											
24	<i>Prunella modularis</i>											
25	<i>Rallus aquaticus</i>											
26	<i>Remiz pendulinus</i>											
27	<i>Serinus serinus</i>						1					
28	<i>Sturnus unicolor</i>								1			
29	<i>Sylvia atricapilla</i>		1									
30	<i>Sylvia borin</i>											
31	<i>Sylvia melanocephala</i>									1	1	
32	<i>Troglodytes troglodytes</i>											
33	<i>Turdus iliacus</i>	1										
34	<i>Turdus merula</i>		3		1	3				1	2	1

35	<i>Turdus philomelos</i>		1									
	Total	12	54	19	7	14	12	8	30	25	20	16
	Recuperacions		1									
	Controls	1	4	5	6	4	6	7	5	8	5	3
	Baixes (no anellades)	1	3			1						
	Captures totals	13	58	24	13	18	18	15	35	33	25	19

19/07	10/09	11/09	17/09	18/09	12/11	19/11	05/12	06/12	11/12	29/12	30/12	TOTAL
			1									1
	11	7	10	5								36
						6						11
1		1	2	2								7
				2								2
					1							11
										1		4
3	1	6		7	7	2		1		1	1	62
												2
					8	26	35	16	9	59	19	205
					7	4			1	2	3	28
												1
2				1								13
7	1											68
												8
				2								2
												1
										1		1
					1	2					1	14
1						1						7
1					2		1		1	1		9
					3	1	1	4	3		1	13
		1	1									2
					1							1
					1							1
					1	4	2	1	1	2	4	15
												1
												1
		1	9	5	4	4	3	1	1		1	30
	5	2		4								11
2		1			4	3				1		13
					1							1
												1
1	1				5	2	1		2	1	1	25

					2	1				1	1	6
18	19	19	23	28	48	56	43	23	18	70	32	614
												1
5	4	5	4	11	27	23	6	15	21	8	41	224
1												6
23	23	24	27	39	75	79	49	38	39	78	73	838

Migració Postnupcial : Rapinyaires 2004


Lloc	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Puig de l'Àliga	Puig de l'Àliga	Puig de l'Àliga Turó de les Tres Partions	Puig de l'Àliga	Puig de l'Àliga	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Turó de les Tres Partions	Les Tortes	Turó de les Tres Partions	Puig de l'Àliga	Turó de les Tres Partions	Les Tortes	Turó de les Tres Partions	Les Tortes	Les Tortes
data	14 / 8	21 / 8	28 / 8	4 / 9	9 / 9	11 / 9	12 / 9	16 / 9	18 / 9	19 / 9	20 / 9	23 / 9	25 / 9	29 / 9	1 / 10	2 / 10	3 / 10	5 / 10	8 / 10	9 / 10	10 / 10	12 / 10	13 / 10	15 / 10	17 / 10	20 / 10	23 / 10	29 / 10
hores	4	4	4	4	2	4	3	3	7	6	3	3	3	2	1	4	3	3	1	4	2	1	2	4	2	2	1	2
espècies	1	2	1	3	0	7	2	5	9	8	2	3	5	3	3	4	5	6	2	5	8	0	2	5	3	2	1	3
exemplars	1	3	3	4	0	26	4	422	229	134	6	10	12	11	6	9	22	21	11	20	102	0	6	28	8	4	2	8

PERNIS 10 dies

Dia Programat 2 dies

Alliberament rapinyaires 1 dia

Totals



Espècies.- 17

Exemplars.- 1124

Data.- 11/3/04	Lloc.- Sant Domenèc de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos)		Observacions.- Egagròpiles recents d'Òliba (Tyto alba)	
Espècie		Quantitat		Total
Musaranya comuna (Crocidura russula)	S		0	19 29.7 %
	C	////-////-////-///	19	
	Md	////-////-////-/-	16	
	Me	////-////-////-//	17	
Rata negra (Rattus rattus)	S		0	1 1.6 %
	C		0	
	Md	/	1	
	Me	/	1	
Ratolí domèstic (Mus domesticus)	S		0	4 6.3 %
	C	////	4	
	Md	////	4	
	Me	//	2	
Ratolí mediterrani (Mus spretus)	S		0	21 32.8 %
	C	////-////-////-////-/-	21	
	Md	////-////-////-////-/-	21	
	Me	////-////-////-////--	20	
Talpó comú (Microtus duodecimcostatus)	S		0	19 29.7 %
	C	////-////-////-///	18	
	Md	////-////-////-////	19	
	Me	////-////-////-///	18	

Altres observacions.-

C.- Crani
 Md.- Mandíbula dreta
 Me.- Mandíbula esquerra

Sup.- Bec o mandíbules superiors
 Inf.- Bec o mandíbules inferiors

Data.- 11/3/04	Lloc.- Sant Domenèc de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos)		Observacions.- Egagròpiles recents d'Òliba (Tyto alba)	
Espècie		Quantitat		Total
Musaranya comuna (Crocidura russula)	S		0	19 29.7 %
	C	////-////-////-///	19	
	Md	////-////-////-/-	16	
	Me	////-////-////-//	17	
Rata negra (Rattus rattus)	S		0	1 1.6 %
	C		0	
	Md	/	1	
	Me	/	1	
Ratolí domèstic (Mus domesticus)	S		0	4 6.3 %
	C	////	4	
	Md	////	4	
	Me	//	2	
Ratolí mediterrani (Mus spretus)	S		0	21 32.8 %
	C	////-////-////-////-/-	21	
	Md	////-////-////-////-/-	21	
	Me	////-////-////-////--	20	
Talpó comú (Microtus duodecimcostatus)	S		0	19 29.7 %
	C	////-////-////-///	18	
	Md	////-////-////-////	19	
	Me	////-////-////-///	18	

Altres observacions.-

C.- Crani Md.- Mandíbula dreta Me.- Mandíbula esquerra
 Sup.- Bec o mandíbules superiors Inf.- Bec o mandíbules inferiors

Data.- 07/07/04	Lloc.- Coves Boveres (Castellet i la Gornal)		Observacions.- Restes d'egagròpiles descompostes, possiblement d'Òliba	
Espècie		Quantitat		Total
Musaranya comuna (<i>Crocidura russula</i>)	C	////-///	8	45
	Md	////-////-////-////-////-////-////-////	45	
	Me	////-////-////-////-////-////-////-////-//	42	
Musaranya nana (<i>Suncus etruscus</i>)	C		0	1
	Md		0	
	Me	/	1	
Ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	C	////	4	31
	Md	////-////-////-////-////-////-////-//	31	
	Me	////-////-////-////-////	24	
Ratolí domèstic (<i>Mus domesticus</i>)	C		0	1
	Md		0	
	Me	/	1	
Ratolí mediterrani (<i>Mus spretus</i>)	C	//	2	4
	Md	///	3	
	Me	////	4	
Talpó comú (<i>Microtus duodecimcostatus</i>)	C		0	5
	Md	////-	5	
	Me	////-	5	
Altres vertebrats				
<i>Passer sp.</i>	Sup.		0	2
	Inf.	//	2	

Data.- 07/07/04	Lloc.- Coves Boveres (Castellet i la Gornal)		Observacions.- 2 egagròpiles recents de Duc (<i>Bubo bubo</i>) i altres de descompostes	
Espècie		Quantitat		Total
Eriçó clar (<i>Atelerix algirus</i>)	C	/	1	1
	Md		0	
	Me		0	
Musaranya comuna (<i>Crocidura russula</i>)	C	/	1	1
	Md	/	1	
	Me	/	1	
Conill (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	C	///	3	3
	Md		0	
	Me	/	1	
Ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	C	/	1	1
	Md	/	1	
	Me		0	
Rata negra (<i>Rattus rattus</i>)	C	////-//	7	7
	Md	////-//	7	
	Me	///	4	
Rata comuna (<i>Rattus norvegicus</i>)	C	////-////	9	12
	Md	////-///	8	
	Me	////-/////	12	
Altres vertebrats				
Cabusset (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	Sup.	/	1	1
	Inf.		0	
Merla (<i>Turdus merula</i>)	Sup.	/	1	1
	Inf.	/	1	
Ocell granivor (<i>?Passer...</i>)	Sup.		0	1
	Inf.	/	1	

S.- Crani Sencer

C.- Crani superior

Md.- Mandíbula dreta

Me.- Mandíbula esquerra

Sup.- Bec o mandíbules superiors

Inf.- Bec o mandíbules inferiors

PEIXOS

Anguila (*Anguilla anguilla*) – Observació d'exemplars morts: 4-8-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 21-8-2004, 27-8-2004, 10-9-2004, 30-9-2004.

Barb cua-roig (*Barbus haasi*) – No observat el 2004.

Alburn (*Alburnus alburnus*) – Observació d'exemplars: 21-5-2004, 25-5-2004, 3-6-2004, 1-7-2004, 21-7-2004, 4-8-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 21-8-2004, 30-9-2004. Observació d'exemplars morts: 21-8-2004.

Carpí vermell (*Carassius auratus*) – Observació d'exemplars: 19-8-2004, 27-8-2004. Observació d'exemplars morts: 27-3-2004.

Carpa (*Cyprinus carpio*) – Observació d'exemplars: 10-2-2004, 25-3-2004, 6-4-2004, 17-4-2004, 21-5-2004, 25-5-2004, 3-6-2004, 18-6-2004, 19-6-2004, 1-7-2004, 15-7-2004, 21-7-2004, 4-8-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 21-8-2004, 27-8-2004, 25-9-2004, 4-11-2004. Observació d'exemplars morts: 17-1-2004, 14-2-2004, 17-4-2004, 3-6-2004, 21-8-2004, 10-9-2004, 25-9-2004, 30-9-2004, 7-10-2004, 23-10-2004, 4-11-2004.

Gambúsia (*Gambusia holbrooki*) - Observació d'exemplars: 18-6-2004, 4-8-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 21-8-2004, 25-9-2004.

AMFIBIS

Salamandra (*Salamandra salamandra*) – Larves: 11-3-2004, 3-4-2004, 11-4-2004, 7-5-2004, 30-7-2004, 14-12-2004. Atropellats: 26-1-2004 (PTE), 3-12-2004 (PTE).

Tòtil (*Alytes obstetricans*) - Cant d'exemplars: 3-4-2004, 10-6-2004. Larves: 11-3-2004, 25-3-2004, 7-5-2004, 31-5-2004.

Gripauet (*Pelodytes punctatus*) - Cant d'exemplars: 24-4-2004. Larves: 10-2-2004, 3-4-2004, 6-4-2004, 11-4-2004, 17-4-2004, 23-4-2004. Animal mort: 11-3-2004.

Gripau comú (*Bufo bufo*) – Atropellats: 15-1-2004, 3-2-2004, 14-2-2004, 9-3-2004, 4-5-2004.

Gripau Corredor (*Bufo calamita*) – Postes d'ous: 6-4-2004. Larves: 23-4-2004. Atropellats: 16-3-2004, 3-4-2004, 6-4-2004.

Reineta comuna (*Hyla meridionalis*) – Cant d'exemplars: 25-3-2004, 6-4-2004, 17-4-2004, 24-4-2004, 4-5-2004, 21-5-2004, 25-5-2004, 10-6-2004, 19-6-2004, 18-7-2004.

Granota verda (*Rana perezi*) – Observació d'exemplars: 25-5-2004, 9-8-2004. Atropellats: 7-7-2004. Cant d'exemplars: 3-2-2004, 5-2-2004, 25-3-2004, 6-4-2004, 9-4-2004, 17-4-2004, 24-4-2004, 1-5-2004, 2-5-2004, 4-5-2004, 21-5-2004, 25-5-2004, 28-5-2004, 3-6-2004, 10-6-2004, 1-7-2004, 15-7-2004, 18-7-2004, 25-9-2004.

RÈPTILS

Tortuga de rierol (*Mauremys leprosa*) – Observació d'exemplars: 10-2-2004, 9-3-2004, 25-3-2004, 6-4-2004, 9-4-2004, 17-4-2004, 1-5-2004, 25-5-2004, 3-6-2004, 18-6-2004, 1-7-2004, 21-7-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 21-8-2004.

Tortuga d'estany (*Emys orbicularis*) – Observació d'exemplars: 24-8-2004 (PTE).

Tortuga de Florida (*Trachemys scripta elegans*) – Observació d'exemplars: 15-1-2004, 3-2-2004, 5-2-2004, 10-2-2004, 14-2-2004, 4-3-2004, 9-3-2004, 25-3-2004, 6-4-2004, 9-4-2004, 17-4-2004, 1-5-2004, 4-

5-2004, 25-5-2004, 28-5-2004, 10-6-2004, 18-6-2004, 1-7-2004, 15-7-2004, 18-7-2004, 21-7-2004, 23-7-2004, 4-8-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 21-8-2004, 10-9-2004, 15-10-2004, 4-11-2004, 19-11-2004.

Tortuga d'orelles grogues (*Trachemys scripta scripta*) – Observació d'exemplars: 17-4-2004, 21-8-2004.

Dragó comú (*Tarentola mauritanica*) – Observació d'exemplars: 15-1-2004, 25-1-2004, 5-2-2004, 4-3-2004, 14-3-2004, 25-3-2004, 3-4-2004, 11-4-2004, 17-4-2004, 23-4-2004, 24-4-2004, 7-5-2004, 21-5-2004, 31-5-2004, 3-6-2004, 22-6-2004, 1-7-2004, 7-7-2004, 15-7-2004, 21-7-2004, 30-7-2004, 9-8-2004, 21-8-2004, 5-9-2004, 10-9-2004, 12-9-2004, 9-10-2004, 13-10-2004, 23-10-2004, 29-10-2004, 11-11-2004, 28-11-2004, 6-12-2004, 26-12-2004. Animals atropellats: 14-12-2004.

Dragó rosat (*Hemidactylus turcicus*) – Observació d'exemplars: 19-9-2004 (PTE), 10-10-2004, 17-10-2004.

Llargandaix ocellat (*Lacerta lepida*) – Animals atropellats: 31-5-2004.

Sargantana ibèrica (*Podarcis hispanica*) – No observat el 2004.

Sargantana cuallarga (*Psamodromus algirus*) – Observació d'exemplars: 7-5-2004, 31-5-2004, 7-7-2004, 30-7-2004, 9-8-2004, 21-8-2004. Animals atropellats: 10-6-2004.

Serp de vidre (*Anguis fragilis*) – Observació d'exemplars: 1-5-2004, 3-5-2004, 3-6-2004. Animals atropellats: 4-12-2004.

Serp de ferradura (*Coluber hippocrepis*) – Observació d'exemplars: 23-10-2004, 2-11-2004 (PTE). Animals atropellats: 24-4-2004 (PTE), 27-8-2004.

Colobra bordelesa (*Coronella girondica*) – No observat el 2004.

Serp blanca (*Elaphe scalaris*) – No observat el 2004.

Serp verda (*Malpolon monspessulanus*) – Observació d'exemplars: 25-9-2004. Animals atropellats: 21-5-2004, 25-5-2004, 28-5-2004, 18-7-2004, 27-8-2004, 28-8-2004, 25-9-2004, 2-10-2004, 7-10-2004.

Colobra de collar (*Natrix natrix*) – Observació d'exemplars: 1-7-2004 (PTE).

Serp d'aigua (*Natrix maura*) – Observació d'exemplars: 15-7-2004. Animals atropellats: 10-2-2004.

MAMÍFERS

Eriçó clar (*Atelerix algirus*) - Rastres recents: (15-7-2004 ?). Restes d'exemplars depredats: 7-7-2004. Animals atropellats: 1-6-2004 (PTE).

Musaranya comuna (*Crocidura russula*) - Observació d'exemplars morts: 4-5-2004, 28-5-2004, 3-6-2004, 10-6-2004, 30-7-2004, 7-10-2004, 19-11-2004. Restes d'exemplars depredats: 7-7-2004.

Musaranya nana (*Suncus etruscus*) – Restes d'exemplars depredats: 7-7-2004.

Ratpenat de ferradura gran (*Rhinolophus ferrumequinum*) – Observació d'exemplars: 7-5-2004.

Ratpenat de ferradura petit (*Rhinolophus hipposideros*) – Observació d'exemplars: 7-5-2004.

Ratpenat de peus grans (*Myotis capaccinii*) - Observació d'exemplars: 28-11-2004.

Ratpenat de natterer (*Myotis nattereri*) - Observació d'exemplars: 25-1-2004, 10-7-2004, 11-11-2004, 28-11-2004.

Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*) – Observació d'exemplars: 5-9-2004.

Ratapinyada comuna (*Pipistrellus pipistrellus*) – Observació d'exemplars: 14-3-2004, 11-4-2004, 23-4-2004, 5-9-2004, 11-11-2004, 28-11-2004, 26-12-2004.

Ratapinyada mediterrània (*Pipistrellus pygmaeus*) – Observació d'exemplars: 25-1-2004, 5-2-2004, 14-3-2004, 6-4-2004, 17-4-2004, 21-5-2004, 3-6-2004, 19-6-2004, 1-7-2004, 21-7-2004, 30-7-2004, 4-8-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 10-9-2004, 7-10-2004, 23-10-2004, 11-11-2004, 14-12-2004, 26-12-2004.

Ratapinyada de vores clares (*Pipistrellus kuhli*) – Observació d'exemplars: 11-3-2004, 11-4-2004, 23-4-2004, 22-6-2004, 5-9-2004, 28-11-2004, 6-12-2004, 26-12-2004.

Ratapinyada muntanyenca (*Hypsugo savii*) – Observació d'exemplars: 28-11-2004 (exemplar possible).

Ratpenat dels graners (*Eptesicus serotinus*) - Observació d'exemplars: 5-9-2004.

Ratpenat orellut meridional (*Plecotus austriacus*) - Observació d'exemplars: 25-1-2004, 11-4-2004, 22-6-2004, 7-7-2004, 10-7-2004, 5-9-2004.

Ratpenat de cua llarga (*Tadarida teniotis*) - No observat el 2004.

Llebre (*Lepus europaeus*) – Observació d'exemplars: 15-7-2004 (PTE).

Conill (*Oryctolagus cuniculus*) – Observació d'exemplars: 15-1-2004, 25-1-2004, 14-3-2004, 2-5-2004, 3-5-2004, 4-5-2004, 7-5-2004, 25-5-2004, 28-5-2004, 22-6-2004, 10-7-2004, 21-7-2004, 21-8-2004, 28-8-2004, 5-9-2004, 23-9-2004, 12-10-2004. Rastres recents: 10-2-2004, 25-3-2004, 3-4-2004, 11-4-2004, 17-4-2004, 23-4-2004, 24-4-2004, 3-6-2004, 10-6-2004, 19-6-2004, 30-7-2004, 11-9-2004, 18-9-2004, 11-11-2004, 19-11-2004, 27-11-2004, 28-11-2004, 11-12-2004, 23-12-2004. Restes d'exemplars depredats: 7-7-2004, 26-12-2004.

Esquirol (*Sciurus vulgaris*) – Observació d'exemplars: 11-3-2004, 25-3-2004, 4-5-2004, 28-5-2004, 4-9-2004, 19-11-2004, 28-11-2004, 11-12-2004, 14-12-2004. Animals atropellats: 19-6-2004. Rastres recents: 4-1-2004, 7-1-2004, 15-1-2004, 17-1-2004, 25-1-2004, 1-2-2004, 5-2-2004, 10-2-2004, 14-2-2004, 28-2-2004, 14-3-2004, 3-4-2004, 6-4-2004, 11-4-2004, 17-4-2004, 23-4-2004, 2-5-2004, 7-5-2004, 25-5-2004, 31-5-2004, 3-6-2004, 10-6-2004, 18-6-2004, 22-6-2004, 7-7-2004, 10-7-2004, 15-7-2004, 18-7-2004, 30-7-2004, 9-8-2004, 5-9-2004, 15-10-2004, 23-10-2004, 27-10-2004, 11-11-2004, 6-12-2004, 23-12-2004, 26-12-2004.

Rata cellarda (*Eliomys quercinus*) – No observat el 2004.

Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*) – Rastres recents: 4-1-2004, 15-1-2004, 25-1-2004, 10-2-2004, 6-4-2004, 11-4-2004, 23-4-2004, 31-5-2004, 30-7-2004, 15-10-2004, 23-10-2004, 23-12-2004. Restes d'exemplars depredats: 7-7-2004. Animals atropellats: 5-2-2004, 14-2-2004.

Rata negra (*Rattus rattus*) - Observació d'exemplars morts: 25-3-2004, 4-5-2004. Rastres recents: 5-2-2004, 10-2-2004, 25-3-2004, 17-4-2004, 22-6-2004. Restes d'exemplars depredats: 11-3-2004, 31-5-2004, 7-7-2004.

Rata comuna (*Rattus norvegicus*) – Rastres recents: 22-6-2004, 5-9-2004. Animals atropellats: 26-12-2004. Restes d'exemplars depredats: 11-3-2004, 31-5-2004, 7-7-2004.

Ratolí domèstic (*Mus musculus*) – Restes d'exemplars depredats: 7-7-2004.

Ratolí mediterrani (*Mus spretus*) – Observació d'exemplars morts: 10-7-2004. Restes d'exemplars depredats: 7-7-2004.

Rata d'aigua (*Arvicola sapidus*) – Rastres recents: 25-5-2004.

Talpó comú (*Microtus duodecimcostatus*) – Caus recents: 15-1-2004, 14-2-2004, 6-4-2004, 17-4-2004, 23-4-2004, 4-5-2004, 25-5-2004, 3-6-2004, 22-6-2004, 9-8-2004, 21-8-2004, 5-9-2004, 27-10-2004, 11-11-2004, 19-11-2004, 27-11-2004, 28-11-2004, 6-12-2004, 14-12-2004, 23-12-2004, 26-12-2004. Restes d'exemplars depredats: 11-3-2004, 7-7-2004. Animals atropellats: 30-1-2004.

Senglar (*Sus scrofa*) – Observació d'exemplars: 25-3-2004 (femella amb 5 cries), 30-7-2004, 19-11-2004 (PTE). Rastres recents: 4-1-2004, 15-1-2004, 17-1-2004, 1-2-2004, 3-2-2004, 10-2-2004, 14-2-2004, 28-2-2004, 14-3-2004, 27-3-2004, 3-4-2004, 11-4-2004, 17-4-2004, 23-4-2004, 7-5-2004, 25-5-2004, 31-5-2004, 3-6-2004, 24-6-2004, 7-7-2004, 9-8-2004, 9-8-2004, 19-8-2004, 21-8-2004, 5-9-2004, 10-9-2004, 7-10-2004, 23-10-2004, 4-11-2004, 11-11-2004, 19-11-2004, 27-11-2004, 28-11-2004, 4-12-2004, 6-12-2004, 11-12-2004, 14-12-2004, 23-12-2004, 26-12-2004.

Guineu (*Vulpes vulpes*) – Observació d'exemplars: 28-5-2004, 21-8-2004, 19-11-2004. Rastres recents: 4-1-2004, 7-1-2004, 15-1-2004, 17-1-2004, 25-1-2004, 1-2-2004, 5-2-2004, 10-2-2004, 14-2-2004, 28-2-2004, 11-3-2004, 14-3-2004, 16-3-2004, 25-3-2004, 27-3-2004, 3-4-2004, 6-4-2004, 11-4-2004, 17-4-2004, 23-4-2004, 24-4-2004, 7-5-2004, 7-5-2004, 15-7-2004, 31-5-2004, 3-6-2004, 10-6-2004, 1-7-2004, 7-7-2004, 30-7-2004, 4-8-2004, 19-8-2004, 27-8-2004, 5-9-2004, 1-10-2004, 7-10-2004, 12-10-2004, 23-10-2004, 11-11-2004, 6-12-2004, 11-12-2004, 14-12-2004, 23-12-2004, 26-12-2004.

Mostela (*Mustela nivalis*) – Observació d'exemplars: 13-5-2004 (PTE), 30-6-2004 (MOV), 23-9-2004 (PTE).

Visó americà (*Mustela vison*) – No observat el 2004.

Fagina (*Martes foina*) – Rastres recents: 7-1-2004, 28-5-2004, 31-5-2004, 7-7-2004, 30-7-2004, 19-8-2004, 10-9-2004, 1-10-2004, 5-10-2004, 9-10-2004, 19-11-2004. Animals atropellats: 29-7-2004 (PTE).

Toixó (*Meles meles*) – Rastres recents: 4-1-2004, 25-1-2004, 5-2-2004, 28-2-2004, 14-3-2004, 25-3-2004, 11-4-2004, 23-4-2004, 24-4-2004, 7-5-2004, 31-5-2004, 3-6-2004, 21-7-2004, 9-8-2004, 5-9-2004, 27-11-2004, 14-12-2004.

Gat mesquer (*Genetta genetta*) – Rastres recents: 5-2-2004. Animals atropellats: 4-2-2004 (PTE), 11-5-2004, 31-12-2004.

Recollim les dades d'observacions realitzades sobre animals atropellats per vehicles al Parc del Foix i entorns. També hi ha un planell amb la representació amb punts del lloc on s'ha localitzat l'animal mort.

4-1-2004 – un tallarol de casquet a prop de la Marina
4-1-2004 – un mosquiter comú a Castellet
7-1-2004 – un ratolí (no classificat) entre Castellet i Torrelletes
15-1-2004 – un pinsà prop l'observatori
15-1-2004 – un gripau comú prop de l'observatori
17-1-2004 – un tallarol de casquet (femella) sota el castell
3-2-2004 – un gripau comú a la carretera de Clariana
5-2-2004 – un tallarol de casquet sota Castellet
5-2-2004 – un ratolí de bosc a la carretera de Clariana
8-2-2004 – un pit-roig a la carretera de Vilanova, prop de Lourdes
10-2-2004 – un ocell prop de la presa
10-2-2004 – una serp d'aigua jove prop de la presa
14-2-2004 – un ratolí de bosc a la carretera de Torrelletes
14-2-2004 – un gripau comú a la carretera de Torrelletes
28-2-2004 – un pardal a Castellet
28-2-2004 – un pinsà al pont de Castellet
28-2-2004 – un tallarol capnegre a la Marina
4-3-2004 – un pit-roig a Castellet
4-3-2004 – un pinsà a prop de la presa
9-3-2004 – pardal de bardissa a prop de Xoriguera
9-3-2004 – gripau comú a prop de Lourdes
16-3-2004 – gripau corredor a la carretera de l'Arboç
25-3-2004 – una rata negra prop del fondo de l'Alzina
3-4-2004 – un gripau corredor al camí prop les Ensulelades
6-4-2004 – un tallarol capnegre a prop de Torrelletes
6-4-2004 – tres gripaus corredors entre les Masuques i Torrelletes
17-4-2004 – un verdum a prop de cal Barretet
2-5-2004 – un conill a prop de Clariana
4-5-2004 – una rata negra a prop de Castellet
4-5-2004 – un gripau comú a prop de Xoriguera
6-5-2004 – un tallarol capnegre a la carretera de Torrelletes
11-5-2004 – un gat mesquer a la carretera de Vilanova, prop Rocacrespa
21-5-2004 – una serp verda a prop de les Masuques
25-5-2004 – una cadenera a la cruïlla del castell
25-5-2004 – una serp verda a prop de les Masuques
28-5-2004 – un gafarró al pont de Castellet
28-5-2004 – una serp verda al fondo de l'Alzina
28-5-2004 – una serp verda a la cruïlla del cementiri de Castellet
31-5-2004 – un llargandaix a prop de Torrelletes
10-6-2004 – una sargantana cuallarga
19-6-2004 – un esquiol a la carretera de Clariana
7-7-2004 – una granota verda prop de Torrelletes
15-7-2004 – un tord comú a la carretera de l'Arboç
27-8-2004 – una serp verda prop de les Masuques
27-8-2004 – una serp de ferradura prop de Lourdes
28-8-2004 – una serp verda a Daltmar
25-9-2004 – una serp verda a Daltmar
2-10-2004 – una serp verda prop de mas Granell
7-10-2004 – una serp verda prop de cal Romegosa
4-12-2004 – una serp de vidre prop del riu Foix
26-12-2004 – una rata comuna prop de Sant Domingo de Penyafort
31-12-2004 – un gat mesquer femella a la carretera de Clariana