




Una aranya omnipresent

La fauna subterrània o hipogea presenta una sèrie d'adaptacions morfològiques com la tendència a l'anoftàlmia (pèrdua d'ulls), la despigmentació i l'allargament dels apèndixs. També presenta interessants adaptacions fisiològiques com la reducció de descendència o l'alentiment del metabolisme.

L'alt grau d'adaptació d'aquestes espècies, però, les fa molt vulnerables als canvis del medi, sobretot per la pressió antròpica. Les seves àrees de distribució són molt reduïdes, tractant-se sovint d'endemismes i/o d'espècies relictas.

Catalunya Parc del Montnegre i el Corredor



Arachnida. Araneae. Tetragnathidae

Meta bourneti (Simon, 1922)

Aranya de distribució paleàrtica (Europa, Geòrgia i Nord d'Àfrica) típicament troglòfila que sol aparèixer a les parets de l'entrada de cavitats, mines, soterranis i cellers. Construeix teranyines circulars de 25 a 30 cm en posició vertical, a prop de les quals la femella suspèn la ooteca, blanca i esfèrica, emprant fibres de seda.

L'hàbitat hipogeu és un espai molt fràgil on regna el silenci i la foscor absoluta. Hi som benvinguts sempre que respectem la vida d'aquests ambients que amaguen veritables tresors biològics.

Més informació https://aracnidosibericos.com/especie/238/Meta_bourneti