



Un saltamartí poc saltari



La fauna subterrània o hipogea presenta una sèrie d'adaptacions morfològiques com la tendència a l'anoftàlmia (pèrdua d'ulls), la despigmentació i l'allargament dels apèndixs. També presenta interessants adaptacions fisiològiques com la reducció de descendència o l'alentiment del metabolisme.

L'alt grau d'adaptació d'aquestes espècies, però, les fa molt vulnerables als canvis del medi, sobretot per la pressió antròpica. Les seves àrees de distribució són molt reduïdes, tractant-se sovint d'endemismes i/o d'espècies relictas.



Insecta. Orthoptera. Raphidophoridae

Dolichopoda (Dolichopoda) linderii (Dufour, 1861)

Element troglòfil, habitual del Pirineu oriental. A Catalunya, a més del sector pirinenc, ha estat localitzada a diferents cavitats naturals de les serres del Montseny, Collsacabra i Guilleries, sempre a cotes mitjanes entre 500 i 1200 m d'altitud, fet que es relaciona amb una escassa adaptació a una gran oscil·lació tèrmica o d'humitat. Espècie inclosa a la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la UICN 2016.

L'hàbitat hipogeu és un espai molt fràgil on regna el silenci i la foscor absoluta. Hi som benvinguts sempre que respectem la vida d'aquests ambients que amaguen veritables tresors biològics.